






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.491







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.491



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.491





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.491

1.6.491













ALBERTINI  
BOTTONNI

NOBILIS PATAVINI PHILOSOPHI  
AC MEDICI, THEORICAM  
ORDINARIAM IN ACADEMIA  
PATAVINA INTERPRETANTIS,

DE MORBIS  
MVLIEBRIBVS.

CVM PRIVILEGIO.



PATAVII  
APVD PAVLVM MEIETVM  
M. D. LXXXV.

ALBERTINI  
ROTONDI

NOBILIS PATAVINI THEOSOPH  
AC MEDICI THEORICAR  
ORDINARIUM IN ACADEMIA  
PATAVINA INTERSECTANTIS

DE MORBIS  
MATERIAE.

ENRICH KILCH



PATAVINI  
AC MEDICI THEORICAR  
ORDINARIUM IN ACADEMIA  
PATAVINA INTERSECTANTIS



DIVO RODVLPHO II.  
IMP. CAES. D. MAXIMIL. II.  
F. D. FERDINANDI N: PIO FOELICI  
SEMPER AVGVSTO.



*A* est; Caesar Auguste, medendi facultatis præstantia, ut sacris literis non obscure proditum sit, ex omnibus artibus Nullius, nisi medicina Deum opt: Max: peculiari quodam iure, & laude inuentionem sibi vendicare: Quam veritatem, sicut plerasq; alias idolomania sectatores egregie fuerunt mentiendo æmulati; cum siue Apollinis medicina inuentum esse cecinerunt; siue Æsculapio, Chironi, Machaoni, Podalyrio, Hippocrati, Hermagoraq; & tamquam Deorum sanguine satis, & tamquam uiris medendo de hominum genere optime meritis delubra extruxerunt, honoresq; diuinos tribuerunt: Vere autem ut dicam, quid excellentius, diuinius, & summa

★★ 2



Dei potestati similis cogitari inter homines potest praclaro Medici facinore; quo à Deo primum genita, ac de in sensim ob inditam imbecillitatem ad interitum labentia, sponteque flauiscentia corpora ex ipso ueluti defectionis cursu reuocantur; ac tamquam ui, ne flaminibus ruptis concidant, retinentur, morteque imminenti prohibentur? Hinc vulgo occasio interdum exhibit aputandi non nullis, tametsi satis cessissent ope tamen medicorum vitam esse restitutam, quod Propertius iis carminibus significauit.

Et Deus extinctum crescis epidaurius herbis.  
Restituit patriis Androgeona focis.

Quod, opus heroicum ac plane diuinum adeò creditum serè semper fuit, ut Alexandro Magno felicissimo Terrarum Imperatori, Saborigæ & Gingi Medorum, Sabidi Arabum, Mitbridati Persarum, Hermeti Aegyptiorum Regibus, recens uerò Mesui Regis Damascio Nepoti uel medicinam exercere, uel de Medicina scribere in delitiis fuerit, illisquæ ex ea bene, & sedulo culta laudis, ac celebritatis non parum accesserit; Hæc propter eam causam adduxi, ut ostenderem, haud inepte me fecisse, qui mea addictissima in sacram, Cesaream



Maieſtatem tuam obſervantia declarationem aliquam exhibiturus, rem ſacram, de medicina ſcilicet lucubrationem ſacro Imperatori dedicarim; Quem facile mihi in animum induxi munus hoc, quale quale ſit incomptum, & minime nitidum, haudquaquam aſpernaturum; cū & n. agno Perſarum Regi aqua canis ruſtici uolis oblata gra- tiſſima fuiſſe commemoretur, & ea ſit Caſarea Maieſtatis tuae in omnes, ſed maxime in literarum ſtudioſos humanitas, ut uix quiſquam in ue- terum memoria inueniatur, qui tecum poſſit, & cum gentis tuae laudatiſſimis ſeu Imperatoribus, ſeu Regibus, in uirtutis huius certamine conferri: Eſſet nunc mihi de clariſſima ſtirpis tuae antiqui- tate honores iam diu immortales aſſecuta, De Au- ſtriacis Heroibus in Diuorum numerum propter inuiictam fortitudinem cooptatis, ac de ſplendidis- ſima uirtutum tuarum corona praeſerea dicendū, niſi hac toto Terrarum orbe, & plurimorum de- curſu ſeculorum nota ſic, & comperta haberētur, ut nouau de iis orationem ſubnectere idē prorsus foret, quod meridianae ſolis luci ex face fulgorem, & ſplendorem addere: Neq; uerò commemoratio- ne admirabilis, ac penē diuinæ ſapientiae, & uir-



tutis tuæ ob id solum supersedere mens est, quia  
nobilissima sit; sed multo magis ob illud etiam, qđ  
talis, ac tanta est, ut nulla ingenii vi, nulla dicendi  
facultate, nulla orationis copia pro merito satis re  
censeri posse videntur: Quid enim sacra, Casarea  
Maiestate tua fuit unquā aut iustius, aut fortius,  
aut affabilius, aut sanctius; aut deniq; icorruptius?  
quod cum uerbis explicare integrum non sit, saltē  
(quod omnes faciunt) etiam, atq; etiam admira  
bor; indeq; confidam nulla me difficultate consequi  
turum, ut hæc mea benigno animo à sacra Casarea  
Maiestate tua suscipiantur: Vale Augustiss. Im  
peratorum dum ego, & cuncti, qui Christi signum,  
& nomen gerimus preces, & supplicationes in tē  
plis, & in priuatis adibus quotidie facimus, De  
umq; Opt. Max. ardentibus uotis oramus, ut lō  
gisimam uitam tuam gloriosum, tranquillum, ac  
diuturnum Imperium, ipsaq; uerè aurea ætas ex  
cipiat. Ex Patauio patria sua Die 28. Mensis  
Maij anno Domini nostri Iesu Christi 1585. scri  
bebat Albertinus Bottonnius Sacrae Casareae  
Maiestati suae addictissimus.

AD EXCELLENTISSIMUM ET DOCTISSIMUM

virum D. Albertinum Bottonnium, Phisicum & Medicum Patavinum, sibi charissimum Præceptorem, Gallus Chraplevyski Polonus.

**N**ON tulit in terris tot commoda Cynthus olim

Quot fers ingenii dexteritate tui  
BOTTONNI, summis dignissime laudibus, atq;

Efferat ut quisquis nomen in astra tuum

Namq; docent tua nos uitam monumenta tueri,

Vitam, quæ vincit quicquid in orbe patet

Ortus & nostri, qui uexant, semina, morbi

Arte hos inuicta, tu superare studes

Quod quamuis cura nobis testaris abunde

Hic tamen & testis iam quoq; liber erit

Annos, pro meritis, fas sit tibi uiuere multos

Sis decus, & seculi gloria magna tui.

IN EXCELLENTISSIMI ALBERTINI BOT-

tonii opus de Morbis Muliebribus.

**N**E decor, & roseo nitidus color effluat ore,

Neu uoret exurens liuida membra calor.

Neue recens fœtus materna procidat aluo

Neu mors atra manus inferat ante diem.

Cultor Apollineæ Bottonnius integer artis,

En medicam dubio tempore præstat opem.

Ingenii monumenta pii, castissima amoris

Pignora, fœmineis donat habere choris.

Tu virgo cum matre nouos decerpites flores,

Certatim docto texite secta leni.



IN V. R. D. ALBERTINVM BOTTONVM  
Incerti .

**N**aturæ potuit penetrare recondita si quis  
Arcana, egregia aut eruere arte sua.  
Hæc unilicere tibi, seruator Apollo  
Cui certam medicæ tradidit artis opem.  
Quæ speciem humanam seruant, quibus artibus adsis  
Fœnincis morbis, qua tener arte puer  
Nutricis tenero semotus ab ubere, crescat  
Integer, & quæ quis dicere cuncta queat?  
Facundo monstras sermone, & pectore pleno  
Ingenuj profers munera rara tui.

A D L E C T O R E M.

**F**æmineos morbos, medica quos Nullus in arte  
Siue aperire potest, seu remouere magis,  
Excellens docet Hic auctor, causasq; repellit,  
Vt sit Acidaliæ cara puella Deæ .



ALBERTINI  
BOTTONNI  
PHILOSOPHI  
AC MEDICI.

PRÆFATIO.

C A P. I.

**I**n arte medica tractatio aliqua utilis re-  
peritur uel futuro medico omnium ma-  
ximè necessaria mente excogitari po-  
test illa certè, quæ de morbis muliebri-  
bus agit constanter & citra aliorum  
controuerfiam cenferi debet. Hæc .n. *Morborum mulieb. magnitudo.*  
illorum malorum doctrinam continet, quæ Symptoma-  
tum magnitudine & frequentia, numero & uarietate,  
resistentia & aëtiuitate, latenti malitia & manifesta sæ-  
uitate, cognoscendi deniq; obscuritate, & curandi dif-  
ficultate cætera omnia, quæcunq; naturalem humani  
corporis statum euertere possunt, longè latèq; supera-  
re uidentur. Quod sanè fuit in causa, ut de his ad scri-  
bendum magis potuerint meorum studiosorum assidue  
hortationes, quàm à tanto & tali negotio me auerten-  
dum, plures & grauissimæ occupationes, quibus & publi-  
co do-

*Utilitas tra-  
ctandorum*

*Morborum  
mulieb.*

*magnitudo.*

*Scribendi oc-  
casio.*



## De Morbis Muliebribus

co docendi munere iam diu detineor, & ægrotantium assiduis uisitationibus distrahor. His igitur, ut animi mei propensionem significarem, & pro uiribus aliqua ex parte satisfacerem, Deo duce institutum aggredior; ea tamen ratione, ut prætermissa omni dicendi obscuritate & difficultate quæ Iuuenes à legendis ueterum libris dehortari solent, ea solum prosequar, quæ ad scopum consequendum magis præstare uidebuntur. Quod futurum mihi facile persuadeo, si uanis quæstionibus neglectis, duo tantum in examinandis singulis affectibus explicanda proposuero. Quorum primum ad illorum cognitionem attinebit. secundum uerò ad eorundem rectam curandi rationem magis spectabit: quæ duo in hoc dicendi genere, tanta sunt affinitate coniuncta, ut ab eximio Medico, non nisi frustrato sine separari, & patientis iactura diuelli possunt. Quis enim oblatum sibi morbum profligare audebit, nisi illius naturam, speciem ac uim ante omnia calluerit? Quis medica præsidia salutariaq; remedia cognoscere, uel in usum deducere propria laude profitebitur, si ea ignorauerit, quæ illorum certam inuentionem & congruam administrationem lucidè patefaciunt? Quis deniq; morborum euentum, hoc est, longitudinem & breuitatem prædicere, salutemq; uel mortem uaticinari poterit, si illa neglexerit, quæ ad id præstandum, non solum summè necessaria sunt, uerum etiam Medicum uenerandum & admirandum reddere possunt? Hinc iurè & non aliundè præsidiorum omnium inuentio oritur: hinc inuentorum recta administratio deducitur: hinc deniq; in debellandis morbis cita, tuta, & iucunda curatio tantum prodibit. Sine his igitur uana omnino erit omnis nostra medela, inanis quicunq; labor, frustra conatus nostri in operando apparebunt. Quapropter futuræ orationis exordium erit, rerum tractandarum ac proinde muliebrium

*Scribendi  
ratio.*

*quæ et quot  
sint explicanda.*

*Quanta sit  
necessitas  
explicandorum.*

*Ordo in rebus tractandis.*



liebrium morborum numerum in primis explicare. Secundo numeri huius necessitatem ostendere. Tertiò de unoquoq; particulatim differere. In quorum explanatione nominum æquiocatione prius sublata, singulorum naturam diligenter expendam, species, causas, signa, euentum, & curandi rationem inuestigabo & demonstrabo: ut hinc proponendorum malorum integra cognitio & absoluta curatio facillè haberi possit. Intelligo autem per morbos muliebres illos, qui huic tantum sexui contingunt, ac proinde earum partium naturalem constitutionem corrumpunt, quæ uiris minimè sunt communes, cuiusmodi extant mammillæ & Vterus: quarum altera, ut formationi foetus dicata fuit: ita māmillæ illius cōseruationi postq̃ in lucē editus est incumbere uidetur.

*Nominis explicatio.*

*Quæ sint partes propriæ mulie.*

*Quibus affectibus uterus subiiciatur, Cap. II.*

**A**B vtero autē exordians in primis satis cōstare debet eā esse corporis partē, quæ cuilibet morborū ac Symptomatum generi subiici potest, ut ex parte morbi illa afficiatur intēperie quacunq; simplici inquā & cōposita, sine materia & cū materia, viuente & non viuente, quæ rursus esse potest vaporosa & humorosa, alimentalis & excrementitia, biliosa deniq; pituitosa, Melancholica & sanguinea aquosa saniosa & seminali. Hæc eadē pars corripitur etiā Morbis instrumentalibus, qui naturalē illius cōformationē immutāt, figurā videlicet, superficiē, uias, sitū, colligantiā, magnitudinē & numerū. Ad qd̃ morbi genus referri potest puerla vteri figura, rotunda inquā, quadrata, curua & aliorū generū, quæ pro naturæ modo illi non conueniunt. Immutata eiusdē superficies siue asperior & durior illa fuerit, siue mollior & leuigata extiterit, ut ex inducā cicatrice contingere solet. Cavitatū etiā aberratio secundum nimiam dilatationem uel constrictionem. Proprii loci mutatio, sursum videlicet, deorsum, ante & retrò, dextrum sinistrum,

*Vterus cuiusq; generi morbi subiicitur.*

*Morbi in intemperie.*

*Morbi instrumentum.*

*Figura.*

*Superficies.*

*Via*

*Situs.*

A 2 foris



## De Morbis Muliebribus

foris intus; Ad quod genus pertinet vteri procidentia, & eiusdem nimia concentratio & conuulsio. In colligantia pariter vterus alteratur, quoties vicinis partibus naturaliter alligatus, à proprio loco dimouetur, & alienum occupat. Magnitudo præterea aucta & diminuta laudabilem vteri conformationem corrumpit. Ad imminutam magnitudinem spectabit tum illius tabes, siue alimenti defectu, siue alia de causa oborta fuerit, tum eiusdem particula aliqua dempta. Ad auctam uero magnitudinem referri debet, non solum illius auctio, quæ per additionem nouæ substantia familiaris & cognatæ oritur: verum etiam illa, quæ per affluxum materiæ, copia & qualitate peccantis producit: secundum quam rationem, quocumq; tumorum genere detineri potest, flatulento inquam & humoroso: atq; hoc rursus inflammatorio, Erysipelaceo, œdematoso, scirrroso, & cancroso. Huc pariter referri possunt morbi illi, quicumq; numerum partium constituentium Vterum immutant, siue augendo siue minuendo id effecerint, ut merito aucti numeri possit esse Mola: merito uero imminuti oritur defectus alicuius partis ad constituendum vterum necessariæ, siue illa ex toto fuerit abolita siue diminuta & mutilata. Tandem vterus illis etiam morbis subiicitur, qui in soluta unitate uocantur, cuiusmodi sunt ulcus, fractura, ruptio, euulsio, uasorumq; enastomasis, diapedetis, & diæresis. Si deinde vteri Symptomata consideremus, nullum erit pariter reperire genus, quo miseræ mulieres sæpius non affligantur, actione inquam læsa, qualitate mutata & exeunte mutato. Vt merito læsa actionis siue hæc princeps fuerit siue inseruiens, triplex symptoma illi occurrat, in actione uidelicet ablata, diminuta & deprauata. Huc spectant sterilitas, rara & imbecillis conceptio, nec non etiam monstruosa: quibus accedunt concepti fœtus frustratus partus, deprauatus & magna



& magna cum difficultate factus. Penes qualitatem mutatam idem vterus afficitur calore, frigore & dolore, quemadmodum etiam in exeunte mutato læsio contin- git, dum per uterum exit, quod intus detineri deberet: uel è contra intus detinetur, quod secundum naturam effluere oporteret hinc oriuntur uaria Symptomatum genera, qualia sunt suppressio menstruorum, diminuta expurgatio, stillicidium, profluuium muliebre immoderatum siue seminis fuerit, ut in gonorrhoea contingit, siue alterius humoris, sanguinei uidelicet, pituitosi, biliosi, serosi & ex his permixti, quæ igitur & quot sint vteri uicia explicauimus, huius autem numeri necessitas unde habeatur, sequens cap. explicabit.

Mostruosa  
Partus fru-  
stratus.

Partus de-  
pran.

Partus diffi-  
cillis.

Qualitas  
mut.

Exieas mu-  
ta.

Suppr. mest.

Inmodera-  
ta fluxit.

Gonor

Melan.

De necessitate & origine propositorum  
malorum. CAP. III.

EX tot enumeratis malis, quædam vtero conueniunt, ratione qua communicat cum aliis partibus corporis: quædam verò secundum propriam rationem. Conuenit autem cum aliis partibus penes illa, quæ eius essentiam constituunt, ab eisdem uerò differt secundum ea, quæ eius essentiam consequuntur, nempe penes actionem vtero propriam. Constat autem vniuersa vteri essentia, quemadmodum & cætera omnia corporis instrumenta, ex duobus, partium scilicet similarium tempera- tura, quæ ex Elementorum mixtione oritur, unde prima compositio partis habetur, quæ temperaturæ subiectum dicitur: & partium similarium inter se conformatione, quæ secunda compositio structura partis uocatur, secundum quam morborum malæ cõpositionis est subiectum. His accedit continuitas uel partis unitas, per quam sin- gula

Vteri essen-  
tia.

Tempera

Structura

Vnitas.



## De Morbis Muliebribus. 20

gula quæq; pars siue similis siue dissimilis fuerit, una denominatur, & functionem unam & usum habet, quæ tertia compositio æquè conuenit utrisq; partibus, et secundum hanc uterus subiectum est morborum in soluta unitate. Horum autem trium componentium constitutio secundum naturam, ut in qualibet alia parte sanitas est: ita eorundem præter naturam euersio morbus erit: Quare quot erunt compositiones genere discrepantes, totidem etiam sanitatis ac morbi genera statuenda erunt. ut mirum esse minimè debeat, si uterus in primis ratio

*Uterum triplici genere morbi affici posse.* ne qua triplici hac compositione præditus est, triplici etiam morborum genere detineatur: in intemperie uidelicet, quæ partium similium eius immoderata, & præter naturam constitutio est, in uitata deinde conformatione, quæ partium dissimilium in concinna compositio dicitur, & in soluta unitate, quæ utrisq; partibus communis existens, illarum continuitatem soluendo, morbum efficit, ambabus partibus communem: quæ triplex utriusque constitutio cum aliis corporis instrumentis conue-

*Morbi uteri cum aliis partibus communis.* niat, meritò in hoc triplici morborum genere cum ceteris partibus communicabit: imò ob eandem rationem, consensuetudinem idem uterus cum ceteris partibus, secundum singulas differentias, quæ sub singulis tribus generibus collocantur: sicut enim ex triplici allata compositione præter naturam, tria primorum morborum genera nascebantur: sic in unoquoq; morborum genere, pro multiplici ac diuerso componentium numero, aliæ differentie ducuntur, ita ut quot ea sunt, quæ singulam compositionem constituunt, totidem morbi oriantur. At similium

*Similarium compositio ex tribus.* partium natura & compositio tribus potissimum constituit, propria forma seu facultate de predicamento substantie, propria temperatura & materia: quæ propter morbum in istis tribus ponendus esset, uidelicet in propria forma mutata, & ratione huius statuunt plerumque, oriri morbum à



## Libri Primus. A

bum à tota substantia : quamuis ego aliter sentiam : *In probatio*  
 nam forma ista , cum nec contrarium habeat , nec ma- *aliorum.*  
 ius & minus suscipiat , ideò per internam suam naturam  
 eadem semper manens , morbo aliquo affici non poterit ,  
 sicut etiam nec sana propriè dici potest : sed sanitas &  
 ægritudo passionibus sunt corporis compositi ex contrariis  
 & magis & minus suscipientis : ideò si forma substantia-  
 lis sanitati & ægritudini subiicitur , hoc illi conuenit ab  
 extrinseco , nempe ratione corporis , in quo & per quod  
 opera sua exercet & manifestat . In partis verò tempera- *Morbi in in*  
 tura alterationem contingere , illamq; multiplicem ac ua- *temperie.*  
 riam , nemo est qui dubitet : quemadmodum etiam ex  
 parte materiæ eadem pars immutari potest , ut materiæ  
 uitia sint , nimia partis laxitas uel constrictio , tenuitas  
 uel crassities , raritas uel densitas : per has enim partes , *Morbi mate*  
 quibus similia omnia constant , forma substantialis , *riales.*  
 ut per sua instrumenta in composito membro agit , &  
 pro illarum uarietate diuersimodè operatur & patitur :  
 Ex laudabili enim temperatura primarum qualitatum ,  
 integra oritur actio , dictis partibus propria , attractio  
 uidelicet , retentio , coctio , expulsio & nutritio . Ex  
 eiusdem recessu à naturali statu eedem actiones partium  
 similiarum uitiantur . A pari dicendum de secundis qua-  
 litatibus à materia ortis , quarum pariter commodera-  
 tio uel incommodatio , est causa integritatis læsarumq;  
 functionum , de quibus Galenus loquens libro artis medica-  
 lis , statuebat , tenuē substantiā cerebri boni ingenii causam  
 esse : eiusdem densitatem , bonæ memoriæ contrariis autē  
 qualitatibus affectū earundem functionum . Læsionē subie-  
 ctū erit . Dum igitur uterus corripitur hoc primo genere  
 morbi , quod aduenit componentibus partes similes ,  
 secundum communem rationem afficietur , non autem  
 secundum propriam . Quapropter uteri intemperies  
 secundum primas qualitates , morbus erit communis  
 & par-



## De Morbis Muliebribus. 20

& partium similarium gratia illi adueniens, siue hæc intemperies fuerit sine materia & cum materia. Idem statuendum est de morbo eidem vtero contingente ob excessum uel defectum secundarum & materialium qualitarum. Si pariter idem vterus consideretur penes secundam compositionem, quæ ex partibus similaribus conflata est, & ex qua oritur vteri structura seu conformatio, facultatem formatricem sequens, hæc ubi naturalem conformationem quouis modo amiserit, secundo morbi genere afficietur, quod in uitiata partis structura consistit. Structura autem & conformatio est quid commune cæteris omnibus partibus dissimilaribus, ut in hoc pariter morbi genere cum aliis plerisque partibus vterus communicet. Tandem idem vterus non solum conuenit cum dictis partibus per structuram simpliciter, & consequenter per morbum etiam talem structuram uitiantem: verum etiam secundum speciales morbos sub hoc genere contentos, communionem habebit. Sunt autem huiusmodi morbi plures ac diuersi pro multiplici ac diuerso componentium numero: at uniuersa vteri conformatio constat ex determinata forma, magnitudine, partium numero, situ, colligantia, & similibus, ex quibus aptè compositis, tota vteri naturalis conformatio confurgit: singulorum autem lapsus, à naturali conformatione, morbos speciales faciet, sub uitiata vteri conformatione contentos, ut imprimis si vteri forma læsa fuerit, triplici morbi genere detineri possit, pro ut forma huius partis, ut etiam reliquarum omnium, in tribus potissimum consistit, in figuræ concinnitate, in conuenienti superficie, & uiarum debita latitudine & constrictione, ex quorum recessu à naturali statu, triplex species morbi oritur, in figura scilicet uitiata, in superficie & uis. Ut ex parte uitiatæ figuræ vteri, morbus oriatur, qui in peruersione eius figuræ consistit, siue vte-

*Vteri structura.*

*In Forma vteri 3. species morbi.*

*Morbi in figura.*



ue vterus figuram planè rotundam acquisierit , aut re-  
ctam , curuam uel alterius generis diuersi , à propria &  
naturali sui figura , quæ instar alicuius cucurbitæ habe-  
tur. Ad morbum uerò in superficie,ordinabitur nimia  
asperitas uel lenitas vteri. Ad morbum in cauitate re-  
ducitur nimia vteri contractio , uel eiusdem excedens  
amplitudo . Merito numeri subiicitur morbo tum in nu-  
mero aucto , ut cum in illo caro superflua adnascitur ,  
uel imminuto , ut cum aliqua pars vteri constitutiua  
desideratur. A conuenienti uerò magnitudine recedere  
solet dupliciter , prout plus iustò auctus uel imminu-  
tus est , siue talis mutata magnitudo natiua fuerit si-  
ne ascititia . si morbus fuerit in magnitudine aucta, mul-  
tiplex esse potest pro uarietate materiæ uterum in tu-  
morem attollentis, quæ si flatulenta fuerit tympanite de-  
tinebitur : Si minera flatus extiterit , esse potest quilibet  
humor, atq; is tum impermixtus tum permixtus . Si  
impermixtus fuerit & sanguis extiterit , tunc subiicietur  
inflammationi exquisitæ . Merito pituitæ tumori oede-  
matoso, meritò bilis erysipelaceo , & meritò Melancho-  
liæ scirrho. Si humores fuerint permixti , orientur illæ  
eædem species tumoris , sed noti, & spurii denomina-  
tionem semper suscipientes à prædominante humore. Si  
idem vterus à proprio naturali loco & situ dimouea-  
tur , poterit secundum omnem loci differentiam dimo-  
ueri , supra uidelicet infra , ante , retrò & secundum  
latera , ad quod genus morbi reducitur procidentia vte-  
ri , & eiusdem nimia contractio & concentratio. Præ-  
terea idem vterus pati etiam potest solutionem continui-  
tatis, tum ratione unius & eiusdem partis similis, tum  
plurium inter se, & prout vterum constituunt: ad quod  
genus morbi ordinabuntur vlcus , fractura, ruptio, auul-  
sio & huiusmodi. Quò uerò ad ea mala uteri, quæ pro-  
pria magis uidentur, & huic soli parti competunt, ea po-

*Morbi in su-  
perficie.*

*Morbi in ca-  
uitatibus.*

*Morbi in nu-  
mero.*

*Morbi in  
magnitud.*

*Tympanitis.*

*Inflam.exq.*

*Erysipel.*

*Scirrhus.*

*Tumores  
spurij.*

*Morbi in si-  
tu.*

*Vteri proc-  
dentia.*

*Vteri con-  
tractio.*

*Vteri soluta  
unitas.*

B tissimum



## De Morbis Muliebribus

*Vlcus*  
*Fractura.*  
*Ruptio.*  
*Auulsio.*  
*Vteri symp.*  
*propria.*

tiffimum erunt, quę illius propriam actionem lædunt : hæc autem duplicia sunt pro duplici vteri functione, quarum altera respicit conseruationem in diuidui, altera uerò speciei. Prioris ordinis sunt illa Syptomata quę conseruatam menstruorum purgationem lædunt: quę sanè uteri euacuatio, post annum duodecimum incipere solet, & magno corporis beneficio, cum per hanc mulier ab omnibus superfluitatibus emundetur, ut quamdiu illa secundum naturam fit, & conueniens genus materiæ euacuatur, atq; id in debita etiam quantitate, qualitate, tempore, loco & modo exeundi, tam diu etiam integra ualitudine fruitur : quamprimum uerò illa eadem aberrabit in uno, pluribus uel omnibus iam dictis, totum etiã corpus patietur, & à naturali statu recedet. Læsio autē, quę dictæ functioni cōtingit, triplex esse potest, pro ut uel aufertur uel deprauatur uel imminuitur: hinc triplex symptoma ortum habet, ut meritò ablationis oriatur suppressio, quę si solius materiæ menstrualis fuerit, exquilita dici potest: si etiam seminis, spuria vocabitur, quę duplex materia intus cohibita, si non solum copia peccauerit, uerum etiam praua & uenefica qualitate, oriatur illud Symptoma, quod præfocatio matricis nuncupatur. Meritò autem non integræ suppressionis, diminuta expurgatio fiet. Si deinde aliter efficiatur, quàm pro naturæ modo conueniat, oriatur deprauata expurgatio, quę multipliciter adhuc deprauari potest, pro ut uel diutius illa protrahitur, quàm par sit, & ita oritur illud Symptoma, quod vocatur immoderatum profluuium mensium, uel modus exeundi consuetus non seruatur, quod contingit quando menses agrè, cum difficultate, aut dolore effluunt, & ita nascitur illud Symptoma, quod stillicidium mensium dicitur: uel quia exiens materia alterius est generis ab illa, quę secundum naturæ ordinem exire deberet, & tunc oritur aliud genus

*3. de Symp.*  
*causis 4.*

*Suppresio*  
*integ. me-*  
*str.*

*Profocatio*  
*uteri.*

*Suppresio*  
*diminuta.*  
*Deprauata*  
*expurg.*  
*Profluuium*  
*immodera-*  
*tum.*

*Stillicidium.*  
*mensium.*

genus



genus profluuij, quod sub se continet diuersas species, pro exeuntis materiae diuersitate, tum in essentia, tum in modo essendi: Si namq; hæc materia seminalis fuerit, Gonorrhoeam faciet: si humoralis hæc modò alimenta Gonorrhoea  
lis modò excrementitia erit, si alimentalis extiterit, consequenter cum noxapatientis facta & à toto prodeat, orietur profluuium muliebre immoderatum, cuius species multæ esse possunt, pro diuersitate succi exeuntis, Profluuium  
à quo etiam nomen accipient. Quare si exiens materia muliebre  
fuerit sanguis, nascetur profluuium muliebre immoderatum sanguineum & rubeum. Si à succo pituitoso tum.  
fiat, profluuium album denominabitur. A Melancholico obscurum & nigrum: A bilioso flauum & rufum. Sympt. uteri, ut ad speciem conseruatur.  
Si autem ab utero potius, prodierit fit illud symp. quod dicitur stillicidium uteri. Si deinde uterum ac uteri actionem consideremus, pro ut respicit conseruationem speciei, orientur alia duo Symptomatum genera, pro duplici actione & facultate, qua uterus præditus esse debuit, pro specie conseruanda: Altera est fœtum concipiendi & conformandi, Altera verò est, eundem formatum fœtum pariendi. Quo ad facultatem concipiendi hæc intra naturæ leges se continet, quotiescunq; fœtum debito tempore continet, donec secundum omnes sui partes perfectus fuerit: in qua concipiendi functione si error contingat, triplex esse potest, prout uel aufertur, uel diminuitur uel deprauatur. Si auferatur, oritur illud Symptoma, quod sterilitas dicitur. Si diminuat, dupliciter contingit, pro ut fœtus imperfectus & non ex omni parte integer concipitur, uel si perficitur, diminuta dici potest actio, Imperfectus  
quia foetus imbecilior generetur, uel si robustus produ- Imbecilis fœtus.  
citur, rarius tamen conceptio fit. Quare hinc oritur conceptio rara & tarda & imbecillis. Si autem conceptio deprauetur, multipliciter pariter deprauari potest, prout Rara conceptio.  
B 2 fœtus



## ❧ De Morbis Muliebribus ❧

*Mela.*

*Conceptio  
monstruosa  
totius.*

*Conceptio  
monstruosa  
ratione  
partis.*

*Vteri uicia  
ut est pari  
endi istru.*

foetus, modò plurimùm distat à parentum similitudine, à quibus si rationibus omnibus distaneret, ac proinde genere, specie & indiuiduo, tunc nascetur illud Symptoma quod Mola dicitur, quæ nil aliud est, quàm frustum carnis informe, ullam similitudinem cum parentibus seruans: non quidem in genere, quia animal adhuc dici non potest: non in specie, cum humanam figuram & formam non habeat, longè minus indiuidualem similitudinem obtinebit, cum nec in toto corpore, nec in aliqua illius particula cum parentibus affinitatem præferat. Vel secundò foetus deprauatur quia seruata similitudine generica & specifica, desideratur solum Indiuidualis, siue penes corpus vniuersum siue partem determinatam id contingat. Hoc autem fit, quoties foetus in vtero ita conformatur, ut homo quidem generetur, at nulla seruata proportionem cum parentibus, In figura, numero, magnitudine partium, situ & aliis, ut in specie humana talis conceptio monstruosa habeatur secundum totum corpus, uel foetus dicitur deprauatus, si cum parentibus seruauerit similitudinem, genericam, specificam & indiuidualem, desideratur tamen similitudo partis determinatæ, quemadmodum si foetus nascatur claudus uel monocus, quorum tamen uitiorum neutrum in parentibus reperiatur: & ita oritur conceptio monstruosa sed ratione partis. Si deniq; eundem vterum consideremus, ut est pariendi instrumentum, multiplex adhuc Symptoma oriri poterit, quorū numerus oritur ex multiplici recessu partus à naturali statu. Est aut partus secundum naturam, quoties foetus in vtero formatus, non solum foras exit, sed debito suæ maturacionis tempore, & præterea exeundo debitum modum ac ordinem seruat: hinc tria errata illi aduenire possunt, prout dictus partus uel penitus non fit, & ita nascitur illud Symptoma, quod uocatur detentio, & formati foetus cohi-



tus cohibito : vel secundò male fit, quod tripliciter con-  
tingit . Primò , quia tardius fiat , quàm partui naturali  
conueniat , & oritur alterum Symptoma , quod tardus  
partus vocatur : vel celerius fit , quàm fieri conueniat ,  
& tunc oritur illud Symptoma, quod uocatur Aborsus,  
uel Tertiò partus lèdi potest, quia deprauatè fit, & ori-  
tur diffic. pariendi quod contingit , quando peruertitur  
ordo, & naturalis pariendi exeundiq; modus, quemadmo-  
dum si fœtus ordine naturali peruerso exitum primò que-  
rat secundum pedes vel latera , non autem secundum ca-  
put si præterea cum dolore , & labore fiat, si etiam fœtus  
mortuus , & laceratus exeat, si secundina intus detimeat-  
tur . Hæc igitur dicta sint de numero & numeri neces-  
sitate malorum omnium muliebrium , quæ ratione uteri  
illis adueniunt , siue communioribus malis afficiatur, si-  
ue propriis : & si communioribus , siue illi contingant  
ratione partium simularium uel dissimularium , siue utra-  
rumq; , & si malis propriis , siue illa adueniant eius fun-  
ctioni , quæ dirigitur ad conseruationem speciei, aut In-  
diuidui , & rursus siue in utraq; functione ablatio con-  
tingat , autem imbecillitas uel deprauatio . Commu-  
nioribus ergò malis prætermisiss, propria potissi-  
mum aggrediar, tùm quia scopus est, de affe-

*Detentio.*  
*fœtus.*  
*Tardus par-*  
*tus.*  
*Aborsus.*  
*Diffic. pari-*  
*endi.*

*Epilogus.*

Etibus muliebribus tractare, ac proinde  
de illis , qui uiris non sunt cõmu-  
nes, tùm magis, quia agentes  
de muliebribus affecti-  
bus, simul etiam  
communio-  
res com-

plectemur, ut pote illos , à qui  
bus tanquam à causis pro-  
pria uteri Symptoma-  
ta dependent.

*De sup-*

De Morbis Muliebribus.  
De Suppressione Menstruorum.  
C A P. I I I I.

**A** Suppressione igitur, immoderatoq; mensium profluio exordior, vtpotè ab illis affectibus propriis, quorum curatio non solum respicit Individui conseruationem, cui omnium maximè incumbendum est: uerùm etiam, quia eorundem cognitio & curatio summam lucem allatura est plerisq; aliis vteri Symptomatibus, tùm propriis tùm communibus, In quorum tractatione, sicut etiam in cæteris omnibus, cum ordinem mihi seruandum propono, qui ad docendum omnium maximè aptissimus futurus est. Ideò ab essentia propositi Symptomatis incipiam, ac proinde de forma, materia & causis efficientibus agam, internis inquam externis mediatis & immediatis: Vnde generationis modus clarè etiam elucescet. Secundò ex proposita essentia colligam omnes species ac differentias propositi mali: Tertio de proprietatibus talem essentiam consequentibus tractabo, signa adducendo, quibus propositum nobis affectum, non solum in genere cognoscamus uerum etiam singulas eius species distinguamus, mox ad curam descendam, eamq; non Empyricam, sed Dogmaticam, elicendo inprimis indicationes curatorias, præseruatorias & uitales, quibus sermo de prognostico succedet: tandem de auxiliorum materiis diligenter tractabo, chirurgicis inquam, pharmacericis & diæteticis. Cur autem tot & non plura uel pauciora confideranda sint, in propositis malis remouendis, artis medicæ finis clarè ostendere potest. Cùm enim in omnibus morbis propositis scopus sit præsentis remouere imminuentes præcauere, & vires custodire, atq; hos scopos consequi minimè liceat, nisi usu & recta administratione materierum medicinalium

Ordo tractandorū  
in singulis  
affectibus.  
Essentia.  
Differentia  
Signa.

Indica.  
Prognost.

Curatio.

Necessitas  
agendorum



dicinalium : hæ autem & si infinitæ propemodum sint, omnes tamen ex triplici fonte hauriuntur Chirurgico , pharmaceutico & diætetico , & proinde circa singulos sigillatim discurrendum erit, ut ad fontem Chirurgicum illæ præcipuè spectare uideantur, quæ in externis instrumentis consistunt, & ut administrentur, manuum operatione indigent. ad quem ordinem referri poterunt uenæ sectio , cucurbitulæ scarificatæ & non scarificatæ, hirudines, cauteria, uescicatoria, sinapismata, ligaturæ, frictions, partium in pristinum locum repositiones, ustiones, & huiusmodi. Ad fontem pharmaceuticum referuntur lenientia, præparantia, purgantia & cætera eius generis quæcunq; alterant & locum affectum roborant, siue hæc intus præbeantur: siue extra admoneantur. Ad fontem Diæteticum diriguntur recta administratio sex rerum non naturalium, aeris inquam cibi & potus & reliqua. Horum autem omnium usus quandoq; habetur cum prædictione, quandoq; non. Cum prædictione habetur in morbis lethalibus. citrà uerò in salubribus, in quibus futuræ salutis certa spes haberi potest, ut hinc prognosticum ortum habuerit: quod si bonum fuerit, audacter curatio aggredienda erit, si autem malum, cum Hippocrate solis prognosticis futuræ mortis egri relinquendi erunt: vel piè magis agentes omnia erunt tentanda, cum prædictione tamen futuræ mortis: hac enim ratione nosmet ipsos ac medicinam ab omni infamiae nota uindicabimus, & patientes uisitando simul consolabimur. Quapropter in pertractandis egris, prognosticum non erit negligendum, sed ex arte potius rei euentus prædicendus erit; quàm partem medicinæ D. Hippocrates tanti fecit, ut in quadam epistola ad Philopomenem, hanc ipsam cum vaticinatione comparauerit & æquauerit, ut non immeritò hæc medicinæ pars medicum etiam expostulet non vulgarem sed eximium, non

Emphy-

*Auxiliorū  
materiæ  
ex triplici  
fonte capiū  
tur.*

*Materiæ au-  
xilij chirur-  
gici.*

*Materiæ au-  
xilij ph.*

*Materiæ au-  
xilij diote-  
tici.*

*Pronosticū.*

## De Morbis Muliebribus.

*Eximius me-  
dicus qui.* Empyricum sed dogmaticum, non scientificum tantum,  
sed valdè exercitatum: ac proinde non sola ac nuda ob-  
servatione rerum peritum, sed ex ratione & summo iudi-  
cio omnia operantem, is autem ille est, qui nihil teme-  
rè agit, sed illa solum prosequitur quæ à subiecti morbi  
essentia & natura indicantur, vt hinc orta fuerit indican-  
tium & indicationum inuentio, prohibentiumq; permit-  
tentium consentientium & moderantium cognitio, quæ  
*Indicatio.* sola, auxilia rectè operandi nobis demonstrant: quare de  
Indicationibus & annexis, agendum. Cæterùm Indica-  
tio, cum de genere eorum sit quæ ad alterum referuntur,  
*Indicantia* nempe ad ipsum indicans, tale autem triplex potissimum  
sit, morbus scilicet, causa morbi & virtus: ideò ante  
omnia cognitio morbi, causarum & virtutis præmitten-  
da est, ut ex morbi cognitione, indicationes curatorias  
*Indicatio 3.* hauriri possimus, ex causis, præseruatorias, & ex virtu-  
te conseruatorias. Tandem cum rei cuiusq; essentia per  
vocem propriam significetur, sæpeq; contingat, quid no-  
minis latere uel æquiucationem continere, ideò ad tol-  
lendā nominis multiplicitatē vel obscuritatem, ab ipsius  
notione exordiendum erit.

## De voce. CAP. V.

*Nomina af-  
fect. omniū  
à quibus.  
A loco affe-  
cto.* CVM nomina temerè non sint rebus imposita, iurè  
cogitandum est, morborum ac Symptomatum vo-  
ces non à calu sed consultò fuisse inuentas, ut non im-  
merito Gal. 2. Methodi 2. dixerit, quòd omnia mala,  
quæ humano corpori adueniunt, nomen desumunt vel à  
loco affecto, vt pleuritis à membrana pleura ita vocata,  
quæ in hoc affectu inflammatoria compunctione affici-  
tur, sicut peripneumonia à pulmonum inflammatione,  
podagra à pedum vitio, nephritis à renibus, arthritidis  
ab articu-



ab articulis, ophthalmia ab oculis, cephalalgia à capite, & Dysenteria ab intestinorum ulcere : Secundò capiuntur nomina ab aliquo Symptomate, ut ileos à tenuiori intestino affecto, paralytis à resolutione nervorum, Apepsia à difficultate spirandi, Tenesmus à cupiditate deliciendi uel capiuntur ab utrisq; , id est, à loco affecto & Symptomate, ut Cephalalgia & Othalgia id est, aurium dolor, Estiralgia id est, meri dolor. Rursus affectus, qui à Symptomate denominantur, nomen accipiunt ab actione læsa, à qualitate mutata, et exeunte mutato. Si à læsa actione tripliciter, ablata uidelicet, ut Syncopis & Apoplexia: uel diminuta ut lypothymia & cruditas, uel à deprauiata, ut tremor, tussis, singultus. Si ab exeunte mutato, denominatio fiat, erit ut sputum sanguinis, lotium cruentum, & huiusmodi. Si à qualitate mutata erit ut febris, icteritia & cetera eius generis. Præterea capiuntur etiam nomina ab externarum rerum similitudine, ut cancer, Elephantiasis, Polypus, satyriasis, Ophiasis, Alopecia & tinea. Vel deniq; nomina capiuntur à materia faciente morbum, ut calculus, cholera, melancholia, & reliqua. In quo genere collocatur etiam suppressio menstruorum: quod nomen ita proprium est huic affectui, ut cum aliis rebus præter naturam ullam conuenientiam habeat. At si secundum communio-rem suam notionem acciperetur, facile cum aliis conueniret: si enim capiatur, ut est quid distinctum à rebus naturalibus, communissima uoce res præter naturam uocaretur, & hoc modo non distingueretur à morbo, causa & Symptomate. Si autem consideretur ut ex eorum genere quæ morbum sequuntur Symptoma nuncupabitur: sed tunc non distinguitur ab aliis Symptomatum generibus, nempe à læsa actione, qualitate mutata & exeunte mutato. Si consideretur ut consequitur opus, materiam uidelicet genitam, dicetur Symptoma secundum, ad differen-

C tiam

*A sympt.*

*A læsa actione.*

*Ab exeunte mutato.*

*A qualitate mutata.*

*Ab externorum similitu.*

*A materia.*



## De Morbis Muliebribus

tiam primi, cuiusmodi est Symptoma in laesa actione. Ut uerò hæc materia genita præter naturam intus detinetur, Symptoma dicetur in exeunte mutato, in quo intus cohibetur, quòd foras exire deberet. Cuius uox adhuc communior est, quoniam cum plerisque aliis Symptomatibus eiusdem generis conuenit. Tandem hoc Symptoma ut respicit determinatam speciem materiæ cohibitæ, nempe menstrualis, proprium nomen desumens, uocabitur suppressio menstruorum, quæ uox ita est propria huic affectui ut per hanc à cæteris omnibus clarè distinguatur. Vocatur autem mensium suppressio, quia in muliere secundum naturam se habente materia ista singulo mense effluere debet, cuius materiæ fluorem, quidam flores appellant, ea ni fallor, de causa, quia mulier cum nata sit ad procreandam sobolem, non prius est apta concipere, quàm appareant menstruæ purgationes, quæ sunt sicut flores arborum, qui fructus antecedunt, quæ sicut prius fructum producere nequeunt, nisi flores antea appareant: sic mulieres nunquam antea concipiunt, nisi menses fluxerint. Vulgares tempora uocant, quoniam hæc purgatio in muliebribus statutis quibusdā temporibus obseruatur. Alii uocant malam septimanam, uel quia hæc fluxio septem diebus perdurare solet, uel etiam, quia per integram hebdomadam mulier aliquid molestiæ patitur. Cæterum ut omnis æquiuocatio circa hanc uocem tollatur, illud etiam adiiciendum erit: hic sermonem futurum esse de suppressione mensium morbosa, & præter naturam, ad illius differentiam, quæ naturaliter fit, quemadmodum contingit in prægnantibus & lactantibus, in quibus hæc materia degenerat in alimentum uel concepti fœtus, ut in prægnantibus, uel pueri nuper nati & lactantis, ut in lactantibus contingit, & si accadat, ut in iis menstrua quandoq; fluant, alterum duorum fieri solet, ut ex parte prægnantium abortum

*Vocis explic.*

*Suppressio. dupl.*

*14. de usu par.*



abortu patiantur, uel saltem foetus imbecillior formetur quorum utrumq; ob alimenti defectum contingit. In lactantibus vero generatio lactis cessat, uel saltem imminuitur. Hæc de nomine.

De Essentia. CAP. VI.

**A**B explicatione vocis deuenio ad subjectæ rei essentiam explicandam, quæ cum in forma & materia consistat, ideo quæ sit propositi Symptomatis forma & quæ materia, expendere oportet: deinde uero quæ eiusdem sint causæ effectrices omnes & occasiones diligenter inuestigabo. De finali autem causa nihil dicendum occurret, quia in rebus præter naturam locum habere non uidetur. Quo ad formam spectat ex dictis satis constat, quod hæc suppressio est quid præter naturam, non tamen in genere morbi vel causæ, sed Symptomatum, & in eorum genere, quæ in exeunte mutato consistunt, in quo scilicet intus cohibetur, quod pro naturæ modo effluere deberet. Cæterum hæc materia, quæ præter naturam intra corpus retinetur, cum esse possit uapor & uaporis minera, constat etiam eam non esse vaporem, sed potius mineram, cum exeundo sensibus conspicua illa appareat, non propterea negandum est, quod talis materia intus detenta, caloris ui in uaporem assiduò non attollatur, hæcque ratione sensim minuatur & dissipetur, quod certè si non fieret, breui tempore in tanta copia aggregaretur, ut necessarium esset, mulierem frequentius pati menstruorum fluxum, uel à nimia illorum copia suffocari, aut ex superueniente putredine & malignitate, febribus, lypothymia, Syncopi, apoplexia, & aliis eius generis Symptomatibus perpetuò subiici, ut sæpè etiam aliquibus contingere uidemus, & illis præ

Forma.

L. de differentis symptomatum: ultimi: 3. de symptomatum: causis 4.

Essentia materię cohibita.

C 2 ci-

## ❧ De Morbis Muliebribus ❧

*Materia cor-  
pulenta.*

*Materia ex-  
cremēticia.*

*Materia in-  
util.*

tipuè, in quibus ob uitam ociosam talia excrementa mul-  
tiplicantur, præsertim si in uiuendi ratione etiam pluri-  
mum delinquant : rarius aut unquam illis accidunt, quæ  
in uictu rectè se gerunt, uel saltem plurimis exercitiis  
aggregationem superfluitatum prohibent, aggregatasq;  
dissipant atq; dissoluunt : uel etiam purgantibus medi-  
camentis illas educunt. Cum igitur hæc materia intra  
corpus cohibita corpulenta sit & humorosa, ulterius quæ-  
rendum occurrit an sit alimentalis uel excrementitia. Sa-  
tis autem constat, alimentalem esse non posse, quia suc-  
cus esset sanguineus, pituitosus, biliosus uel Melancho-  
licus : quorum quilibet in corpore proprium habet usum,  
ideò retinetur, quoniam ex dictis succis corpus & par-  
tes eius nutriuntur : pro quarum diuersitate in substan-  
tia & temperatura, necessaria fuit succorum alimenta-  
lium diuersitas, quorum nullus esse potest materia hæc  
menstrualis, quod fuit in causa, ut prouida natura in  
muliere nec prægnante nec lactante, tale genus excremen-  
ti statutis temporibus expurgaret. Cæterum materia ista  
excrementitia cum duplex esse possit, utilis & inutilis,  
prioris generis minimè erit : quoniam uel utilis foret  
pro conseruando Individuo, ut lac, uel pro conseruan-  
da specie, sicut est semen, quorum neutrum est materia  
ista menstrualis, non tamen negauerim, quod post par-  
tum materia illa, quæ in menstrua uerteretur, in lac non  
degeneret, quod puero nutriendo accommodatissimum  
est alimentum. At hoc loco sermo est de suppressione  
menstruorum præter naturam, consequenter in  
muliere non lactante aut prægnante, quæ  
singulis mensibus aggregata tan-  
quam inutilis per uterum na-  
turaliter expelli debet;  
cuius autem coctio  
nis illa sit opus, sequens caput declarat.

*Men-*



*Menstruum esse excrementum secundæ  
coctionis. CAP. VII.*

**C**VM igitur hæc materia sit excrementum inutile, *Excrem. tri-  
plex.*  
oportet esse primæ, secundæ aut tertiæ coctionis  
excrementum. Primæ esse non potest, cum non sit  
nec tenue nec crassum, accedit quod hoc genus excre-  
menti in intestinis recipitur, & per infernum os expurga-  
tur, per uterum uerò neutrum euacuatur. An uerò ex-  
crementum sit secundæ uel tertiæ coctionis. dubium ef-  
se uidetur apud medicos, ut Galenus quandoq; in ea re,  
sibi inconstans uideatur, quam difficultatem hoc loco li-  
benter prætermitto, quoniam diffusius in libro de prin-  
cipiis nostræ generationis tractaui. Quare satis hic erit  
propositæ difficultatis ueritatem proponere, & quibus-  
dam rationibus illam confirmare. Statuendum erit igitur, *Mestr. ex-  
crem. esse  
secundo coc.*  
talem materiam excrementum esse secundæ coctionis,  
quæ in Epate & uenoso genere habetur. Commune .n.  
est omnibus partibus corporis, humores generantibus,  
eos utiles producere, uel sibi ipsis ut conseruentur, aut *Lib: d form:  
fetus C.4.*  
pro aliis partibus generationis gratia ut semen, uel pro  
fœtus nutritione ut sanguis menstruus, ita ut humores,  
qui post cuiusq; partis nutritionem supersunt, earum  
partium sint superfluitates, & cum illis similitudinem *5. aph. 39.*  
naturæ seruant: huiusmodi erit in testibus semen, in mā-  
mis lac, in ventriculo pituita, in articulis humor gluti-  
nosus, in ossibus humor albus in cauernis contentus,  
in carne pulmonis humor spumofus: sic deniq; in Epate  
erit sanguis, cuius superfluitas, quæ pro reliquarum  
partium alimento, necessaria futura non est, menstrualis *Ratio prima  
da.*  
materia euadit, quæ per uterum debitis temporibus ex-  
purgatur. Quod ipsum confirmat etiam rubeus color,  
quo materia hæc menstrualis prædita est: quare erit su-  
perfluitas

## De Morbis Muliebribus. 20

*Ratio tertia* perfluitas sanguinis , conſequenter excrementum ſecundæ coctionis. Præterea ſi locum conſideremus, ubi ſanguis menstrualis continetur , & per quem expurgatur , cum in uenis contineatur & per uenas . Vteri expurgatur, non aliter dicere poſſumus , niſi excrementum eſſe primorum humorum, qui in uenis continentur, & membris nutriendis nondum ſunt delegati. Hinc fit, quòd mulieres quamdiu conſuetas uteri purgationes ſeruant, nullam aliam ſanguinis euacuationem ſponte naturæ factam patiuntur, nec per nares nec per marifcas , at conſuetam menſtruorum purgatione cohibita, illius copia & qualitate natura grauata & irritata, conſuevit per alias partes talem ſuperfluitatem euacuare, ut quandoq; experientia compertum fuerit, quaſdam mulieres , quibus menſtrua erant ſuppreſſa, copioſum ſanguinis uomitum habuiſſe , & maximo naturæ iuuamento, at meſtruis denuo ſuperuenientibus ſolutio fit .

*Ratio quarta.* Quapropter materia hæc menstrualis, ſicut alia quæcunq; ſanguinis fluxio per alias partes facta, primorum humorum ſuperfluitas erit, qui in ſecunda coctione generantur . Tandem etiã ea confirmatio addi poteſt, quæ ſumitur ab obiecto tertiæ coctionis & excrementis eius, nam obiectum tertiæ coctionis ſunt humiditates ſecundæ, quæ ex capillaribus uenis exeuntes nutriendis membris delegantur, à quibus nouam coctionem acquirentes , longè aliam formam ac ſpeciem ſuſcipiunt , ab illa quam antea retinebant, dum in uenis eſſent , & ſecundæ coctionis opera ſubeunt quoniam amittunt ſubſtantiam fluidam & in membris conſiſtentem acquirunt, rubeum colorem deponunt, & album induunt, partibusq; nutriendis omninò ſimiles ſunt : cuius tertiæ coctionis excrementa tenuia per halitum inſenſibilem uel ſudorem expurgantur , craſſiora verò in pilos uel in ſorditiem degenerant . Quorum excrementorum neutrum accommodari poteſt ſanguini

*Hyp. 5. aph.*  
31.

*Ratio quinta.*

guini



guini menſtruo , vt tandem iis omnibus rationibus concludendum ſit, ſanguinem menſtrum excrementum eſſe ſecundæ coctionis, qua verò ratione peccet, & peccando excitet expul. ſtatim declaro.

*Menſtrum excrementum eſſe quantitate et qualitate peccans. CAP. VIII.*

QVòd autem materia hæc menſtrualis per vterum ſingulo menſe expurgata, quantitate inprimis peccet, plura oſtendunt. Primò quia intus à natura non retinetur, ſed potius ſingulis menſibus tantum ſibi onus euacuatur. Secundò, quia cum beneficio totius corporis talem euacuationem molitur. Accedit, quòd ex illius retentione natura multa & moleſta Symptomata patitur, ut quemadmodum per illius copioſæ materiæ præſentiam corpus totum grauatur: ita per eiufdem abſentiam ſponte naturæ factam ſubleuatur, quod eſt materiæ copioſæ argumentum. Quod autem tale menſtrum non ſolum quantitate verum etiam qualitate peccet, atq; illa tùm manifeſta tùm occulta, multa teſtari poſſunt. Inprimis quòd manifeſtis qualitatibus peccet, exeundi modus patefacit, poſteaquam non ſine moleſtia & viarum aliqua mordacitate effluat, quod certè illius exceſſum in calore oſtendit. Id ipſum confirmare etiam poteſt coitus per illud tempus factus: quoniam ex contactu huius materiæ, virile membrum non modò ruborem, verum etiam excoriationem circa præputium pati ſolet, quod pariter excedentis caloris indicium manifeſtum eſſe poteſt. Cum igitur hæc materia quantitate & qualitate peccet, mirum eſſe non debet, ſi ſenſim illa aggregata & ad determinatum ſuæ quantita-

*Menſtrum  
peccare co-  
pia.*

*Ratio prima  
Ratio ſecun-  
da.*

*Ratio tertia*

*Menſtrum  
peccare  
qualit. ma-  
nifeſta.*

*Ratio prima  
Ratio ſecun-  
da.*

tis

## De Morbis Muliebribus. 20

tis terminum peruenta, quem citra maiorem molestiam diutius sustinere non potest, expulsionem per uterum tentet & moliatur, ad quod peragendum natura excitatur, tum ab illius copia grauata, tum ab eiusdem qualitate acriori irritata, quod munus quamdiu integrè & statutis temporibus absoluerit, depurata vniuersa humorum massa, tam diu est corpus hoc integra sanitate potitur:

### Sanguinem menstruum peccare occulta qualitate. CAP. IX.

*Menstruum an sit ueneficum.* **A**N verò sanguis menstruus præter manifestas qualitates, occulta etiam & uenefica præditus sit, & secundum illam agat, difficultas esse potest. Si namq; hæc materia uenefica esset, mirum videri deberet, quomodo integro mense in corpore detineatur, citra aliquam illius corporis molestiam insignemq; noxam. Augetur adhuc magis difficultas, quia dum consuetum suæ purgationis tempus pertransit, maiorem prauitatem acquireret, ex hac etiam diuturna mora vehementiorem agendi corrumpendiq; vim sibi ascisceret, ratione cuius, non solum corpus, in quo illa retinetur magis immutare deberet: uerum etiam corrumpere & interficere, quod tamen minimè obseruamus, cum multæ mulieres reperiantur, quibus talis consueta euacuatio supprimitur, quæ tamè à propriis negociis non desistunt, sed sanitate fruuntur, & diutius uiuunt. Ex altera uerò parte non desuere, qui affirmauerint, menstruum sanguinem, non solum esse excrementum inutile, quantitate & qualitate simpliciter peccans, sed etiam corruptum, malignum & ueneficum esse vel saltem agendi potestate ac uiribus veneno ualdè affine: nam præter id, quòd statis temporibus per consueta loca

*Ratio prima*

*Ratio secunda*

*Fernelius 7. suæ physilogiæ ca. 7.*



ta loca luna decreſcente, non effluit à purioriꝫ; ſanguine, cui eſt permixtus non ſecernitur: Accedit etiam ra-  
ta loca luna decreſcente, non affluit à prioriꝫ; ſanguine,  
cui eſt permixtus non ſecernitur: Accedit etiam ratio  
deſumpta ex illius operationibus uitę corruptiuis, quę  
certè non illius modò inutilitatem oſtendunt: uerùm  
etiam malignitatem & ueneficam naturam detegunt: quo  
enim tempore mulier menſtruam purgationem patitur,  
non ſolùm illius uniuerſum corpus diſcoloratnm reddi-  
tur: uerùm etiam imbecillius efficitur. imò in alienum  
corpus agens naturalem illius diſpoſitionem euertere &  
corrumpere pòteſt: nam tempore quo menſtrua hæc flu-  
unt, uapor, qui ex tali materia cleuatur, obiectum ſibi ſpe-  
culum ſcædare, inſicere, eboriſq; nitorem obſcurare ſo-  
let: & uino pariter permixtus, totùm corrumpere uide-  
tur: imò quòd maius eſt, ſi ab hac ipſa materia ſemina  
tangantur, uel in lotio menſtruatę mulieris prius in-  
fundantur, & terrę mandentur, nihil generant, ſed ſteri-  
lia euadunt: & plantę adhuc tenellę ab hac ipſa materia  
contactę, læſionis ſemel ſuſceptas notas perpetuò ſer-  
uant, uel potius areſcunt & moriuntur. Præterea hic ſan-  
guis ſi à canibus guſtatus & deuoratus fuerit, rabie affi-  
ciuntur, homines uerò ex eodem epoto in comitiale  
morbum, Elephantiaſin, pilorum deſluuium & huiusmodi  
incurrunt. Et conciliator teſtatur pariter quòd ex hoc  
menſtruo epoto homo euadit ueluti præſtigiatus, maleſi-  
ciatus, obliuiſus & lunaticus, cuius cura inquit, eſt po-  
tare margaritas frigidas tritas ad 3 r. cum aqua Meliſſę, &  
in aqua tepida balneari, cum puella coire, & cùm puel-  
lis conuerſari, & eius Bezoar eſt comedere uiperas præ-  
paratas. Hoc ipſum deniq; magis confirmatur ex illarum  
etiam rerum euentu, quę iplismet mulieribus contin-  
gere ſolent. ſi namq; prægnans mulier fuerit, & alterius  
mulieris menſtrum partes ad yterum pertiñentes obli-

D niatur

*Menſtrum  
eſſe uenefi-  
cum.*

*Ratio prima  
Ratio ſecun-  
da.*

*Ratio tertia*

*Ratio quar-  
ta.*

*Lib: de Ve-  
nen: cap:  
73.*

*Ratio quin-  
ta.*



## De Morbis Muliebribus

*Solutio quaestio-  
nis.*

*Sang. mestr.  
2. posse con-  
sid.*

niatur, abortum patietur: si autem Vtero non gestaue-  
rit, concipiendi uis ei adimetur. Pro huius difficulta-  
tis resolutione distinguendum nobis est, de sanguine me-  
struo, de quo cum queritur, an excrementum sit uel ali-  
mentum: & si excrementum, an utile uel inutile, & si  
inutile, an sola copia uel qualitate peccet, & si qualitate,  
an Elementalī solum, uel etiam uenefica, sermo esse po-  
test, uel in muliere nō prāgnante nec lactante, uel in prē-  
gnante et lactante. Si primo modo dupliciter adhuc in-  
telligi potest, de muliere uidelicet, in qua ratio tempo-  
ris à natura constituta seruatur, pro tali purgatione fa-  
cienda, uel de illa in qua eadem purgatio prater naturā  
cohibita est, Si de muliere primo modo intelligatur, sta-  
tuendum erit, talem sanguinem excrementum esse, quan-  
titate & qualitate peccans, ad differentiam prāgnantis, &  
lactantis mulieris, in quarum altera euadit alimentum  
fœtus in utero gestati, & aliqua ex parte excrementum  
sola quantitate peccans, est quidem alimentum secun-  
dum eam portionem ex qua fœtus toto gestationis tem-  
pore nutritur, augetur & perficitur. Est autem excre-  
mentum sola copia peccans, respectu eiusdem mulieris,  
in qua generatur, & per id gestationis tempus aggrega-  
tur, quod deinde tempore partus expellitur: quæ uidetur  
fuisse clara Galeni sententia, 14. de usu partium cap. 8.  
2. de semine cap. 21. 5. Aphor. 60. In muliere autem la-  
ctante idem sanguis uertitur in lac, quo fœtus in lucem  
iam editus alitur, qua ratione erit pariter alimentum &  
excrementum utile sola quantitate redundans, ita ut re-  
spectu pueri lactantis alimentum sit, respectu autem  
mulieris in quo generatur, utile excrementum  
erit. Si uerò sermo fuerit de muliere non lactante  
nec prāgnante, & de illa imprimis, in qua men-  
strua secundum naturam fluunt, hic sanguis non solum  
erit excrementum, sed etiam excrementum simpliciter in-  
utile,



utile, ac proinde quantitate ac qualitate peccans. De-  
claro utrumq; & primò quòd excrementum sit patet  
quia alimenti ratio & vsus illi non competit: siquidem ali-  
mentum ratione similitudinis quam cum ipso alito habet,  
intra illius corpus nutritionis conseruationisq; gratia re-  
tinetur. Contra excrementum propter dissimilitudinem  
cum alito ab illo secernitur, ullumq; nutritionis usum in  
corpore retinens, tanquam inutile foras propellitur,  
cuius expulsio cum in his mulieribus, singulo mense per  
uterum à natura fiat, iurè concludendum, talem san-  
guinem excrementum esse inutile. Accedit & ea ratio  
quòd si esset excrementum vtile, uel vtile foret pro spe-  
ciei propagatione, cuiusmodi est semen, vel pro Indiu-  
duo nuper genito sicut est lac: at hic sanguis in his mu-  
lieribus neutrum præstat, sed sponte naturæ à corpore se-  
paratur. Idem confirmatur argumento desumpto à iuuan-  
tibus & lædentibus: quandoquidem illud excrementum  
inutile existimatur, quod in corpore per sui præsentiam  
est onus ipsi naturæ, & per sui absentiam & euacuatio-  
nem illa eadem exonerata subleuatur huiusmodi

*Cōfirmatio.*

*Cōfirmatio:*

autem est talis sanguis, Ergò &c. ubi enim ta-

le genus excrementi, præter debitum na-

turæ modum in corpore retinetur

corpus hoc multum grauatur,

& molestia afficitur: eius

dem uerò expurga-

tione peracta,

ab om-

ni

pondere ac molestia liberatur, pristinumq; ro-

bur acquirit, quod planè argumentum

est, huiusmodi sanguinem, non

solum excrementum esse,

verum etiam inutile.

D 2 San

De Morbis Muliebribus

*Sanguinem Menstruum inutile excrementum esse ratione copiae et qualitatis. CAP. X.*

*Quantitas.*

*Qualitas.*

Cæterum excrementum inutile cum multis modis molestiam corpori inferre possit, præcipuè verò si in quanto & quali peccauerit, utriusq; ratione hic sanguis inutile excrementum erit, & primò ratione quantitatis, quod illius generatio & copiosa euacuatio ostendit: ut merito generationis constet, generari & tanquam inutile excrementum in eodem corpore copiosius aggregari: nam post sanguinis distributionem, in omnes corporis partes nutriendas mediantibus uenis factam, quod superfluum futurum est, & post uenarum nutritionem superest, retinetur, & unius mensis spacio, in uena caua copiosè coaceruatur, ut illius pondere grauata natura post illud tempus ipsum expellat, cuius copiosam expulsionem molitur per uenas uteri, ut in quibusdam mulieribus talis euacuatio septem & octo diebus perduret, quod certè non nisi magnam copiam demonstrat: quod autem idem sanguis mala qualitate affectus sit, & primò manifesta & calidiori, illius exeundi modus ostendit, deinde uerò effectus molestus inde productus, si modum exeundi consideremus excrementa omnia, à corpore separari solent cum iucunditate uel cum molestia: cum iucunditate illa exeunt, quæ omnem naturæ modum seruant in quanto quali & opportuno exeundi tempore: hinc est quòd in sanis corporibus excrementorum omnium secundum naturam facta euacuatio non solum cum iucunditate fit, sed etiam cum beneficio corporis expellens, ut patet discurrenti per excrementa singularum coctionum. Contra uerò excrementa, dum præter copiam

*malam*



malam etiam qualitatem coniunctam habent, fieri ullo modo potest, quin eorum exitus, non sit aliqua ratione molestus, sicut clarè observatur in mulieribus, tempore quo per vterum menstrua exeunt, quoniam non nisi cum molestia effluunt, quæ aliunde non causatur, quàm à caliditate & acrimonia materiæ exeuntis: idè mulieres, quo tempore sua hæc purgatio perdurat, aliquid noxæ patiuntur, floridumq; colorem magna ex parte amittunt.

*Qui sanguis menstruus prava et occulta qualitate peccet. CAP. XI.*

**S**I autem sermo fuerit de illo sanguine menstruo, qui statutis temporibus & secundum naturam non expurgatur, sed intus et præter naturam diutius detinetur, tunc aliam praviorem & occultam qualitatem concipiet, ex illius enim longiori in corpore mora, ita alterari quandoq; solet, & à propria natura recedere, ut veneficam etiam naturam acquirat, ratione cuius, non solum alienis corporibus nocet, specula scedando, eboris nitorem turbando, uina corrumpendo, tenellas herbas & semina comburendo & sterilia reddendo, brutisq; animalibus ac deniq; ipsis hominibus variis mirisq; modis nocendo, sed maximas etiam molestias proprio corpori, in quo generatur & diutius retinetur asferre solet: ut hinc nausea, inappetentia, dolores, uertigines, apoplexia, synopes, matricis deniq; præfocationes ortum habeant: quæ omnia contingere etiam solent quando mulier tempore fluxionis menstruorum uiro coniungitur, & imprægnatur: tunc enim susceptum semen ab huius menstrui permixtione ita alteratur & coinquinatur, ut pravam illius

*Quod menstruum veneficam sit*

*Hereditarium morborum origo.*

## De Morbis Muliebribus.

*Morbilloꝝ  
origo.*

lius qualitatem recipiens, uitiatæ eiusdem naturæ impres-  
sionem uim ac proprietatem diu seruet ac retineat, ratio-  
ne cuius fœtus tali qualitate informatus bonum alimen-  
tum sibi adueniens in prauum etiam conuertat, hinc  
morbilli, uariolæ & pleræq; aliæ cutaneæ infectiones nō  
aliunde in natis corporibus nascuntur, quàm ex huius  
sanguinis impuritate ac prauitate: siquidem sanguis iste  
in fœtus formatione ita uiuiatus, suæ prauitatis naturam  
in eo diu seruat, & occultè custodit, donec tandem per  
longam sui digestionem exaltetur, in uariolasq; , morbil-  
los & cætera id generis, tandem efflorescat, qui tamen  
sanguis non æquè in omnibus & semper hanc suam oc-  
cultam prauitatem patefacit, nec eandem prauitatis spe-  
ciem in omnibus ostendit sed in quibusdam longiora,  
in aliis breuiora suæ digestionis tempora retinens, pro  
prauitatis intensione Symptomata etiam, modò tardius,  
modò citius, nunc uehementiora, nunc remissiora produ-  
cit, quod contingere solet, quando uis illa menstrui in  
uniuersa sanguinea massa delitescens, exaltari incipit, &  
maiores agendi uires in calorem acquirere, qui deinde ita  
excitatus aduersus hostem pugnam aggreditur, & pu-  
gnando omni conatu innititur, ut superet, quod  
tunc fit, quando in totam sanguineam massam agens,  
partes omnes hæterogeneas, & praua illa qualitate  
infectas, separat, & instar multi illius quasi spumam te-  
nuioresq; halitus à centro ad circumferentiam transmit-  
tit, & per cutim vniuersam in variolas & morbillos de-  
generat: crassiora uerò illius sedimenta per uomitum &  
aluum deiecit, quam prouinciam si integram absoluerit,  
& sanguinem ab omni impuritate defecauerit, superato  
interno hoste victoriæ & sanitatis insignia deportabit: ab  
hac uerò prouincia si natura ex toto uel maiori ex par-  
te impedita fuerit, succumbet & uitam cum morte  
commutabit.

Qualis



*Qualis sit prauitas menstrui sanguinis .*

*C A P. XII.*

**Q**uamuis sanguis menstruus praua qualitate præditus sit, non tamen in omnibus mulieribus eiusdem est rationis & malitiæ, sed alia est prauitas in muliere quæ singulo mense expurgatur, alia uerò in illa, quæ ultra præscriptum naturæ tempus eum detinet. In priori siquidem muliere vitium est mite & manifesta potius qualitate peccans, quàm occulta & uenefica, ut ob id mirum etiam non sit, si in eodem corpore, in quo generatur & aggregatur, sui præsentia exiguum uel ullum nocumentum inferat : nec obstat si quis obiiciendo dixerit, huius etiam sanguinis effectus prauos admodum esse, cum suo contactu semina sterilia reddat, uirentes herbas exiccet, uinum corrumpat, & cætera id generis malâ apertè faciat, quæ uenenis conuenire uidentur, quia non inconuenit, ut id quod uni est familiare & simile, alteri sit inimicum & contrarium : helleborus enim homini est medicamentum, coturnicis alimentum, & in eodem corpore bilis est uesicæ familiaris, cæteris uerò partibus dissimilis, & sua contrarietate molesta. A pari dicendum de sanguine menstruo, qui in eo corpore, in quo generatur & secundum naturam expurgatur, ullam noxam illi inferre uidetur : in alieno autè corpore, quod noceat, mirari non debemus, ob dictam rationem. Si autem sermo fuerit de illo sanguine menstruo, qui secundum naturam non expurgatur, sed diutius & præter naturam intra corpus cohibetur, hic certè longè prauiorrem qualitatem habebit, quam ex longiori in corpore mora sibi contrahit, ut ueneficam etiam naturam acquirere possit, ratione cuius, non solum alienis corporibus nocet,

*Prauitas  
Mest.2.*

*Obiectio.*

*Solutio.*

## De Morbis Muliebribus. 20

*Prauitas  
mestruī nō  
semper nocet.*

*Causa mul-  
tip.*

nocet: sed proprio etiam minimè parcit, ut hinc oriantur præfocationes matricis, apoplexia, animi deliquia, & cætera perniciofa & lethalia Symptomata enarrata. Cæterum notandum, quòd talis sanguis ita uiolenter in corpore detentus, licèt ei noceat, & uehementia Symptomata parere possit, hoc tamen perpetuò non contingit, & in singulis corporibus necessariò aduenit, cum multæ mulieres reperiantur, quibus menstrua diu non fluunt, integra tamen sanitate fruuntur: quod dum accidit, cogitandum est illud euenire non ratione huius materiæ, quæ in diuersis mulieribus diuersæ rationis sit, ut in una prauam retineat qualitatem, in alia verò non, cum in omnibus eandem formam habeat & agendi potestatem: Sed in alias causas diuersitas hæc referenda erit, eaq; multiplex esse potest. Inprimis quia hæc materia, etiam si per vterum non expurgetur, ut expurgati deberet, à natura tamen per alia loca transmittitur, ut per fluxum sanguinis narium, per hæmorrhoides, uel etiam purgantibus medicamentis educitur, siue per secessum illa purgaue- rint, uomitum, lotium, sudorem, uel insensibiles habitus, siue etiam talium prauorum humorum inanitio facta fuerit, ualidioribus exercitiis, ut in rusticis sæpè contingit, siue ex tenuiori diætâ aut ieiuniis idem eueniat. At si hæc non præcesserint, sed consueta euacuatio ita supprimatur, ut in corpore aggregata in eodem etiam detineatur, nec aliquo ex dictis modis minuatur, uel omnino expurgetur, tunc ratione diuturnioris moræ, quàm in tali corpore præter naturam habet, putredinem & malignam qualitatem concipiet, unde etiam ortum ducunt morbi pessimi, & sæua Symptomata, atq; hæc diuersa erunt, pro diuersitate locorum, ad quæ illa decumbit, ut si hæc materia per totam corporis circumferentiam diffusa fuerit, non solum pruritus, sed & scabiem, lepram & Elephantiasin producere potest: si in partem



partem determinatam decuberit, ut in cor, palpitationē,  
lypotheriam & Syncopin facere consuevit : si caput  
petierit, dolorem, uertiginem Epilepsiam, appoplexiam, &  
uaria deliorum genera efficiet, si epar aut lienem de-  
tinuerit, obstructions, tensiones, tumores & scirrhos pa-  
riet: si uterum magis occupauerit, præter dictos mor-  
bos, conuulsionem, ulcera & cancos illi inferre poterit.  
Hæc igitur & similia in illis potissimum mulieribus  
contingunt, in quibus copiosior materia aggregabitur,  
& ex diuturniori mora prauiores conditiones acquireret,  
quemadmodum illis contingit, quæ uitam suam in otio  
potius, quàm in negotio degunt, uel in uiuendi ratione  
plurimum delinquant, in genere inquàm ciborum, in  
quâtitate, qualitate, tēpore & modo, præterea huius diuer-  
sitate ratio ex eiuldem materiæ cruditate & coctione de-  
summi etiam potest, in quibusdam n. semen Sympt. bre-  
uiora habet sue digestionis tempora. in aliis longiora. in  
non nullis etiam perpetuam seruat erudit. hinc Sympt.  
oriuntur tempestiua tarda, & nullo etiam tēpore apparētia.

*De sanguine Menstruo in Muliere  
prægnante & lactante.*  
CAP. XIII.

SI autem sermo fuerit de sanguine menstro in mu-  
liere prægnante & lactante, longè aliter decernendū  
erit. Quo enim ad prægnantem mulierem spectat, cum  
Auicenna statuendum est, eius sanguinem menstruum,  
non esse omninò uniformem, homogeneum, & laudabi-  
lem, sed difformem, heterogeneum, & triplici substantia  
conflatum, alimentali scilicet, & benigniori, ex qua fœ-  
tus nutritur, excrementitia, quæ ad nutritionem & la-

*Sanguis me-  
struus 3.  
Parte con-  
stat.*

E tis

## De Morbis Muliebribus

His generationem nihil confert, & hæc portio ea est, quæ toto gestationis tempore, sensim aggregatur in tunicis ipsius fœtus, ibiq; quæta seruatur, usq; ad pariendi tempus, cui eam utilitatem asserre uidetur, ut uias humectando & lubricando, faciliorem partum reddat: quæ uerò post partum superest, cum nullius amplius sit usus, per uterum expurgari tota debet, quòd cum contingit, mulier integra fruitur sanitate: at si tota hæc portio uel aliqua illius pars contra naturæ leges intus detineatur, putredinem concipere solet, & putrescendo febres & alia maiora Symptomata causare consuevit: ideò in parientibus studium nostrum esse debet, ut dum sponte naturæ hæc euacuatio non succedit, omni industria & arte illam promoueamus. Cur autem natura hanc portionem ita inutilem prius non euacuet, sed toto gestationis tempore illam intus detineat, ratio esse potest, quoniam si tempore gestationis, materia ista euacuaretur abortus etiam succederet, tertia portio bona est & laudabilis, sed non in quocunq; tēpore, sed magis circa finē formati fœtus, ut ex hac lac generetur pro puero cōseruādo hinc mamarum cum matrice colligantia & magnus consensus ortum habuit. cum prouida natura per eadem communia uasa ambas partes coniunxerit, quæ gestationis tēpore alimenti materiam deferendo, conformando augēdoq; fœtui tantum inseruiunt, quo iam perfectio & editio, idem alimentum per easdem communes uenas sursum ad mamillas fertur, ubi per nouam cōctionem quam ibi recipit, in lac degenerat quod genitū fœtus conueniens alimentum est.

*Monitum.*

*Petitio.*

*Responsio.*

*4. De usu  
par.*

### *Improbatio modernorū. CAP. XIV.*

**H**inc Fernellii sententia explodenda est, cum nullo discrimine statuerit, sanguinem menstruum in mulie-

tc



re tùm prægñante tùm non prægñante vitiosum esse, & à puriori ita repurgatum, ut non modò tanquam inutilis à natura separetur: verùm etiam vt veneficus habeatur, concludens ex huiusmodi sanguine ullo modo fœtum ali posse, uel lac generari: nam si hic sanguis veneficus esset, vt censuit ille autor, quærerem ab ipso, quomodo fieri posset, ut per id tempus in quo naturaliter aggregatur, corpori etiam plurimum non officiat, & præterea cur ex illius auctione Symptomata quoq; non augeantur: nam per te ò Ferneli sanguis iste veneficus est, Ergò corpus in quo subsistit, corrumpet, & à naturali statu plurimum euertet, ea tamen ratione & ordine, ut primis diebus, quibus incipit aggregari, ob materiæ paucitatem parum etiam corpus afficiat, sequentibus diebus, in quibus talis materia augmentum suscipit, paulò magis lædere deberet, quia in maiori quanto maior est uirtus, Ergò in fine mensis, quo tempore in maiori copia materia est aggregata, magis alterabit, uehementioraq; Symptomata faciet, quorum tamen nullum obseruamus in illis mulieribus quæ naturaliter purgantur. Præterea si modica portio alicuius humoris præter naturam, & nondum uenefici tot mutationes in corpore parere potest, nauseas uidelicet, uomitus alui fluxiones, dolores, febres, uigilias, & alia id generis, cur longè maiora & uehementiora non faciet, quando in maiori copia aggregata erit, & longiori tempore cohibita, præsertim cum & ratione maioris copię, & prauitatis intensioris, quam in longiori mora sibi contrahit, ualidiores uires corrumpendi acquirat. Accedit quod alimentum & uenenum ut contraria ualdè distant, cùm alimentum sit naturæ humanę simile, ratione cuius similitudinis potest uirtutem custodire, fouere & augere, contra uenenum ob dissimilitudinem contrarias habet facultates, quarum ratione aptum est destruere, corrumpere & interficere. Ergò si sanguis menstruus

*Contra modernos.*

*Prima ratio*

*Secunda ratio*

*3. Ratio.*

E 2 est ve-



## De Morbis Muliebribus

- est venenum, semper corrumpet illud corpus cui contrariatur, & in quo reperitur, consequenter per illius præsentiam & actionem ita in corpus corrumpendo aget, ut
- Obiectio.* sublata sanitate, contraria affectio inducatur, cuius tamen oppositum in plurimis observamus: nec obstat si aduersarius diceret, quod menstruus sanguis consuetis temporibus effluens, corpus non corrumpit; inprimis quia sæpè observatum est in multis mulieribus hanc materiam tribus & quatuor mensibus intra corpus retineri, non propterea alicui morbo subiicitur: præterea quod secundum naturam fit in sanis corporibus, non potest per se nocere corpori in quo illud fit & generatur: at in muliere prægnante menstrua per totum gestationis tempus naturaliter retinentur: quare si sanguis menstruus veneficus esset, conceptionis tempore ullo modo retineri deberet. Præter id enim, quod huic mulieri plurimum noceret, fœtum etiam enecaret, generationemq; prohiberet. Eadem ratio & de lactante habenda est, quia ob eandem rationem sanguis iste tam diu detentus, uel mulieri maximè officeret, uel lac alterando, & perniciosa sua qualitate afficiendo, non posset esse conueniens alimentum pueri, & ita operatio secundum naturam facta, cederet in maleficium mulieris, in qua illa fit, & nutritionis fœtus, nec non etiam conseruationis eiusdem postquam in lucem editus esset; hoc tamen experientiæ repugnat, cum conceptionis, nutritionisq; fœtus gratia, necessariū sit consuetam vteri fluxionem supprimi, quemadmodum etiam fieri experimur postquam fœtus in lucem est editus, aliter lactis generatione prohibita, iam conditum naturæ opus statim periret. Addo quod rationabilius esset, ut prægnantes grauius ægrotarent, quàm cæteræ, quibus ob alias causas idem sanguis retinetur: quandoquidem in non prægnantibus sanguis iste prauus, quia cum bono & alimentali mixtus est, sua hac permixtione facile potest
- Solutio.*
- Cōfirmatio.*
- Cōfirmatio.*
- 4. Ratic.*



potest malitiam eius corrigere, ferocitatemq; aliqua ratione moderari & mitescere, at in prægnantibus secus esse deberet, quia in his melior ac purior pars ab ipso fœtu attrahitur, & portio relicta impurior & prauior remanet, ac proinde magis effrænis rediturquæ oporteret prægnantes mulieres lethalibus Symptomatibus necessario & semper affici. Augetur adhuc magis difficultas, quia sanguis iste menstruus, si ueneficus esset, quantò in maiori copia aggregaretur, tantò efficacior corrumpendi potestatem acquireret: at in ultimis mensibus prægnantis mulieris, copiosior quantitas huius sanguinis est aggregata, quàm inter initia, Ergò hoc potissimum tempore, pessimè se habere deberent, cuius tamen oppositum contingere uidetur, cum sæpè obseruemus, prægnantes in primis mensibus deterius habere quàm in ultimis.

Quæ ueritas confirmari adhuc potest in mulieribus etiã lactantibus, in quibus toto lactationis tempore nulla huius sanguinis expurgatio apparet, quia medicorum omnium consensu habetur quòd sanguis qui menstruus fieri deberet, in lac ipsum degenerat, quod optimum & suauissimum alimentum pueris existit: quapropter cum in istis materia generationis menstrui non desit, & illius euacuatio secundum naturam nulla appareat, per totum id tempus, in quo puer lacte nutritur, concludendum iurè uidetur, ex tali sanguinis redundantis superfluitate, non menstruum sed lac potius generari: quod si negare adhuc quis ausus fuerit, ab illo ego expeterem locum in corpore mihi assignari, in quo tam copiosè contineri posset, cum per bienium & ultra nulla illius sanguinis expurgatio in lactantibus appareat: præterea, si in hoc tempore generaretur, & locum haberet, ubi tam copiosè & longo tempore quiesceret, quæro quomodo citra euidentem & insignem illius corporis molestiam tam diu in eo subsistere posset, præsertim cum ab aduersariis

con-

5. Ratio.

6. Ratio.

Saph. 38.

7. Ratio.

8. Ratio.

## De Morbis Muliebribus.

9. Ratio.

*l. de uena-  
rum dissec.  
de usu par.*

*Animaduer  
sio.*

constitutum fuerit, non solum copia peccare, uerum etiā qualitate quadam uenefica præditum esse, quòd si quis dixerit, ex tali sanguinis superfluitate lac generari, tunc quæro de hoc lacte, an sit materia alimentalis uel non, & si non, an sit praua aut uenefica, uel alterius generis, negare non possumus, quòd non sit alimentum, cum illo pueri optimè nutriantur, ob quam causam statuendum est pariter, omni uitiata qualitate carere: quare si eadem est materia sanguinis menstrui & lactis, iam asserere non poterimus, uenefica qualitate esse affectum, in ea tamen re, vnum est animaduertendum, quod in lactante muliere assiduò lac generatur, ex redundante sanguine, post nutritionem sanguinearum partium superfluite, ita ut in singula coctione, portio illa quæ post nutritionem superest, per ulteriorem elaborationem, quam quotidie recipit à propria substantia mammillarum in lac uertatur, quod est in causa, ut lac sit nutritionis materia, puero ualdè iucunda, & magni nutrimenti, quoniam non generatur ex sanguine mēstruo diu aggregato, sensimq; in corpore aucto, & alterato, sed sicut in qualibet coctione quotidie generatur & superest, ita ex eodem lac pariter producitur, qua ratione tantum abest, ut ob nimiam in corpore moram, qualitatem malam concipere possit, ut potius per nouam coctionem statim succedentem, maiorem depurationem melioremq; formam acquirat, quod sanè non contingit in mulieribus non lactantibus, & iis quæ utero non gerunt: quoniam in istis sanguis qui post nutritionem continuò redundat cū debitum finem ac usum assequi non possit, alimentumq; ipsius fœtus aut pueri fieri nequeat, sed in corpore tanquā ociosus & nullius usus diu detineatur, sit ut ex continua illius aggregatione & longa mora, sensim etiam alienam qualitatem acquirat, ab alimenti natura ac benignitate longè distantem, ut



ut alimenti materia esse minimè possit , qui nisi consue-  
tis temporibus expellatur , iam enarrata Symptoma pro-  
ducere consuevit .

*De causis generationis Menstruorum  
in fœminis , non autem in viris*  
CAP. XV.

Cùm constet in fœminis sanguinem menstruum gene-  
rari, in viris autem nequaquam, huius diuersitatis  
causa quærenda est. Ea autem non aliundè melius sum-  
mi poterit, quàm ex fine, in quem & propter quem san-  
guis iste à natura producitur. Ex communi autem om-  
nium consensum constat, mulierem factam fuisse ad pro-  
creandos filios, quorum generatio fieri non potest absq;  
uirili semine, quod in proprio vtero non solum recipere  
debet, sed receptum retinere, fouere, nutrire confor-  
mare & augere: hæc autem præstare non potest absq;  
alimento, quod intra se habere debet, cuius alimenti ac  
nutritionis materia, non alia est, quàm sanguis ipse, Ergò  
ob hanc causam oportuit in muliere longè copiosiorẽ  
sanguinem generari quàm in viris, ut ratione huius co-  
piæ non solum sufficiat, pro alendo & conseruando pro-  
prio corpore, verum etiam pro fœtu nutriendo, donec  
ad integram perfectionem perueniat & postquam in lu-  
cem est editus, ex eodem sanguine adhuc nutriri debuit,  
quod fit per illius conuersionem in lac: at in muliere,  
vtero non gerente, cùm sponte naturæ hæc copia absu-  
mi nequeat, præsertim si otio & somno dedita fuerit, *Primo de*  
sensim in vena caua colligetur, & statuto tempore per  
uenas vteri foràs erumpet, mares autem, quia ad gene-  
randum concurrunt, ut actiua principia ac proinde non  
in

*Arist. 2. de  
part. ani-  
mal. 2. &  
4. de Ge-  
ner. ani-  
mal. Ca. 1.*

*Primo de  
generatio-  
ne animal.  
c. 20.*

## De Morbis Muliebribus.

*4. probl. 26.* in se ipsis, sed in alio generent, ideò necessaria non fuit  
 productio menstrui, consequenter nec eiusdem purgatio,  
 cui fauet etiam eorum calor robustior, non permittens  
 aggregari talem superfuitatem, & præsertim cum mul-  
 tis exercitiis dediti sint, quorum causa omnes superflui-  
 tates facile absumentur. Ex copiosa autem sanguinis  
*Mulier est frig. uiro.* generatione & illius superfuitate, quæ in mulieribus tan-  
 tum colligitur, clarè haberi potest, frigidioris esse tem-  
*Contra par- me.* peraturæ quàm viri: vbi enim frigidior & humidior tem-  
*Gal. 2. de semi.* peratura adest, necessarium etiam est, copiosorem hu-  
 miditatem crudorumq; humorum maiorem quantitatem  
*Hyp. 7. aph. 44.* coaceruati, vt in scæmineo sexu contingit: hinc etiam  
 est, vt mulier ob eandem temperaturam plus appetere  
 uideatur, & ob eandem etiam minus coquere, ac proinde  
 crudiori sanguine redundare: fauet quin etiam huic co-  
*Ratio secun- da.* pia sanguinis earundem habitus corporis densior qui  
 non solum sequitur dictam temperaturam frigidam, ue-  
 rum etiam uitæ earum institutum, quoniam in quiete &  
 otio magis degunt, quàm in motu & negotio: hinc est,  
*3. ratio.* ut ab earum corporibus minor resolutio fiat, & propte-  
 rea largiori etiam sanguine abundabunt, atq; eo frigidio-  
*Dubitatio.* ri & crudiori quàm viri: uerum quispiam dubitare pos-  
 set, cur sit quòd mulier, generans filium cum generet ra-  
 tione qua animal, non autem ratione qua homo, quòd  
 etiam non communicet cum cæteris brutis, non solum  
 in generatione & generationis modo, uerùm etiam in  
*Solutio.* expurgatione huius menstrui sanguinis per vterum, eo  
*5. de hist. animal. c. 20.* uidelicet tempore quo prægnantia non sunt. Cuius rei  
 causam reddens, Aristoteles inquit, bruta animantia men-  
 strua purgatione carere, quia omnem sanguinis super-  
 fluitatem variis modis absument, modo in substantiâ  
 proprii corporis immutando, in quibusdam degenerat  
 in squamas, in aliis uertitur in pennas, in aliquibus in  
*Libro de sperm.* copiam pilorum transmutatur, in aliis in crassiores & du-  
 riores



riores cortices degenerat, ut in testudinibus, cochleis & cochis contingit.

*Quo tempore menstra fluere incipiant.*  
C A P. XVI.

QVo autem tempore, qua ue ætate fluxio mens-  
trum in mulieribus incipiat, non est ita certum,  
cùm in aliquibus citius, in quibusdam tardius id contin-  
gat. Commune autem omnibus uidetur, ut ante duodeci-  
mum annum non appareat, & si in aliquibus anno æta-  
tis suæ undecimo uel paulo ante conspecta fuerit, ut in  
sanguineis, & latiores uenas habentibus euenire potest,  
sciendum hoc rarò contingere, & propterea hanc flu-  
xionem non omninò naturæ modum seruare, quòd testa-  
ri potest uitæ earum breuitas: contra uerò in illis lon-  
gior indicatur, in quibus hæc menstrua purgatio tardius  
conspicitur, communiter autem, & ut in pluribus ac se-  
cundum naturam consuevit hæc purgatio incipere circi-  
ter annum decimum quartum, quo tempore incipiunt  
etiam mamillæ intumescere, & uox paulo minus acuta  
auditur quàm antea, grauior tamen redditur. Hippocra-  
tes libro de septimemstri & octimemstri partu, & alibi red-  
dens causam, cur ante decimum tertium annum men-  
ses non prorumpant, ait: quia ante hanc ætatem ue-  
næ angustiores sunt, ut sanguis adhuc liberè permeare  
nequeat: quocunq; autem tempore incoeperint, solent  
mulieres tunc potissimum pati Venereos stimulos & ad  
coitum accendi, idè incipiunt diligere iuuenes, ut hoc  
potissimum tempore magna etiam egeant custodia, cum  
semen incipiat generari, cuius præsentia & titilatione, ad  
Venerem excitantur: hinc colligi potest mulierem non  
prius esse aptam ad generandum, quàm incipiunt fluere  
men F

*Ante annum  
12. mulier  
non purga-  
tur.*

*7. de hist. a-  
nimal: c. 1.  
& 1. de  
gener: ani-  
mal. 20.  
Lib. de geni-  
tura.*

*Quæ sint a-  
ptæ ad ge-  
nerandum.  
Primo de hi-  
storia ani-  
malium c. 1.*

## De Morbis Muliebribus

Libro de di  
sec. uulue  
cap. 10.

menstrua quoniam hoc solum & non alio tempore fœtus nutriri potest, qui prægationis etiã tempore, illius gratia, intus detinetur: accedit quòd per id tempus semē etiam in fœminis generatur cuius pariter ad generandū magna habetur necessitas: utriusq; autem carentia, quæ in extremis ætatibus sunt constitutę, steriles & infēcundæ euadunt.

### Quo tempore desinant fluere Menstrua CAP. XVII.

7. de hist. a-  
nimal. c. 5.

Quæ etas ad  
conc. p. a-  
pta sit.

**T**Empus autem, quo menstruorum fluxio naturaliter desinit, non minus incertum habetur, principio fluxionis eorundem, cuiuslibet tamen mulieri commune esse uidetur, ut post ætatis suæ annum sexagesimum purgari desistant, quibusdam uerò ante sexagesimum purgatio ista desinit, plurimę ante annum quinquagesimum, aliæ circiter quadagesimum & quadagesimum quintum dictam purgationem non patiuntur, cuius defectus causa in caloris diminutionem referri potest, ratione cuius, nec copiosus sanguis generatur, & si generaretur, non tam facilè per longinquas partes angustioresq; uias expurgari posset: idè quicunq; uxorem ducunt prolis procreandæ gratia, ab extremis ætatibus cauere debent, eam non accipientes, priusquam purgari cœperit, uel tēpore quo à tali purgatione desierit, quia utroq; tempore ob eandem causam infēcundæ sunt, at qui uxorem ducunt, ne urantur, sciant ii, quòd quęlibet mulier facilè potest huic negocio satisfacere, quoniam ad extremum usq; senium libenter uenerem amplectuntur, nec tam facilè centum adhuc uiris satiantur.

De



De periodis repetita purgationis.

CAP. XVIII.

**M**ulieres quæ purgantur secundum naturam, quod nam habeant constitutum suæ purgationis tempus, non uidetur ita compertum, cum in aliquibus breviori tempore, in aliis longiori talis purgatio fiat. Si cætera excrementa, quæ in corpore generantur, spectemus, clarè constat, quòd ut singulo die generantur, ut in pluribus etiam eodem expurgantur, siue de illis sermo habeatur, quæ partem determinatam respiciunt, ut oris expulsiō, narium emunctio, & aurium euacuatio, quæ ad caput diriguntur, & lotii redditio, epar & totum uenosum genus respiciens, & crassiora alui excrementa, per anum expulsa, ventriculum & intestina inaniunt. Si ad uniuersum corporis habitum ordinentur, erunt halitus insensibiles, sudor & pili, quæ omnia per cutaneos meatus assiduò expelluntur, ad quorum excrementorum similitudinem in separatione et expulsiōe, menstrua non ita se habent, quia nec assiduo aut singulo die, uel alternis diebus effluunt, sed longioribus egent interuallis, quod à natura prudenti admodum consilio factum fuisse, existimandum est: in primis quia mulier toto suæ uitæ tempore in perpetua quadā molestia uixisset. Accedit quòd si singulis diebus talis purgatio fieret, conceptionem prohiberet, quia simul cum materia menstruali ob viarum lubricitatem, susceptum quoq; semen efflueret. Præterea tunc solet optimè mulier concipere, quando ab omni excremento uterus mundus est, & ab omni impuritate benè repurgatus, hoc enim tempore ora uasorum sunt aperta, nullaq; adest præsentia menstrui obruentis & quodammodo susceptum semen strangulantis. Addo, quòd sordidum & abominabile uiris valde foret, cum huiusmo-

*Excr. diuersis temp. uacuari.*

*Prima ratio*

*Secunda ratio.*

*Tertia ratio*

*Quarta ratio.*

F 2 di

## De Morbis Muliebribus

7. de hist.  
animal. 2.

di mulieribus coitum inire, quibus uterus tali excremento madesceret. Si igitur menstrua hæc purgatio nec quotidie fit, nec fieri debuit, quærendum ulterius, quæ temporis interualla, ut fiat, expostulet. Experientia comprobatum est, non omnes mulieres eodem constituto tempore purgari, sed aliæ citius ac sæpius, aliquæ tardius & rarius. Commune tamen omnibus naturalem statum seruantibus, esse uidetur, ut singulis mensibus hæc euacuatio repetatur: nonnullis tamen conuenit bis, aliis etiam ter, quibusdam longè tardius purgari. Cuius diuersitatis causa ea esse posse uidetur, quæ ex coeundi desiderio desumitur, ut in quibus intensius fuerit, purgatio etiam frequentior habeatur, præsertim in ætate Iuuenili, in corporis habitu sanguineo, in habentibus uenas latiores, ac in illis denique, quæ uentri nimium indulgent, & in otio uitam degunt.

*Quot diebus duret hæc purgatio.*

CAP. XIX.

In quibus,  
diu duret  
purg.

CÆterum purgatio ista dum fit, siue per frequentiora siue rariora interualla illa fiat, non uidetur habere determinatum suæ durationis tempus, cum in quibusdam per plures dies, in aliis per pauciores perseueret: unde tempore Hippocratis rarò contingebat unam uel alteram diem excedere, nostris uerò temporibus plures attingunt, ut ad quartum, quintum, sextum, septimum, & octauum perueniant. Immò si Paulo credimus, quædam ad duodecimum etiam ascendunt. Cuius diuersitatis ratio ea esse potest, quia nostri temporis mulieres genio nimis indulgent, copiosius comedentes & cibos laudabilis succi, & in otio uiuentes, quibus potissimum hoc aduenit, si iuniores fuerint, humidiores, uenosa & magnum



gnum Epar habentes, quibus omnibus causis ita in unum conspirantibus, facile contingere potest, in earum corporibus copiosum sanguinem generari, magnamq; illius copiam post totius nutritionem superesse, pro cuius expurgatione, iurè non sufficiunt duo uel tres dies, sed plures sint necessarii, & huiusmodi mulieres illæ sunt, quibus uteri strangulatus sæpius adueniunt si cōsuera illis purgatio suppressa fuerit, quod non contingeret, nisi præ nimia copia aggregati excrementi natura satis superq; grauaretur. At mulieres illæ, quæ erunt magis uiriles, calidiorisq; temperamenti, quales illæ extant, quæ sunt habitus nervosioris, & robustioris, sicut pauciora excrementa congregant: ita breuiori temporis interuallo eadem expurgabunt: quæcunq; etiam fuerint habitus obesioris & pinguioris, angustioresq; uenas habuerint, partius purgabuntur, sanguinis enim portio, quæ in his post nutritionem superest, ob uenarum angustiam copiosius congregari non potest: & præterea ferè tota in adipem uertitur, quod etiam est in causa, ut huiusmodi mulieres rarò concipiant, & si contingat has concipere, ob alimentii inopiam imbecilles fœtus & graciles habere solent. Præterea ratione etiam declinantis ætatis exigua & breuis purgatio reddi solet, ob causam supra etiam allatam: in iis pariter quæ tenui utuntur uictu, aut plurimum corpora sua exercent, paucæ superfluitates colliguntur: quoniam in illis ob nimiam inanitionem non generantur: in istis uerò, præ nimio corporis exercitio non retinentur, sed per corporis halitum atq; sudorem dissipantur. Testari hoc possunt rusticæ mulieres & saltatrices, in quibus, ob dictam causam, purgatio hæc uel nulla aut per exigua obseruatur, quod genus mulierum, ad procreandam sobolem uidetur esse minus idoneum, in illis etiam exigua uel nulla purgatio fiet, in quibus sanguis per alia loca euacuatur, siue per nares spontè exierit, uel hæmorrhoidas

7. de hist: animal: cap: 2. & 3.  
Quibus purgatio breui-  
duret.

Causa sterilitatis.

## De Morbis Muliebribus. 20

rhoidas uel sectam uenam, & alio quouis modo, quibus etiam larga alui euacuatio accidit, siue spontè siue arte facta fuerit, consueta yteri euacuatio omninò desistere solet: uel saltem maiori ex parte imminui. Quæcunq; etiam febre, & ea diuturna corripiuntur, uel parum uel etiam nihil purgabuntur: in his enim materia inter initia febris exigua generatur, in progressu nulla, sed ab extraneo calore tota absun-  
tur.

### In qua mēsurā fluat sanguis Menstruus. CAP. XX.

*Lib: de mor-  
bis uulg.*

*6. Epid:*

*Copia mēst.  
in quibus.*

*Frigidior et  
acrior qua-  
litas in  
quibus.*

**Q**uantitas etiam effluentis sanguinis eadem in omnibus non habetur, cum à multis & uariis causis illa alterari immutariq; possit. Hippocrates statuer uidetur, conuenientem copiam fore ad duas usq; minas uel libras, & alibi dicit aquosis mulieribus diu menses durare, & nisi crebrò fluant: earum corpora intumescere. Hoc intelligens de corporibus humidioribus, in calidioribus uerò & siccioribus, partiores erunt, ut pote in illis, in quibus superfluitas ferè omnis absimitur, nec solum in quantitate diuersitas contingit: uerum etiam in qualitatibus tum primis tum secundis, ut merito primarum, materia ista modò calidior & feruentior, modò frigidior sit. Calidior erit in ætate iuuenili, in temperatura biliosa, in corporis habitu consimili, in regione calida & præsertim si calidior uictus ratio præcesserit. contrà frigidior erit, in muliere pituitosi temperamenti, in corporis habitu pingui, in ætate decrescendi, in regione frigida, & potissimum si ea etiam uictus ratio accesserit, ratione cuius frigidiore humores multiplicentur, diuersitas etiam conspicitur penes secundas & materia-  
les



les qualitates, in crassitie uidelicet, & tenuitate, in lentore & fluxibilitate, nec non etiam in colorum uarietate, ut in iunioribus, calidi & sicci temperamenti, in regione calida educatis, sanguis iste tenuior & rubicundior appareat, in adultioribus uero, in temperatura frigidiori, in regione consimili, & crassior & remissioris caloris obseruetur. Differentia quin etiam apparet in modo exeundi, quam uis enim commune omnibus uideatur, ut exeunte tali superfluitate, aliqua molestia inferatur, differentia tamen erit penes magis & minus, quæ sanè diuersitas causabitur, à maiori & minori copia, ab intensiori; & remissiori caliditate huius materię exeuntis: hæc enim quantò copiosior fuerit, quia longius tempus ad sui expurgationem expostulat, longiorem etiam molestiam pertranscundo patienti adferet: quò autem partior illa fuerit, minorem noxam inferet. Ex parte deinde qualitatis hic sanguis quanto calidior fuerit, tantò etiam mordacitate participabit, ac proinde illius exeundi modus molestior erit: quò uero frigidior extiterit, eo minus mordax erit, consequenter motu suo minorem afferet molestiam. Constitutum itaq; sit, sanguinem menstruum esse materiam illam, quæ in uteri superpresione intus & præter naturam cohibetur, eundemq; excrementum esse secundæ coctionis, quantitate & qualitate peccans non tamen in omnibus eandem coaceruari mensuram, nec idem tempus exeundi seruare, nec eodem tempore desinere nec eodem modo exire, sed ob adductas causas hæc omnia uariari alterari.

*Crasfities et  
tenuitas  
in quibus.  
Coloris uarietas.*

*Varietas, in  
modo exeundi.*

*Epilogus.*

De

De Morbis Muliebribus.

De loco euacuationis Menstrui sanguinis. CAP. XXI.

*Fluxio per  
quas non  
ei fiat.*  
*5. aph. 51.*  
*5. aph. 60.*  
*Quomodo  
in pregnan-  
tibus me-  
strua fluât.*  
*Uterum 2.  
affici.*  
*3. de Sym-  
pt: causi:*

HIC sanguis ita præter naturam in corpore deten-  
tus, cum determinatum habuerit à natura suæ eu-  
acuationis locum, talis communi omnium consensu, non  
alius est quàm uterus ipse, ad quem sicut dicta superflui-  
tas, quæ quotidie & sensim generatur, confluit & reci-  
pitur, ita per eundem natura grauata, illius euacuatio-  
nem molitur: euacuatur autem per uenas dicti uteri, in-  
terdum etiam per uenas ad illius ceruicem deductas si-  
cut in quibusdam prægnantibus quandoq; contingere so-  
let. Fluit autem per hanc partem naturaliter & non per  
alias, quia tempore formandi foetus in hanc ipsam flue-  
re debuit, pro illius nutritione cum in solo utero & non  
alibi conceptio fiat. quo tempore si contingat menstrua  
fluere, quod tamen raro aduenit, prouida natura for-  
mationi foetui maximè intenta, non per uenas uteri, talem  
euacuationem faciet, sed potius per uenas ipsius cerui-  
cis, hac enim ratione ore uteri adhuc clauso manente,  
prout ad conceptionem requiritur, per dictas ceruicis  
uenas euacuabit, & ita euacuando ab abortu mulierem  
præseruabit. Cæterùm cum uteri suppressio contingit,  
ea fieri potest modò utero primario affecto, mo-  
dò per consensum: & dum primario affici-  
tur, uel totus uel illius pars determina-  
ta læditur, quæ esse potest ceruix,  
cornua & cavitatis eius.

Hæc de forma  
& loco affe-  
cto.

DE



De causis suppressionis Menstruorum.  
CAP. XXII.

**D**um autem sanguis iste excrementitius qui per uterum non egreditur, ut egredi deberet, siue primario siue secundo latus fuerit, siue totus siue illius pars, aliquas huiusmodi suae lationis causas habere debet, quapropter de causis suppressionis menstruorum agendum occurrit. Non fit igitur haec fluxio uel labefacta expultrice uteri, uel ob externos errores. Si labefacta fuerit, hoc fieri potest ob intemperiem, atque hanc calidiorem & frigidior calidiorem etiam & siccior, frigidiorque & siccior, siue haec natua fuerit, siue accititia, siue morbosa siue non, siue secundum corpus totum, siue partem, & rursum siue cum materia fuerit, siue sine materia. Quo ad intemperiem calidam tantum, uel etiam cum siccitate coniunctam, ratione huius hic sanguis non fluit, quia non generatur, sed omnis superfluitas, quae post nutritionem superesse deberet, a dicta intemperie absorbitur, quemadmodum in febribus contingere solet. in quibus nec potest tanta copia sanguinis alimentalis produci, qui pro corporis nutritione & conseruatione sufficiat, ob cuius defectum talia corpora non solum conuerteris excrementis non redundant, sed proprii etiam alimentum defectu, diminuta nutritione, quotidie magis emanciantur, citius autem cessat haec fluxio in febribus continuis, quam in intermittibus, quia in his assidua fit exsiccatio, in febre autem quartana intermittente, inter initia hic sanguis generatur & effluit, quia consumptio per intervalla tantum fit, & ob id in errore sunt illi praedicantes, qui in quartana febre progressa, tentant uiribus omnibus menstrua prouocare, cum non generentur. Si autem menstrua non fluant quia sanguis postquam

G ge.

3. de sympt.  
causa C. 4.

5. Aphorismo. 57.  
lib. de causis sympt.  
ult.

Causa sup-  
pr. 2.

Menstrua non  
flueri ratione feb.

In quibus  
febribus  
& quo tempore fluant mest.

Error in pra-  
xi.



## De Morbis Muliebribus

genitus est absumitur, ut de more aggregari nequeat, hoc contingere potest, ob intemperiem calidiorē tantum, & ad sciticiam & natiuam non morbosam, ratione cuius sanguis in maiori copia non generatur, calore in halitum insensibilem ipsum resolvente, quemadmodum ratione natiuæ contingit. in mulieribus, quæ uiragines sunt, & ratione adsciticiæ in saltatricibus, & aliis, quæ corporeis uiolentisq; exercitiis, plurimum sunt deditæ; meritò autem intemperiei frigidioris hæc pariter esse potest morbosa & non morbosa, asciticia & natiua, in toto corpore, & parte determinata; ratione cuius non generatur talis sanguis, & ideo non fluit, ut fluere deberet: non generatur autem, quia calor est diminutus, ideo Hippocrates & Galenus rectè sentiunt, quod corpora gracilia uel obesa aut penitus carent tali euacuatione, uel modicam habent: in siccis quidem non fluit, quia sanguis iste non generatur sicut fit in calidis & humidis; in pinguibus uero si generatur, copiosa superfluitas, non tamen sub forma sanguinis excrementitii aggregatur, sed in pinguedinem potius uertitur, & ideo ubi occurrunt mulieres talis habitus curandæ, quibus menstrua non appareant, inanes erunt conatus omnes nostri in illis prouocandis: quòd autem calor diminutus in causa sit, ut talis sanguis non generetur, testari possunt mulieres in senili ætate constitutæ, quæ frigidiores redditæ, uix possunt cibum coquere, & ex illo alterato, proprium corpus nutrire, & conseruare, ne dum superfluum generare; nec solum totius intemperies, siue calidior siue frigidior fuerit, in causa est, ut talis sanguis non gignatur, uel etiam absumatur, uel in alienam substantiam uertatur, nempe in pinguedinem: uerum etiam intemperies partis determinatæ ideo ex aliquo diuturno affectu Ventriculi, Iecoris & similium partium, uirtus ita labefactari potest, ut uix sanguis generetur pro nutritione indiuidui

nc-

5. Aph. 44.

*In quibus  
corpo.  
mest. non  
generatur.*

*Intemperies  
partis.*



necessarius, similiter ob vteri & uasorum eius intemperie insigniter calidam & siccam, facultas expultrix dictorum uasorum labefactari potest, ut indurato utero genitum sanguinem expellere nequatur, nec minus eadem facultas à frigida & sicca intemperie labefactabitur, ratione cuius vterus & vasa eius duriora & densiora pariter fiunt, ut frustrata expulsione suppressio succedat. Si præter intemperiem accedat etiam materia, hæc non erit vaporosa, sed corpulenta, consequenter sanguinea, pituitosa biliosa & melancholica, quarum quælibet dùm copia, crassitie & lentore peccauerit, vteri uias facile obstruere potest, totius inquam, & colli eius, qua de causa consueta euacuatio rursus impeditur. Ab hac ipsa materia obstrui etiam possunt venæ extra uterum, quæ tamen ad ipsum pertingunt, ut consuetus fluxus auferatur, cui obstructioni si ea etiam accedat, quæ cæteras uenas simul occupat, non solum suppressio fiet, sed priori adhuc longè deterior: si deinde sanguis iste non fluat ob externos errores, isti errores prodire possunt à causis tùm internis, tùm externis, ratione quarum eadem expultrix facultas à consueto munere impeditur, ut merito causarum internarum possit esse morbus tùm in mala compositione, tùm in soluta unitate, & quicumq; fuerit, uel in utero erit uel alibi, atq; tunc in toto corpore, uel in parte. Si in utero extiterit, & primò si morbus fuerit in mala compositione, talis potissimum erit in angustia venarum totius vteri, cervicis, & cornuorum eius, merito cuius angustia consuetus transitus sanguini menstruo prohibetur. Cæterùm hæc angustia cùm multiplex esse possit, distinguenda est, quoniam uel natua est, ut cum ceruix à membrana adnata clauditur, uel ad scititia quæ in obstructione consistit, uel constirpatione, uel coalescentia, uel subsidientia, uel compressione. Si in obstructione fuerit, hæc fit à materia copia uel qualitate

G 2 peccante

3. de symp.  
causis. 4.

Materia.

5. Aph. 36.  
& 28.

Externi.  
Errores.

3. de Sympt.  
caus.  
Apli. 28.

5. Meth. 5.

Causa angustie.

Causa obstructionis.



## De Morbis Muliebribus

*Causa con-  
stip.*

peccante, uidelicet à crassitie & lentore. Constipatio autem causatur uel à callo & vteri colli ipsius, uel adipe, uel carnis excrescentia, vel adnata membrana circa col- lum & os ipsius, & in quibus talis membrana adnascitur imperforatæ vocari solent: quamuis rarò hoc contingat, Fernelius tamen testatur ob huiusmodi causam se uidisse mulierem, cui nunquam menses uel aliud quippiam ab vtero fluxit, quæ tamen nunquam ob id malè habuit sed ad annum ulq; sexagesimum incolumis uixit. Causa autem coalescentiæ est cicatrix vteri, ratione cuius vena-

*Causa coale-  
sc.*

rum ora coalescunt, quòd fieri solet ex præcedente ulcere. Causa verò subsidentiae est insignis inanitio eorundem uasorum, ad quorum uacuitatem subsident uasa, vel etiam fit à causa refrigerante, densante & astringente, quæ in illis fœminis locum habere solet, quæ proprio vtero stiptica & astringentia applicant, ut hominibus virgines appareant: quorum causa facultas retentrix vteri adeò roboratur, ut menstruum sanguinem aliundè non

*3. de Sympt.  
caus. 4. 5.  
Aph. 7.*

suscipiat: vterus enim uenas quas habet, ea ratione habet, ut non solum per illas alimentum propriæ conseruationis gratia suscipiat, uerum etiam ut eiusdem superfluitatem recipiat, & recipiendo per vterum euacuet, quæ ratione debent hæc uasa quandam imbecillitatem habere: ideò robustiora si reddantur, quod contingit dum constringuntur & densantur, non amplius hanc materiam suscipient, uel susceptam non expellent. Compresionis uerò causa fit uel ab immodica pinguedine ut ab omento uene vteri comprimantur, uel etiam à tumore aliquo præter naturam existente in vtero fieri consuevit, qui eidem accidit secundum extimas illius partes vel circumiacentes, qui tumor siue inflammatorius siue alterius generis extiterit, suo pondere uterum comprimere potest, & cum illo simul etiam uasa, quibus compresis, consue- tus transitus impeditur, ut excrementitius sanguis per con-  
sucta

*Causa com-  
pres.*



sueta loca fluere expurgariq; non possit. Si deinde menstrua non fluxerint ob morbum solutæ unitatis, esse potest disruptio, abscessus, fistula, ulcus & huiusmodi, quorum omnium causa per uterum assidua expurgatio fieri potest, & si non sanguinis menstrui alterius saltem materiæ in quam ille degenerare potest, priusquam in menstruum uertatur. Hæc de causis suppressionis in utero existentibus. Si autem morbus alibi, quàm in utero fuerit, esse potest in toto corpore, & in parte determinata. Si in toto corpore, hoc contingere potest, uel quia non generatur, uel si generatur, in alia loca raptum habet, si non generetur, fieri hoc solet à quolibet morbi genere, & in primis ob intemperiem, & non quamcunq; sed calidiorē, ut in febribus contingit, siue putridæ siue hecticæ fuerint. Secundò concurrit etiam morbus in mala compositione, unde corpora emaciata & tabescentia talem sanguinem non generant, quemadmodum illa etiam quæ hydropes corripuntur, siue tympanitis, anasarca uel ascitis ea fuerit, in quibus uel materia hæc non generatur, sed alimentum in flatum, aquam, uel pituitam transmutatur, aut si generatur propter obstructas uias intus detinetur. Accedit postremò morbus in soluta unitate, sicut contingit in scabie, tuberculis & aliis morbillis per cutim uniuersam efflorescentibus; in quibus si menstrua generantur, non ad consueta loca feruntur, sed cùm cæteris humoribus ad uniuersi corporis circumferentiam transmittuntur. Ratione autem partis determinatæ, eadem euacuatio conspici non potest, multis de causis, pro ut scilicet per alia loca natura copiosius euacuare solet, quod cum contingit, fieri potest hæc euacuatio modo materiæ, quæ formam sanguinis seruat, ut cum sit immeratus fluxus sanguinis per nares aut hæmorrhoidas, quandoq; sub alterius humoris specie corpus totum exinaniri potest, ut contingit in euacuatione per mam-

*Soluta unitas.*

*Febris:*

*Mala compositio.*

*Soluta unitas.*

*Ratione partis determinatæ.*

5. Aph. 31.

5. Aph. 38.

## De Morbis Muliebribus.

*Lib. de sang.  
Miss. per  
vena sect.*

millas uomitum alui deiectionem, lotium atq; sudorem facta, quibus omnibus modis materia menstrualis per consueta loca non effluit, sed aliundè deriuatur aut reuellitur.

### De causis externis menstrua supprimen- tibus CAP. XXIV.

*Causæ dupli-  
ces.*

*Causæ exter-  
ne dupli-  
ces.*

*Causæ angu-  
stantes.*

POSTREMÒ menstrua fluere non possunt ob externas etiam causas, quod dupliciter contingere potest, pro ut huius materiæ generatio impeditur, uel fluxus genitæ prohibetur, quorum utrumq; fieri potest, à causis tum necessariò tum non necessariò occurrentibus: ut merito causarum necessariò occurrentium, generatio impediatur, ab omnibus exiccantibus & absumentibus materiam, & mineram talis sanguinis, quales sunt aer calidior & sicciior, regio & anni tempus consimile. cibus etiam ac potus calidior, eorundem uerò paucitas inaniendo absument. Sic uigiliæ immoderatæ superflua inanitio, immoderata corporis motio, & animi accidentia idem præstare possunt: fluxio uerò sanguinis geniti, intus cohibebitur ab eisdem causis, sed diuersa ratione agentibus: quoniam concurrent uias angustando, per quas hæc fluxio fieri deberet: Sic ab aeris frigiditate, à natatione in frigida, uenarum oris densate, dicta fluxio impediatur. Cibus pariter ac potus nimia sui copia producendo sanguinem tum copiosum tum crassiorẽ & uiscidiorem, easdem uias obstruere poterunt: somnus etiam longior, calorem hebetando, & consuetam transpirationem prohibendo, frigidiorum crassiorumq; humorum generationem admittet: caterarum quoq; excretionum inconsumpta detentio obstructions augendo, eandem purgationem suppressere poterit: cui non parum fau-  
bunt



bunt uita ociosa, & cætera animi accidentia, quibus accedunt illæ etiam externæ causæ, quæ necessariò nobis non occurrunt, & hanc fluxionem prohibere possunt, uel genitam materiam per alias uias euacuando, ut purgantia medicamenta, uel alterando, & hæc dupliciter concurrere possunt, manifestis scilicet & occultis qualitatibus. Si manifestis, hoc facient resoluendo, ut causæ omnes calefacientes, uel propria ui absumendo, ut causæ excantes. Si occultis egerint erunt medicamenta, quæ ea ui prædita esse possunt, ut huius materiæ generationem prohibent: Suppressio igitur menstruorum uiolenta, erit exiens mutatum, sanguinis superflui & excrementitii, statuto tempore per uterum non exeuntis, ut secundum naturam exire deberet, prodiens à læsa uteri facultate, uel quia sit labefactata ob aliquam intemperiem, calidiorem, frigidiorem & siccio-rem, quæ modò esse potest sine materia, modò cum materia, siue hæc sanguinea fuerit, siue pituitosa, siue biliosa, siue melancholica: & rursus siue sola copia peccauerit, siue qualitate, atq; hac prima & secunda, manifesta uel occulta, siue pluribus siue omnibus modis, & præterea siue eadem facultas impedita fuerit ob externum errorem, quod contingere potest ratione totius aut partis, & quomodocunq; fuerit, uel facultas erit labefactata ob aliquam intemperiem, uel impedita, siue hoc impedimentum ab internis causis prodierit uel externis, & si ab internis, uel à morbo in mala compositione, uel in soluta unitate, & si morbus fuerit in mala compositione, esse potest in magnitudine tum aucta, tum imminuta, & si aucta, & primò ratione totius, erit causa hydropis, si diminuta, ratione tabis, si fuerit in soluta unitate, erit ratione scabiei uel ulcerum totum corpus occupantium: ratione etiam partis idem contingit, siue hæc pars alia ab utero fuerit, atq; illa tum principalis, tum inferuiens siue ipsemet uterus, qui detineri potest

*Epilogus*

## De Morbis Muliebribus.

test tùm morbo in uis angustioribus, & morbo in soluta unitate: & si uiarum angustia fuerit, consuetum materię fluxum impediens, fieri poterit à causis tùm internis tùm externis: si ab internis, locum habebunt obstructio, constipatio, compressio, subsidentia & coalescentia: Idem dicatur de omnibus externis causis, siue concurrant constringendo & densando uias, & rursus siue necessario occurrant, siue non, siue manifestis siue occultis qualitatibus egerint. A pari dicendum, si idem uterus secundario afficiatur, consequenter ob aliarum partium læsionem, siue partes istę principales fuerint, siue non principales: & si principales fuerint, siue Epar, siue cerebrum siue cor extiterit; & inter non principales, siue Ventriculus fuerit, siue lien, siue pulmones, uel alię partes, quę omnes morbo potissimum in uis tùm angustioribus tùm latioribus factis, detinebuntur, ut merito angustię, materię motus in uterum impediatur, sicut merito nimię dilatationis potest eadem materia per alia loca euacuari, siue deriuando siue reuellendo, uel utroq; modo contingat; quemadmodum fieri solet ex apertione uenarum narium uel hemorrhoidum: præterea etiam ex fluxu aliquo, siue per aluum, lotium, uomitum uel sudorem extiterit.

## De differentiis suppressionis Menstruorum. CAP. XXV.

*Differentia à forma.* **E**X proposita essentia dicti Symptomatis numerus specierum omnium eius colligi facile potest, quarum aliquę ab illius forma capiuntur, nonnullę à materia seu loco affecto, alię uerò à causis efficientibus. Ut merito formę suppressio hæc menstruorum cum Symptoma



ptoma sit in exeunte mutato, in quo videlicet non exit quod exire deberet, hæc materia uel omninò erit suppressa, uel maiori ex parte, hinc oritur integra suppressio & diminuta. Merito deinde loci affecti cum iste uterus sit, dicere possumus, quòd eadem suppressio dum integre adest, uel diminuta est, alia sit utero primariò affecto, alia secundariò, & dum secundariò sit, uel hoc est ratione totius corporis, uel partis determinatæ, & si ratione partis pro partium enumeratum diuersitate, differentia etiam diuersæ oriri possunt, ut suppressio alia fiat læsa parte principali, alia non principali, & sic de cæteris. Postremò capiuntur etiam differentia à causis effectricibus, quæ pariter totidem oriri poterunt, quot à nobis fuere causæ propositæ, & enumeratæ; ita ut menstruum suppressio, siue ratione totius, siue partis fuerit, & rursus siue uterus primariò afficiatur, siue secundariò, alia fiat à causis internis, alia ab externis, & quæ ab internis sit, alia sit à morbo in intemperie, atq; hac simplici, uel composita, cum materia, & sine materia, alia sit à morbo in mala compositione, siue hic fuerit à in magnitudine aucta, uel diminuta, uel in uis latioribus, aut angustioribus, & rursus siue fiat à copia materiæ, siue à crassitie, & lentore, siue à cicatrice. Alia autem sit à soluta uuitate, & tunc uel ab ulcere, fistula, abscessu, uel disruptione: deniq; merito externarum causarum totidem differentia orientur, quot fuere enumeratæ eius generis causæ, ita ut eadem suppressio alia fiat ab externis causis necessariò occurrentibus, alia ab his quæ necessariò nò occurrunt.

*Differentia  
à loco affe-  
cto.*

*Differentia  
à causa ef-  
fectrice.*

H DE

## De Morbis Muliebribus

### De Signis. CAP. XXVI.

*Signorum  
necef.*

*Ordo signo-  
rum.*

*Signa in ge-  
nere.*

*6. de loc. af.  
cap. 5.*

*5. Aph. 39.*

*Signa ab ac-  
tione laesa.  
Signum.*

*Consensus  
uteri cum  
mamillis.*

**E**Xplicata essentia suppressionis menstruorum, ac proinde singulis eius causis, & generationis modo: speciebus etiam omnibus enumeratis, reliquum esset curationem illius aggredi: uerum quia vnica ea esse non debet, sed pro causarum multiplicitate, ac uarietate uaria & multiplex habeatur, propterea, ut citra omnem confusionem illa proponi possit, pramittenda prius erit signorum tractatio, ut eorum beneficio, non solum cognoscamus: propositum Symptoma in genere, uerum etiam singulas illius causas, & species distinguamus, quæ pro ut diuersæ sunt, propriam etiam curationem expostulant. De signis igitur tractaturus, ea imprimis proponam, quæ ad suppressionem simpliciter diriguntur, mox ad ea descendam, quæ singulas illius species declarant, inuicemq; distinguunt: generatim itaque cognoscemus mulierem hoc Symptomate laborare, ex ipsius relatione: ex qua pariter cognoscere poterimus, an eadem suppressio integra aut diminuta fuerit, recens uel antiqua: & Hipp. loco citato, inquit: Si mulier, quæ neq; grauida est, neq; peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt: fit autem lac in his mulieribus, quia sanguis menstruus ita uolenter cohibitus, ad mamillas raptum habet, ubi materia generationis lactis efficitur: peruenit autem ad has partes, mediantibus uenis, quibus uterus necitur & alligatur cum ipsis mamillis, ex qua colligantia mutuus quidam consensus earum partium adinuicem oritur, ut hinc ex mamillarum contactu magna in muliere uoluptas sentiatur, coeundiq; desiderium excitatur, quare ex lactis præsentia, menstrua suppressa esse significabitur. Vbi uerò nihil lactis in mammis conspiciatur,



cietur , ad alia signa deueniendum erit : conqueretur igitur mulier ista de lassitudine & insueta quadam totius corporis grauitate , quæ non aliunde causatur , quàm ex diffusione huius materiæ copiosæ per totum corpus , cuius præsentia ut corpus grauat , ita illius euacuatione ab onere subleuatur , & pristinum robur acquirit. Hæc præterea lassitudo non solum corpus uniuersum detinebit , sed crura potissimum & coxas , propter harum partium cum matrice maiorem colligantiam : conqueri ad huc magis solent , de quodam dolore lumbos , & imâ uestris partem potissimum occupante , idq; ob harum partiû propinquitatē cû loco affecto , de quo signo Hippoc. etiam meminit , quod tamen signum nec perpetuum , nec necessarium est : circa quod dubitandi occasio oritur , cur sit , quod hic dolor in prægnantibus quoq; longè magis non obseruetur , in quibus pariter menses detinentur , & in magna copia . Dicendum qd in prægnantibus sanguis iste menstruus in uterum fluit sensim , & citra uolentiam , ob id tristis illa sensatio nō oritur , quæ non solum obiectum disproportionatum requirit , uerum etiam ut confertim & uiolenter agat : præterea detentio menstruorum in prægnantibus secundum naturam fit , quæ autem uaturaliter fiunt , ullam noxam afferre solent ; & præterea natura comparatum est , ut in prægnantibus sanguis iste menstruus , qui post fœtus nutritionem superest , in determinato loco suscipiatur , ubi etiam quiete custoditur ad tempus usq; pariendi : quapropter his & aliis de causis prægnantes à dicta molestia immunes esse consueuerunt : Conqueruntur quin etiam de dolore spinæ , colli , oculorum , frontis , de uentriculi inappetentia , nausea , & grauitate ; quæ omnia pariter contingunt , ratione eiusdem colligantiæ , quàm uterus habet cum his omnibus partibus , totum , præterea corpus impallefcere solet . Quandoq; etiam horror consequitur

Signum.

Signum.

Signum.

I de morbis mul.

Dubitatio.

Solutio prima.

Hyp. lib. de genitura.

Solutio. 2.

Solutio. 3.

Signum.

6. de loc. af. cap. 5.

Signa à qua litate mutata

H 2 di-



## De Morbis Muliebribus

*L. de mor  
b. vulg.  
de morb.  
virg.*

*L. Epid. cō. i.  
25.*

*Signa ab ex  
cunte mu  
tato.*

dictas mulieres secundum totum corpus, & fit, quia a suppresso sanguine frigidiores vapores eleuantur, qui per sensibiles partes distributi, tristem illam frigiditatis sensationem inducunt, ut corpus totum ueluti exorescat; nonnunquam etiam ad tales horrores sequuntur febres, quod contingit, quando eadem materia putredinem aliquam concipit, atq; istæ, modò intermittentes sunt, modò continue, pro materiæ putrescentis homogeneitate & heterogeneitate, modò etiam salubres modò insalubres, pro maiori & minori eiusdem materiæ copia, pro excellentiori, & minus excellenti putredine, pro loci, in quo illa putrescit maiori & minori propinquitate ad ipsum cor, & deniq; pro uirtutis robore, aliquando fieri solent etiam præfocationes matricis. Cognoscitur etiam hoc malum, quia per vterum consuetis temporibus uel nihil effluit, ut in integra suppressione contingit, uel parum. Hæc de signis in genere.

## De Signis Differentiarum. CAP. XXVII.

*Signa exter  
narum cā  
rum.*

*Signum.*

*Signum de  
fec. mest.*

**D**istinguemus autem species inter se, & in primis suppressionem fieri ab externis causis, si in uiuendi ratione errores fuerint commissi, ut ex parte aeris, si mulier frigidiori exposita fuerit, uel in frigida diu perstiterit: ab his enim uterus & ora ipsius ita cogi densariq; possunt, ut non effluat, quod effluere deberet. Idem contingere pariter potest ex cibis copia & qualitate peccantibus, ut si crassioribus & adstringentibus usa fuerit; quod ipsum de potu etiam intelligendum erit, propter inediam uero consueta menstrua non apparent, non quia propriè supprimantur, sed potius quia non generantur, somnus



Somnus etiam & uigiliae, utrumq; si modum exceſſerit, consueta uteri euacuatio non apparebit: ex longiori .n. somno, non solum superfluitates aggregantur, sed etiam ob nimiam copiam detinentur: ex uigiis uero materia absumitur, corpusq; totum exiccatur. Interroganda etiam mulier erit de motu & quiete, quæ si in otio uitam degerit, non leuem occasionem corpori præbet, ut aggreget materias copiosas, crassas & lentas, à quibus uenæ obstrui solent. Si autem multis exercitiis usa fuerit, & menstrua non fluant, defectui potius materiæ causa tribuenda erit: deficit autem, quia à dictis exercitiis genita materia absumitur, & generanda prohibetur. Eadem ratione menstrua non apparebunt, si mulier purgantibus medicamentis fuerit assueta, quibus illa materia per alias uias euacuari solet, quod etiam contingit, ob fluxum sanguinis narium, uel hæmorrhoidum & alias conſimiles euacuationes. Accidentia deniq; animi, quantum possint in corporis mutatione & alteratione, neminem latere arbitror. Si autem nulla ex causis externis præceſſerit, argumentum nobis erit, suppressionis causam internam esse. At quæ nam ea sit, discurrentes per signa magis specifica distinguemus: & imprimis si interna hæc causa uterum primario afficiat, ratione totius corporis, & cæterarum partium mulier benè se habebit: dum autem uterus ita afficitur, uel facultas eius expultrix erit labefactata, uel impedita, & si labefactata id contingit ratione intemperiei calidioris, frigidioris & siccioris, sine materia, & cum materia, quantitate & qualitate peccante, generatim igitur cognoscemus nudam intemperiem ex absentia ponderis & grauitatis circa illas partes, ex lotii tenuitate, & si menstrua exierint, pauca admodum erunt. An uero hæc intemperies calidior uel frigidior fuerit, & in latitudine sanitatis contenta uel extra distinguemus, quia si calidior fuerit, in sanitatis latitudine

*Signum.*

*Signum.*

*Signa inter  
narum cau  
sarum.*

*Signa uteri  
primo affe  
cti.*

*Signa intē  
periei.*



## De Morbis Muliebribus.

- Signa intemperiei morbose.* titudine contenta, nulla aderit febris, uel alius morbus: præterea mulier circa uteri regionem calorem & feruorem sentiet, ut tactus etiam iudicio facillè innotescat; quæ etiam præcessere, consideranda erunt: quoniam ubi locum habet calidior intemperies, calefacientes causæ præcesserunt, & tandem à similibus alterantibus talis intemperies augebitur, à contrariis uerò iuuabitur: contra si intemperies frigidior fuerit, signa prioribus opposita obseruabuntur. Siccior autem cognoscetur ex duritie, densitate, angustia & insueta quadam siccitate oris uteri, & à causis exiccantibus talis intemperies intendetur, ab humectantibus uerò commoderabitur, cui intemperiei si materia etiam accesserit distinguere oportet materiæ genus, & eiusdem peccata. Ut meritò generis cum esse possit quilibet humor singulos distinguemus, recurrentes ad signa, quæ unumquemque humorem consequuntur, ut præter cætera consideranda nobis occurrat subiecti corporis temperatura, habitus, ætas, educatio, lotium & prægressa uictus ratio. Quicumque autem fuerit humor, cum ad suppressionem concurrere possit ratione quantitatis, qualitatis & utriusque, quantitatem nobis indicabit grauitas, & pondus, secundum uteri regionem; palpebræ oculorum erunt subtumidæ, quorum radices cum matrice magnū habent consensum, ut hinc etiam fiat quòd tempore quo menstrua imminēt, uel iam fluunt, mulieres quandam molestiam in capite patiantur, in facieque, & circa oculos alteratio apertè appareat, quibus præterita etiam uictus ratio addenda erit. Si præter hæc, signa illa etiam accesserint, quæ eiusdem materiæ crassitiem, & lentorem nobis indicare possunt, iam etiam constabit, talem suppressionem, non solum à materiæ copia causari, sed ab eiusdem etiam qualitate produci. Si autem eadem facultas uteri ob externos errores læsa potius fuerit, cum talis læsio fieri possit,
- Signa itemperiei frigide.*
- Signa itemperiei sicce.*
- Signa itemperiei cum materia.*
- Signa copię.*
- Signa qual.*
- Signa impecta facultatis.*



fit, tùm utero affecto, tùm aliundè, distinguemus uteri læsionem, quoniam mulier in reliquo corpore aut aliqua eius parte conquerendi ullam occasionem habebit, dum autem uterus ita afficitur, cum affici possit secūdum propria uasa angustiora reddita, uel secundum propriam substantiam, distinguemus, quia si secundum propriam substantiam oblæsus fuerit, tunc illius facultas potissimum impiedietur à morbo in soluta unitate, consequenter uterus detinebitur ulcere, ad quod dolor comitatur, & saniei sanguinolentę fluxione, uel fistula corripietur, & tunc exhibit materia expers sanguinis, uel abscessus, tuncq; exhibit materia purulentior & copiosior, alteriusq; generis à sanguine menstruo. Si deinde facultas impedita fuerit secundum propria uasa, causa referenda erit in morbum malę compositionis, & potissimum in uijs angustioribus redditis, quā uasorum angustiam cum à multis causis prodire dixerimus, nempe ab obstructione, cōstipatione compressione, coalescentia et subsidencia, singulas hac ratione distinguemus, ut meritò obstructionis illam cognoscamus ex corporis habitu plethorico uel cacochymo. Si plethoricus fuerit, illius obstructionis erit indicium, quæ à sanguinis plenitudine, & sola copia peccantis fit, quemadmodum ex cacochymo alia obstructio significabitur, quæ à materiæ crassitię & lentore producitur. Præcesit quin etiam ea uictus ratio, quæ uel sanguinis copiam augere potuit, uel materiæ crassitiem & lentorem generare: Caterum quia obstructio ista, quęcunq; ea sit, esse potest in uenis uteri, uel alibi, distinguemus, si fuerit in uenis uteri, circa illius regionem in sueta quædam grauitas sentietur, nec non etiam circa illius partes circumiacentes, & præsertim si obstructio à copiosa materia facta fuerit; cui si accesserit etiam lentor, & uisciditas, superaddetur etiam laxitudo quædam in coxis, & tibijs, & præcessore etiam causæ externæ, quę primò

*Sig. soluto unitatis.*

*Signa obstructionis.*

*Signa loci affecti.*

*3. de causis sympt.*

*5. Aph. 28.*



## De Morbis Muliebribus.

primò in uterum agere potuere, & uenas eius densare, at signis istis absentibus aliqua in nobis coniectura oritur de aliarum uenarum obstructione, de illis inquam, quæ in penitioribus partibus sitæ sunt, ad uterum tamè deducuntur: si eadem facultas à comprimente causa impediatur, hæc compressio fiet uel a pinguiori habitu, uel à tumore aliquo uteri, aut partium circumiacentiũ, quarum grauitate compresso utero illius etiam uix & uasa compressionem patiuntur. Ceterum hic tumor cum esse possit inflammatorius, erisypelaceus, oedematosus & scirrhusus, distinguemus recurrentes ad propria eorum signa: nam si tumor inflàmatorius fuerit, præter id, quòd aderunt inditia sanguinis copiosi, uehemens etiam febris infestabit, & in ea regione grauius dolor aderit, cum sensu doloris pulsatis. Huc accedunt etiam ea signa, quæ capiuntur à temperatura corporis calida & humida, ab habitu moderate carnosio, ab ætate iuuenili, & ea prægressa uictus ratione, quæ ad sanguinis generationem apta fuit: Si tumor fuerit erisypelaceus, febris erit intensior & acutior, grauitas in ea regione paulò minor, dolor tamen acerbior & molestior, & cum ardore, & feruore insigniori: quibus addenda erit temperatura calidior & siccior, corporis habitus gracilior, ætas iuuenilis, & præterita uictus ratio his proportionata: Si tumor fuerit atrabilaris febris adhuc seuior erit, & Symptomata omnia magis lethalia, temperatura corporis calidior & siccior, corporis habitus gracilis, color subobscurus, ætas iuuenilis uel consistendi, & uictus ratio quæ præcessit calidior & siccior: Si tumor oedematosus fuerit, aderit quidem grauitas, sed cum obtusiori dolore, cum febre remissiori, longiori tamen, & cum cæteris Symptomatibus magis moderatis: quibus pariter addas totius temperaturam frigidam & humidam, corporis habitum sub tumidum, & prægressam uictus rationem frigidam & humidam.

*Signa compressionis.*

*Signa inflammationis.*

*Signa erisipelatis.*

*Signa tumoris melancholici.*

*Signa oedematis.*



dam . Si autem menses detineantur propter constipationem cognoscemus , quia obstetrix digitum immittendo os uteri clausum , strictioremq; ceruicem inueniet , & ad differentiam prægnantis mulieris , non solum in ea parte talem angustiam obseruabit , verum etiam cum aliqua duritie coniunctam , quod Hipp: etiam eo Aphorismo significasse visus est , cum dicit , quibus os vteri durum est , his uteri os comprimi necesse est . Quod si citra duritiem clausum fuerit , illam vtero gerere coniicies . At si cum duritie clausum sit , vterum affectum esse significabit : Si autem menses detineantur propter coalescentiam , cognoscemus quia præcescit vlcus & post ipsum subsequuta est suppressio . Si hæc ipsa euacuatio non fiat propter subsidentiam cognoscemus quia præcescit usus refrigerantium que densant exiccantium & astringentium , vel etiam insignis aliqua euacuatio , ratione cuius inanita vasa subsident , Hæc de signis vteri læsionem indicantibus , siue ob labefactatam illius facultatem , siue impeditam , facta fuerit ; quæ facultas si alterius causa potius impediatur , & primò ratione totius , quia facultas eius naturalis labefactata sit , tunc signa aderunt totius intemperiem indicantia , siue calidior ea fuerit , siue frigidior , quæ pariter esse potest morbosa , & nõ morbosa , & vtraq; cum materia , & sine materia : Morbosa cognoscetur , si ob dictas intemperies totum in actionibus suis lædatur , quemadmodum si febris aderit putrida , aut hectica , in hac menstrua non fluent ob totius calidiorem intemperiem morbosam : Cæterum dum ratione huius intemperiei fluxio non fit , cum id contingere possit , quia materię fluendæ generatio prohibeatur , uel potius quia genita materia intus cohibeatur , distinguemus utrumq; quia si febris uehemens fuerit , qualis est ardens , insigni suo calore , materiam genitam citò absumere poterit ; & ne in posterum gignatur prohibere : Pariter si febris remissior

*Signa constip.*

*5. Aph. 54.*

*Signa coalescentiæ.*

*Signa subsi.*

*Signa facult. læse, alterius causa*

*Signa deficientis materię.*

I



## De Morbis Muliebribus

missior fuerit, diuturna tamen, non minus poterit idem corpus inanire, & exiccare, ut eiusdem materię generatio omninò inhibeatur, sicut in hecica febre contingit, at si febris remissior extiterit, & cum breuitate coniuncta, ratione remissioris caloris tantam agendi vim non habebit, ut genitam materiam absumere possit, sed illius partes tenuiores resoluendo crassioribus & magis lentis relictis, obstructions causabit, sicq; materię & genitę & generandę fluxum impediet: ubi uerò totum calidius fuerit citra sensibilem facultatum læsionem illius excessus caloris inditium erit, quia in sanitatis latitudine adhuc continetur, si autem totum frigidiori intemperie afficiatur, cognoscemus quia nulla aderit febris uehemens, aut remissa, breuis aut longa, ratione cuius intemperiei materia generari poterit, præsertim si cum humiditate coniugatur, sed ob calorem diminutum crudior illa erit, ac proinde ad obstructionem pariendam idonea; quæ obstructio non solum esse potest in uasis ipsius uteri, sed etiam in uenis totius, quod cum contingit, signa aderunt, copiam pituitę in toto corpore indicantia, si autem eadem intemperies frigidior, cum siccitate potius coniuncta fuerit, ratione huius menstrua non fluent, quia non generabuntur si præter intemperię materia etiam accedat, cum hæc concurrat ratione copię & qualitatis solam copiam cognoscemus ex corporis habitu sanguineo, ex temperatura calida & humida, ex colore rubeo, & si aliqua portio materię per uterum fluxerit, illa pariter rubicundi erit coloris, ex uenarum etiam latitudine, pulsu pleno, urina colorata & rubea, & uictus ratione præterita, apta sanguinis copiam generare; & deniq; mulier ista, dum morbis corripitur, sanguineis potissimum subiicietur: si iuncta fuerit cum materia biliosa, pituitosa aut melancholica, reccurrendum erit ad signa superius proposita, Et hæc de signis dicta

*Signa obst.*

*Signa copię  
sang.*

*Signa bilis.*



dicta sint totius facultatem labefactatam indicantibus  
 siue fuerit labefactata à nuda intemperie, calidiori, in-  
 quam humidiori, frigidiori & sicciori, atq; hac tum  
 morbosa tum non morbosa, siue etiam cum mate-  
 ria coniuncta fuerit, sanguinea inquam, pituitosa, bilio-  
 sa, & melancholica, copia aut qualitate peccante. Si uerò  
 eadem facultas totius fuerit impedita, cum impediri  
 possit, à morbo in mala compositione & soluta unitate,  
 distinguemus quia si morbus fuerit in mala compositio-  
 ne, potest esse in aucta magnitudine, & tunc aderit Ca-  
 chexia, uel hydrops, siue hæc tympanitis fuerit, anasar-  
 ca uel ascitis, quorum omnium causa menstrua non flu-  
 unt, quia materia per totum corpus diffunditur. A pari  
 si fluxio non fiat ratione morbi in magnitudine diminu-  
 ta, corpus conspicietur emaciatum & tabe confectum;  
 quorum causa fluxio non fit, quia materia non genera-  
 tur, imò ne dū superflui humores redūdare poterūt, sed  
 nec alimētales pro corporis reparatione producentur,  
 quod si eadem facultas impediatur à morbo insoluta v-  
 nitate, cognoscemus ex præsentia scabiei, lepræ, & reli-  
 quorum tuberculorum, in quibus affectibus, materia, quæ  
 per uterum exire deberet cum alijs humoribus permix-  
 ta ad corporis circumferentiam recurrit: Atq; hæc de  
 signis respicientibus læsam facultatem ratione totius cor-  
 poris, siue illa fuerit labefactata à morbis in intemperie,  
 siue impedita à morbis in mala compositione, & soluta  
 unitate: Si deinde ex altera parte menstrua non fluxe-  
 rint quia læsio sit in partibus corporis, cognoscemus  
 quia totum benè habebit: dum autem pars aliqua lædi-  
 tur, cum principalis & inferuiens esse possit, distingue-  
 mus, quia si quælibet pars principalis benè habuerit, cau-  
 sa referenda erit in alias partes, & quæcunq; illa fuerit,  
 uel illius facultas erit labefactata, uel impedita. Si labefa-  
 ctata aliqua intemperie correpta erit, simplici aut com-  
 posita

*Signa male  
compositionis.*

*Signa solu-  
nitatis.*

*Signa lesa-  
rum par-  
tium.*

## De Morbis Muliebribus

posita cum materia uel sine materia. Vnde si uenterculus intemperie affectus sit, & menstrua non fluant, referri poterit in eundem uenterculum facultate eius labefacta, similiter si aperta fuerint uenæ narium uel hemorrhoidum, uel alui fluxio adsit, in has quoque partes causa referenda erit. Si autem tales partes bene habuerint, suspicio erit de principalibus partibus affectis, quæ pariter obladi poterunt earum facultate labefacta, uel ob externos errores, ut ob morbos in mala compositione, uel soluta unitate, propterea ad ea signa recurrendum erit, quæ dictarum partium malam constitutionem indicare possunt, siue epar fuerit, cor aut cerebrum: quæ dicta sufficiant de signis suppressionis menstruum ob lesam uteri facultatem, siue primario siue secundo, siue facultate labefacta siue impedita, siue ratione totius siue partis principalis & non principalis.

## De Indicationibus. CAP. XXVIII.

Proposita cognitione suppressionis menstruum tum in genere, tum secundum singulas eius species, tum à priori per suas causas formales, materiales, & efficientes, internas, & externas, proximas, & remotas, tum à posteriori per sua signa, ab actione laesa, qualitate mutata & exeunte mutato accepta; reliquum est ad illius curationem descendere, consequenter ad cognitionem efficientiorum, auxiliorumque iuuantium inuentionem, & rectam eorum administrationem, quæ ut citò tutò ac iucundè habeatur, non historicè & sola rerum obseruatione proponenda erit, sed ex rei potius natura depromenda, quod fiet, si Indicationum uirtute iuuantia auxilia inuenimus, prout ad dogmaticum pertinet, mox uerò de materiis eorundem sigillatim & diligenter tractauerimus.

In

Lib: ad  
Thrasibul:  
9. meth. 3.



In curanda igitur muliere, cui menstrua sint suppressa, tria potissimum nobis considerata occurrunt. Omnium primum est causa morifica, quæ continens dicitur. Secundò causa quæ morbosa fieri potest, Postremò uires, si ne quarum custodia ullus morbus possigari potest. Hinc triplex indicatio triplexq; iuuans auxilium oritur, ut à causa continente curatorium auxilium indicetur, à causa quæ hanc præcedit, auxilium præseruatorium: à uirtute deniq; siue totius siue partis fuerit, uitale auxilium orietur. Quò igitur ad indicationes curatorias si menses inprimis non fluxerint, facultate uteri labefactata, cum ratione intemperiei labefactetur, indicabit auxilium alterans in contrarium. Si eadem fuerit impedita, uenis uteri angustioribus factis hæc angustia auxilium iuuans indicabit merito causæ facientis talem angustiam, siue hæc obstructionem fecerit, constipationem, compressionem, coalescentiam uel subsidentiam, ut meritò obstructionis, cum hæc fiat à materia copia uel qualitate peccante, ex parte copię indicabit auxilium minuens & euacuans, meritò qualitatis, si calidior, uel frigidior fuerit, auxilium alterans in contrarium indicabit, quemadmodum si crassior & uiscidior auxilium attenuans & detergens, ex parte deinde compressionis, cum hæc fiat à tumore inflammatorio, cedematoso, erisypelaceo, & scirrroso, ad eorum tumorum indicationes adeundum erit: ex parte constipationis cum hæc oriatur à callo adnato & carne secundum uias & internas uteri partes, hæc amouenda erunt, inprimis tamen ex parte duritiei emolliendum erit, ex parte materiæ facientis callum, digere & resolueri oportebit, meritò coalescentiæ cum hæc sequatur ulcus iam ad cicatricem perductum, hæc cicatrix cum morbus sit in superficie leniore & densiore reddita, coniungens, & densas partes, quæ distantes & rare esse deberent indicabitur auxilium partes agglutinatas & densatas disiungens, & ra-

ro

9. meth. 6.

& 7.

4 meth: 4.

lib. ad

Thrafi-

bul. 8. &

9. & 25.

Indic. 3.

Indic. cu

rat, ab in-

temperie.

A materia

copia.

A qualit.

prima.

A qualit.

secunda.

A tumore.

A callo.

A cicatri-

ce.



## De Morbis Muliebribus.

- ro faciei; meritò subsidentiæ, cum hæc fieri possit à nimia uasorum inanitione, tum à causa densante, meritò inanitionis, indicabitur auxilium replens, sicut ex parte densitatis, si fiat à causis refrigerantibus, uel à materia impacta & imbibita in substantia partis, indicabitur auxilium calefaciens, laxans & aperiens. Si eadem materia consideretur penes occultas qualitates, si uenefica fuerit dissimilem proportionem & aduersariam habens, naturæ & proportioni ipsius uteri, requirer auxilium simile proportioni naturali ipsius uteri, & dissimile proportioni materiæ ueneficæ, consequenter expostulabit Alexipharmacum & Alexiterium, prout materia uenefica dupliciter expugnari expurgariq; potest, per attractionem scilicet, & ita requirit simile, sicut in lue Gallica materia auxilii Gallici est hydrargyrium, si expurgetur per expulsionem, ita requirit dissimilia, unde si uenena extra accedant, requirunt Alexiteria, si intra Alexipharmaca, quæ rursus materia si quieta & impacta fuerit, indicat auxilium ualidè auellens & discutiens, si moueatur raptumq; habeat ad partem ad quam non deberet, indicabit auxilium reuellens, si autem facultas impedita fuerit, læsione alibi quam in utero existente, tum principe, tum non principe, tunc pro causarum diuersitate diuersæ pariter indicationes orientur: quare si totius uel partium facultas labefactata erit, cum ab intemperie id fiat, auxilium in contrarium alterans significabit. Si præter intemperiem accedat materia, hæc considerabitur ut genita & ut generanda. Si genita fuerit & partem uel totum actu afficiet, ut operationes lædat auxilium curatorium indicabit, quod ipsius copiam euacuet, uel lentorem, ac crassitiem attenuet, ac detergat. A pari si menses non fluant, quia materia per alias partes euacuetur, per fluxum sanguinis narium uel hæmorrhoidum, uel cutim, occurrendum erit cū reuellentibus materiam ad consueta loca, si autem materia
- Ab inaniti.*  
*A densit.*  
*A qualit.*  
*uenefica.*  
*A materia*  
*qui eta.*  
*A materia*  
*mob.*  
*A fac im-*  
*pedita.*  
*Ab intem-*  
*perie.*  
*A materia*  
*genita.*  
*A materia*  
*mobili.*

ria



ria ista sit genita, ut nondum illius causa totum uel partes in propriis functionibus oblatae sint, indicabitur auxilium praeservatorium, ita ut illius euacuatio, attenuation & deterfio, praeservationem potius quam curationem respiciant. Denique si eadem materia consideretur ut generanda cum generetur ratione intemperiei totius uel partis determinatae, indicabitur auxilium non solum alterans in contrarium, sed proportionatum, ut pristinum robur restituat dictis partibus, qua ratione Epar requirit Epatica, stomachus stomachica, & matrix matricaria. Quo uero ad uirtutem, haec considerari potest & ratione totius & partis determinatae, ut uirtus totius sui custodiam indicet cum alimentis, & pariter uirtus partis custodiam magis determinatam exposculabit.

*Indic. praeser.*

*Indic. uirtuales.*

## De Prognostico. CAP. XXIX.

**I**N morbis futura praedicimus considerantes res praeter naturam, naturales & non naturales, penes uim, magnitudinem, numerum, originem & tempus, quae omnia consideranda sunt, tum seorsum, & absolutè, tum inuicem comparando, ut quo ad res praeter naturam seorsum consideratas, tria perpendenda occurrant, morbus, causa & Symptoma. Suppressio igitur menstruum in genere illud est Symptoma, ratione cuius foeminae multum patiuntur, multisque alterationibus & lethalibus subiiciuntur, ut hac de causa affectus non sit contemnendus, sed magni momenti haberi debet, & praesertim quia huius causa generatio, & propagatio tollitur: aliaque multa Symptomata sequuntur supra enumerata: Si deinde consideremus differentias, tunc pro morborum causarumque discrimine idem prognosticum uariabitur. Vnde si pendat

*Ratio prognost. unde habeatur.*

*Res praeter nat.*

## De Morbis Muliebribus. 20

deat ab Vtero primariò affecto , deterior erit, quàm si  
 secundariò & per consensum , cæteris tamen semper pa-  
 ribus , & dum primò afficitur, cum affici possit facultate  
 labefacta , uel ob externos errores , deterius illud erit ,  
 quod à labefactata dependet, quàm impedita; & cum la-  
 befactari possit ab intemperie nuda, & cum materia, peius,  
 illud erit quod dependet ab intemperie cum materia ,  
 quàm quod à nuda qualitate producitur : illa enim ,  
 præter alterantia requirit etiam materiam euacuantia, &  
 præparantia : hæc autem solis alterantibus tollitur, & rur-  
 sus in hoc genere , illa adhuc deterior erit, quæ composi-  
 ta est, quàm simplex, quia facilius est uni qualitati quàm  
 duabus occurrere, si simplices intemperies mutuò compa-  
 rentur, deterior erit actiua quàm passiva , quamuis enim  
 ratione utriusq; actio lædatur, actiuæ tamen qualitates,  
 cum maioris sint actiuitatis passiuis, maior læsio inde pro-  
 dicit; quòd si egedem actiuæ qualitates cum passiuis com-  
 parentur , penes resistantiam, passiuæ erunt deteriores,  
 quia resistunt magis, & præsertim quia passiva qualitas ,  
 ab alia qualitate passiva auferri debet , in qua actiuitas  
 pauca est , eò autem erit peior, quantò magis fuerit con-  
 firmata . Si comparentur passiuæ inter se , deterior erit  
 sicca quàm humida; longiori enim tempore pars sicca &  
 proprio humido destituta humectatur , quàm quòd hu-  
 mida exiccetur . Si actiuæ pariter mutuò comparentur ,  
 & primò penes actiuitatem, peior erit intemperies cali-  
 dior, contrà si penes resistantiam, deterior erit frigidior,  
 quamuis tutius sit , frigidiorum uterum calefacere, quàm  
 calidum refrigerare : Inter compositas autem omnium  
 pessima est frigidior & siccior , quia à principiis genera-  
 tionis & uitæ magis distat : præterea quæcunq; fuerit hæc  
 intemperies , cum esse possit morbosa, & non morbosa,  
 natua & ascititia , deterior erit, quæ morbosa est, & na-  
 tiua, quàm non morbosa, & ascititia, cui si materia acce-  
 dat ,

7. Meth. 5.  
 6. de tuer-  
 da. 10.

7. meth. 5.



dat, pro illius copia qualitatibus, & aliis conditionibus uario modo prognosticandum: Si deinde vteri facultas impedita fuerit, cum impediri possit à causis internis, & externis, cæteris paribus, illa erit peior, quæ ab internis causis producitur, quæ cum fieri possit à morbo in mala compositione, & soluta unitate, maioris momenti uidebitur unitas soluta, quam mala compositio; & rursus pro utriusq; morbi, & causarum diuersitate diuersa prognosticandi ratio colligi poterit: Si deinde uterus per consensum afficiatur, deterior ea suppressio erit, quæ sit per consensum à toto, quàm ratione partis, & pro totius ac partium diuersa affectione, diuersimodè prognosticandum erit. Vnde si totum afficiatur ob quodlibet morbi genus, difficilius Symptoma orietur, quàm si ab vnico genere nascatur. A pari si pars affecta principalis potius fuerit, quàm non principalis, idem Symptoma uariari poterit, quemadmodum etiam pro diuerso affectionis genere, vehementia, resistentia, numero, diuturnitate, & aliis, diuersimodè prognosticandum erit: præterea dum materia quæ per vterum exire deberet, ob dictas causas non exit, uel per alia loca effluet, uel intra corpus detinebitur: Si intus cohibeatur, deterius erit quàm si quouis modo expurgetur, ut si sanguis per nares effluat uel hæmorrhoidas, melius erit, quàm si nullo modo euacuetur, & dum intus detinetur, uario adhuc modo prognosticandum, pro Symptomatum magnitudine, vehementia, numero, duratione, loco affecto, & causarum varietate: Vnde si materia decubuerit in partes principes, ut in cerebrum, Epar, cor, malum erit maioris momenti, quàm si ignobiliores partes occupauerit, & dum cerebrum petit, ibiq; Apoplexiam, Epilepsiam uel aliquod delirij genus causauerit potius, quàm grauitatem & dolorem, deterius prædicendum, præsertim si hæc Symptomata vehementia potius fuerint, quàm remissa, frequen-

Causa.

Hyp. 5. 4.  
ph. 34.

Sympt.

tia K



## De Morbis Muliebribus

*Res naturales.*

*Virens.*

*Annexa.*

*Res non naturales.*

tia quàm rara, diuturna quam brevia, plura quàm pauciora. A pari si eadem materia in cor decubuerit, feceritq; lypothymiam, aut Syncopin potius quàm palpitationem, idem statuendum erit, quod de cerebro dictum fuit, & merito durationis hyp. lib. de morbis mul. dicebat quod ubi suppressio durat per sex menses amplius non curatur, quod intelligas ubi cum vehemètia symptomatum est coniuncta. Quo uerò ad res naturales, consideranda est virtus totius ac partium tùm genericè, tùm specificè, pro ut robusta uel imbecillis fuerit, atq; ea ratione solidorum tantum, uel carnosì generis, uel spirituum, uel plurium, uel omnium simul; & præterea prout huiusmodi esse potest, in præsentia tantum, uel in futurum etiam simul, ex iis enim omnibus ratio prognosticandi variatur nam virtus simpliciter robusta, & omnibus modis, in omnibus etiam morbis spem salutis pollicetur, eadem secundum omnem rationem imbecilla, mortem potius cominabitur: quæ autem à dictis extremis recesserit, pro ut magis ad vnum quàm ad alterum accesserit, poterit etiam modo mortem modò vitam significare, in quo genere rerum naturalium præter virtutem principalem, consideranda etiam erunt illi annexa, cuiusmodi sunt temperatura, ætas, corporis habitus, consuetudo, uitæ institutum & huiusmodi, quæ omnia, ut signa possunt connotare propositæ virtutis robur uel imbecillitatem. Postremò res etiam non naturales contemplandæ erunt, quarum omnium temperatura, & temperatus usus futuram sanitatem pollicebitur, contra intemperatus se habebit, imò ad rectè prognosticandum non satis erit tria hæc, res inquam naturales, non naturales, & præter naturam seorsum & simpliciter considerare, quin imò etiam oportet easdem mutuò conferre, expendendo semper quæ magis possint ad bonum vel malum euentum in morbis prognosticandum; quod etiam Hipp: conceptis verbis signi-



significauit, dicens, in morbis minus periclitantur ægro-  
tantes, quibus cunq; propriæ naturæ, & ætatis & habitudi-  
nis temporis & regionis & horæ ægritudo, inest, magis  
quàm quibus nō propria secundum horum aliquid inest.

Secunda a-  
ph. 31.

*De Materiis Auxiliorum.*

*CAP. XXX.*

**C**VM menstruorum suppressio, tantorum malorum  
causa esse possit, ut quandoq; miseras mulieres ad  
mortem usq; perducant, non erit illius curatio negligē-  
da uel proroganda, sed propolitis scopis satisfaciētes per  
omnes auxiliorum materias discurrendum erit, quæ licet  
plures ac propemodum infinitæ sint, ex triplici tamen  
fonte omnes deducuntur, chirurgico, pharmaceutico &  
diætetico, ut ad fontem chirurgicum ea omnia spectare  
uideantur, quæ chirurgi ope & manuali operatione ma-  
gis indigent, sub quo genere continebuntur uenarum, &  
arteriarum sectio, cucurbitulæ scarificatæ & non scarifica-  
tæ, hirudines, cauteria, uesicatoria, sinapismata, frictions,  
ligaturæ & huiusmodi. Ad fontem pharmaceuticum atti-  
nebunt omnia medicamentorum genera totum & partē  
aspicientia, intusq; & extra administrata, & si intus, siue  
lenientia fuerint per supernum os exhibita ut uomito-  
ria, uel per inferius admota, qualia sunt, Clystoria suppo-  
sitoria, & cætera per secessum euacuātia, siue præparan-  
tia extiterint, atq; hæc uias respexerint, aut humores, bi-  
lios, pituitosos & melancholicos, & rursus siue crassi fue-  
rint, uiscidi, lenti, acres & huiusmodi, siue purgantia sint,  
quomodocunq; purgauerint, corpus inquam uniuersum,  
uel determinatam partem, ut prioris generis sint, Diapho-  
retica que per sudorē, uel halitum insensibilem euacuant,

*Materia  
medicina  
les ex 3.  
fonte ca-  
piuntur .  
Materia  
pharma.*

*Lenientia .*

*Preparan-  
tia .*

*Purgantia.*

K 2 siue



## De Morbis Muliebribus

siue extra admota fuerint, cuiusmodi sunt Balnea calida aquea & aerea, quæ suo calore porositates aperiendo materiasq; intus detentas extenuando, & fundendo, à centro ad circumferentiam attrahunt. Eadem sit ratio de illis quæ intus exhibentur, siue sudorem prouocent, materias attenuando, uias aperiendo & uirtuti robur addendo; per purgantia uerò per determinatam partem illa intelligo, quæ lotium prouocant, ut Diuretica, per uterum, ut prouocantia menses, uel per secesum quæ solutiuia nuncupantur, quæ omnia licet per determinatam partem euacuent, uniuersum tamen corpus respiciunt, quibus illa etiam adduntur, quæ ad partem determinatam magis diriguntur & topica uocantur, quorum alia ad contenta alia ad continentia ordinantur, quæ contenta respiciunt, purgantia erunt, quæ uerò continentia, roborantia & alterantia nuncupantur. sic respectu capitis erunt caput purgia, siue sensibilibus caput inaniant, siue insensibilibus euacuent, quæ à loco per quem ducuntur humores denominationem sumentia, uocantur masticatoria, nasalia & auricularia, quæ autem insensibilibus euacuant erunt lotiones stillicidia, & fomenta. A pari respectu uteri erunt pessaria, clysteria, suffitus, sessiones, fometa & huiusmodi: quæ uerò continentia respiciunt, roborantia dicuntur, quia remouendo intemperiem, & malam dispositionem à qualibet parte, naturalemq; tonum restituendo illam roborant, quæ pariter intus & extra administrari solent: intus quidem, ut decocta, infusiones, Syrupi, conseruæ, electuaria, succi, pulueres, lambitiua, trochisci & huiusmodi: Extra uerò erunt inunctiones, lenimenta, emplastra, cerata, fomenta, stillicidia, sessiones & similia, de quorum formis suo loco sermo erit: deniq; ad fontem Dieteticum spectabit uniuersa uictus ratio, quæ consistit in recta administratione sex rerum non naturalium, aeris uidelicet, cibi, potus & reliquorum,

*Roborantia.*

*Materia  
dietetica.*

in-



intelligendo per aerem, regionem, anni tempus, & cœli constitutionem, per cibum & rectam eius administratio-  
nem intelligo materiam quamcunq; auxilii alimentalis ple-  
nioris, tenuioris & mediocris, & secundum quodlibet ge-  
nus magni uel parui nutrimenti, boni uel mali succi, faci-  
lis uel difficilis coctionis, temperati uel intemperati, cras-  
si & tenuis, crudi & cocti: intelligo quinetiam illius sub-  
stantiam, quantitatem continuam & discretam, qualita-  
tem primam, & secundam, temporis oportunitatem, iucū-  
ditatem, præparationem & modum exhibendi; per potum  
intelligo uinum & aquam, uinum inquam generosum,  
pauciferum & mediocre; per aquam intelligo tūm sim-  
plicem, tūm alteratam, cum alimentis uel medicamen-  
tis: per somnum intelligo breuem, longum, profundum,  
moderatum, & secundum quodlibet genus turbulentum  
uel sincerum; per uigilias moderatas & immoderatas in-  
telligo: per inanitionem, euacuationem materiæ excre-  
mentitiæ intelligo copiosæ, paucæ, moderatæ, sponte na-  
turæ uel arte factæ: per repletionem intelligo cibi ac po-  
tus sumptionem secundum omnes iam propositas differen-  
tias, per motum intelligo corporis exercitium modera-  
tum & immoderatum cum uiolentia & citra uiolentiam,  
tempestiuè & intempestiuè factum, deambulando inquam  
currendo, saltando, ludendo, nauigando, equitando, uel  
alio quouis modo corpus exercendo: per quietem intel-  
ligo priuationem dictorum motuum, per sessionem aut  
decubitum factam, siue tempestiuè siue intempestiuè,  
longiori, breuiori aut moderatè fiat: per animi acciden-  
tia intelligo, eas passionēs, quæ possunt corpus conser-  
uare, alterare & immutare modò ad bonum modò ad  
malum, siue spiritus moueant à centro ad circumferen-  
tiam, uel è contra à circumferentia ad centrum.

De

De Morbis Muliebribus. 20

De materiis Chirurgicis & recta earum  
administratione. CAP. XXXI.

Quid agen-  
dum.

Lib. de sang.  
mis. per ue-  
ne loc.

9. Meth. 5.  
A copia san-  
guinis in-  
tus cohibi-  
ta.

A sanguine  
ut moue-  
tur.

5. Aph. 32.

5. Aph. 33.

**I**N suppressione igitur menſtruorum interdum conue-  
nit ſanguinis miſſio interdum non: diſtinguemus autē  
ſi ad propoſitos ſcopos & indicationes ſemper reſpexeri-  
mus, quandoquidem ubi aderit præſentia principaliter  
indicantis, nempe ſanguinis plenitudo putredo & motus  
& abſentia prohibentis, præſtabit ſang: mittere dum mo-  
dò vires & ætas conſentiant: dum igitur ſanguis redun-  
dat, ætaſq; florens fuerit, & vires robuſtæ, hic ſanguis  
uel intus detinebitur uel per alias partes effluet, per nares  
uidelicet, hæmorrhoidas, & ſimiles partes: in utraq; re-  
dundantia conueniet miſſio ſanguinis, ut ex parte qua in-  
tra corpus detinetur, duplici de cauſa competere uideat-  
ur. Primò quia redundat: Secundò quia non euacua-  
tur, ut euacuari deberet: meritò autem ſanguinis redun-  
dantis, ſed qui per alias partes non decentes euacuatur,  
conducit pariter ſanguinis miſſio, tùm quia redundat,  
tùm etiam quia per loca conuenientia non euacuatur, de  
qua euacuatione Hipp: etiam loquebatur, dicens, mulie-  
ri uomenti ſanguinem menſtruis erumpentibus ſolutio  
fit, quòd ſi menſtrua prouocari nequeant, non propte-  
rea ſupprimenda erit prior euacuatio, non ſolum ſi per  
uomitum fiat, ſed magis per alias partes, ut per uenas na-  
rium, de qua euacuatione idem Hipp: locutus fuit, dicēs  
mulieri cui menſtrua deficiunt, ſanguinem è naribus  
fluere bonum eſt. Eadem ſit ratio, ſi euacuatio fiat per  
uomitum, per ſceſſum, ſudorem, uel alias partes: ab eo-  
dem ſanguine corrupto ſcopus etiam oritur mittendi  
ſanguinis ad quem gal. reſpiciens, dicebat in omnibus  
feb. putridis bonum eſſe ſanguinem euacuare. ubi autem  
mentes non fluunt, quia ſanguis deficiat, deſit autem uel  
quia



quia per alias uias euacuatur, uel quia non generetur, si  
cut contingit in hectica febre, uel nimia inedia, tunc nul  
la sanguinis misio molienda erit, quia desideratur  
principale indicans. nisi reuulsionis gratia id fiat,  
Dum autem licebit mittere sanguinem, cum mitti possit  
materia magni aut parui auxilii, quenam eligenda sit, di  
stinguemus, respicientes ad genus plenitudinis: nam si  
magna fuerit plenitudo ut inde etiam magna suppressio  
fiat, magnum etiam auxilium indicabitur, cuius materia  
erit uenę sectio. Si autem plenitudo parua fuerit, ut ipsius  
ratione, remissior suppressio habeatur, indicabitur san  
guinis misio, sed debiliori auxilio facta, cuius materia  
erunt hirudines, cucurbitulę & huiusmodi. Cæterum  
cum utraq; auxilii materia sanguinem euacuare possimus,  
in magna & in parua copia unica uel pluribus uicibus, di  
stinguemus quantitatem continuam, respicientes ad maio  
rem & minorem copiam sanguinis redundantis, ut meri  
tò sanguinis copiosè peccantis eius uacuatio largior fa  
cienda sit, præsertim si uires consenserint: meritò autem  
minoris copię, partior etiam haberi debeat; cognosce  
mus autem maiorem & minorem sanguinis excessum,  
respicientes ad habitum corporis, temperaturam, colo  
rem, uenarum latitudinem & ad reliqua iam enarrata ut  
mirum esse non debeat, si Galenus in muliere cui sup  
pressa erant menstrua per plures menses, etiam si corpore  
gracilior reddita esset, uenis tamen ualdè turgentibus, co  
piosum sanguinem & pluribus uicibus detraxerit: quam  
uis enim ratione copię, meritò cuius imminet aliquod  
malum citò & largè euacuandum sit, consequenter se  
mel sanguis educendus, ubi tamen uires non ita sunt fu  
turę constantes, ut copiosam euacuationem semel factā,  
citra iacturam non sustineant, tutius est partiri, & euacua  
tionem repetere; quod eò magis fieri debet ubi sanguis  
minus copiosè redundauerit, nec sufficit pro recta admi  
ni.

*Genus au  
xilij.*

*Quantum  
agendum.*

*6 Epidem.*

*6. Epid. sec.*

*3. Com.  
29.*

*Vbi agen  
dum.*



## De Morbis Muliebribus.

*Plenitudo*  
2.

*Conciliatio*  
*Galenī cū*  
*Aetio.*

*Ordo seruā*  
*dus in mit*  
*tendo san*  
*guine.*

nistratione secandæ uenæ nouisse sanguinem redundare, sed cognoscere etiā oportet locū cōueniētē p quē sāguis educi debet. Hunc autem distinguemus, respicientes ad eundem sanguinem, sed meritō subsistentiē consideratum, quapropter sanguis uel redundabit in toto corpore, uel in parte determinata: & si in toto corpore, uel absolute & æqualiter, uel secundum quid, & ratione alicuius partis determinatæ, si in muliere curanda sanguis ratione totius & simpliciter redundauerit, ut contingit in habitu plethorico, & præterea etiam adsit plenitudo partis, nempe ipsius uteri, ex duplici hac plenitudine & sanguinis subsistentia, orietur indicatio mittendi sanguinem per duo loca ut utriq; plenitudini occurramus, ut meritō plenitudinis communis, uena etiam communis cubiti pertundenda sit: meritō plenitudinis determinatæ, & ex parte uteri, aperienda sit uena malleoli, & ideo Galen. sibi ipsi semper constas x. de comp. medicam. in dolore coxendico citra plenitudinem totius iubet secandam esse uenam inferiorem tantum. At si in toto plenitudo fuerit præmittit sec. uene superioris. Vt hinc facili negotio Galenus & Aetius conciliari possint: Galenus enim libro de curandi ratione per uenę sectionem in suppressis menstruis iubere uidetur, secandam esse uenam malleoli, nequaquam autem ipsius cubiti, illa enim suppressam purgationem prouocat: hæc autem reuellendo magis suppressit, contra Aetius utramq; secari uoluit. Diuersitatis ratio est, quia Gal: loco citato ad plenitudinem determinatam tantum respexit, Aetius uerō ad utramq;. Cum autem expedit ex duplici loco sanguinem educere, cognoscendus adhuc superest ordo qui seruari debet, an scilicet prius uena communis aperienda sit, ad totius plenitudinem primo respicientes, deinde uena malleoli respicientes ad plenitudinem partis, uel potius uice uersa, in qua re procul ab omni errore procedemus, si ocu-



si oculos direxerimus ad generationem & ordinem dictarum plenitudinum: quoniam, quæ prior fuerit, & ueluti alterius causa, illi etiam primum erit occurrendum, qua ratione utriq; plenitudini satisfaciemus, & mulierem iuauimus, quo ordine neglecto & præposterato, maius erit nocumentum quàm iuuamentum: quapropter in hac duplici proposita plenitudine à sectione uenæ cubiti omnino incipiendum erit, per hanc enim totius plenitudinem minuimus, simulq; determinatè opem ferimus, siquidem ex sectione uenæ cubiti prius facta, non solum communem plenitudinem tollimus, sed sanguinem quoq; reuelli mus, qui cum impetu in uterum fluere; si autem uenæ inferioris sectio præmitteretur: maior fieret sanguinis præcipitatione in uterum inanitus, qua ita confestim facta, maior obstructio in eo fieret; consequenter menstrua adhuc magis supprimerentur: at si à uena cubiti totius plenitudinem respiciente auspicemur, maiori cum utilitate uena inferior secari deinde poterit, qua ratione utraq; plenitudo communis & determinata è medio tolletur; ad quas plenitudines Actius quoq; respiciens, iurè cubiti uenam prius aperiri iussit deinde malleoli. At si utramq; plenitudinem habuerimus, eo tamen ordine factas ut plenitudo totius dependeat à plenitudine partis, sicut contingit in muliere non plethorica, in qua sanguis in toto simpliciter & absolutè non redundat, sed gratia potius partialis plenitudinis, nempe ratione uteri, tunc secanda tantum erit uena inferior, quia per talem uenæ sectionem simul cum parte totum etiam inanitus. At si cubiti uenam prius secuerimus, tantum abest, ut ratione huius menses prouocentur, ut magis potius supprimantur. Ex proposita resolutione respiciente locum secandæ uenæ, quilibet facile poterit in aliis etiam affectibus partium infernarum, renum inquam, uesicæ & testium oportuno locum secandæ uenæ inuenire; quod ubiq; Gal: obserua-

L uic

13. Meth.  
lib. curat:  
per uenæ  
sect. 11.  
12. & 18.

10. de com-  
pos. Med. 2

## De Morbis Muliebribus

*A quo late-  
re sit ue-  
na secan-  
da.*

*Tempus se-  
cunda ue-  
ne.*

uit, ut loquens de dolore coxendico, iusserit inferiores uenas secandas esse, monens tamen an præter hunc priuatum dolorē totius plenitudo adsit, quæ si fuerit, illi prius respiciendum erit cubiti uenam primo secando, sine qua dolor, & plenitudo partis benè remoueri non potest: at si nulla adsit in toto plenitudo, satis erit ad determinatā plenitudinem respicere, inferiorem tantum uenam aperiendo: quare in uitis partium infernarum, in quibus sanguinis missio cōueniet modò secanda erit uena inferior. modò etiam superior, prout uel unica uel duplex plenitudo fuerit. Vbi præterea uenæ secandæ scopus oritur, siue in parte superiori aut inferiori uel utrisque fiat, cum huiusmodi uenæ secundum utriusq; situs differentias reperiantur in parte etiam dextra, & sinistra, tum penes brachia & partes superiores, tum penes crura & partes inferiores, idè cognoscendus etiam hic locus occurrit, an uidelicet uena aperienda sit in parte dextra uel sinistra, quod nobis indicabitur ab eadem sanguinis subsistētia in uno magis quàm in altero latere: hanc autem cognoscemus ex Symptomatibus, quæ magis infestabunt partem affectam quàm alteram, ut si in suppressione uteri mulier magis conqueratur de dolore, grauitate & similibus, secundum partem dextram quàm sinistram, seruata rectitudine cum loco affecto uena eiusdem affecti lateris aperienda erit. Ad rectam præterea administrationē sectionis uenæ, præter explicata accedit etiam tempus idoneum quo operatio ista molienda est, quod pariter nobis indicabitur ab eadem sanguinis plenitudine præsentis, ratione inquam præsentis symptomatis, at dum menses sunt suppressi, semper adest præsentia plenitudinis, à qua indicatur, ut etiam in præsentia per missionem sanguinis euacuetur: uerum sufficere non uidetur, ut ita generatim sciamus, quod in suppressione mēstruorum sanguinem quocunq; tempore euacuare liceat, sed oportet

tcc



tet etiam, ut distinctè magis cognoscamus tempus oportunius eligere. Quidam in iunioribus mulieribus sanguinem mittunt in prima uel secunda quadra lunæ, in ætate uerò prouectioribus tertiam & quartam quadram magis eligunt. Alii uidentur in omnibus mulieribus sanguinem mittere, luna potius decreſcente, nec præter rationem, quia per id tempus ob diminutum calorem humores euacuandi magis redundant. Gal. tamen statuit opportunius tempus fore per tres uel quatuor dies ante tempus consuetæ euacuationis, nec immeritò, quia eo potissimum tempore natura incipit mouere, ut consuetam euacuationem molatur, cuius conatus cum inanes sint, ideò eo potissimum tempore opem inquit, ut medicus id tempus in secunda uena eligere magis debeat, tunc enim naturam à tali pondere subleuamus ut robustiori reddita, facilius possit cōsuetam euacuationem repetere. Tandē in modo ēt secāde uenæ ratio aliqua habēda erit, pro ut continentis constitutio & contenti substantia significabit, quare merito constitutionis uenæ, indicabitur illius sectio non per longitud. aut latitud. sed obliq; potius faciendam esse. atq; eandem non totam sed secundum supernam superficiem aperiendam esse me

rito autem contenti cum sit sanguis, & hic

esse possit crassior & tenuior merito

tenuioris sectio angustior merito

crassioris paulo latior facien

da erit. Et hec de uene

sec. rectaq; illius

administratio

ne dicta

suffi

ciūt.

Lib. cur.  
peruenæ  
sect. Cap.  
18.

Modus sec-  
cande uene

L 2 DE

De Morbis Muliebribus

De Cucurbitulis. CAP. XXXII.

Quid agen-  
dum.

Cucurb. scar.  
cuius auxi-  
lii sint ma-  
teria.

Gal. lib. cu-  
ra. per sãg.  
mis.

Quantum  
agendum.

Vbi agendũ.

**V**BI autem non aderit magna repletio sanguinis, sicut contingit in muliere quæ plethorica non sit, uel sanguis aliqua ex parte euacuetur per uterum uel alia loca, ut ratione relicta plenitudinis adhuc expediat sanguinem mittere, tunc debiliori auxilio utendum erit, cuius materia erunt cucurbitulæ scarificatæ, quæ potissimum admouendæ etiam erunt, si uires non ita fuerint robustæ & præterea etiam si redundans sanguis tenuis fuerit, ut per cucurbitulas faciliè egredi possit, quod cognoscemus, respicientes ad temperaturam cholicam, corporis habitum gracilem, & pregressam uictus rationem: mittendus autem erit in minori copia, quia parua etiam est plenitudo, & præsertim hoc seruari debet, si uires non ita sint robustæ, ut maiorem euacuationem non sustineant, cum præterea supponamus plenitudinem magnam non esse, consequenter ratione totius, sed potius partis, & merito uteri, idèò infernis potius quàm supernis partibus applicandæ erunt, cruribus uidelicet & sub poplite, Hip. etiam teste libro de morbis muliebribus, & ubi expediet bis sanguinem mittere, non solum dictis partibus erunt applicandæ, uerum etiam coxibus pubi & inguinibus, eo tamen ordine, ut priori loco partibus extremis affigantur, reuulsionis gratia, deinde uicinioribus partibus ab illis deriuando, nec propterea negandum, quin etiam spatulis & dorso admoueri non possint, sed hoc fiet, ubi insignis erit plenitudo, & mulier non admittit uenæ sectionem, tunc enim eadem erit ratio seruanda, quemadmodum de uenæ sectione dictum fuit: cui autem parti, dextræ inquam uel sinistrae, & quo tempore eadem cucurbitulæ sint admouendæ, non est ut plura dicamus, cum illud ipsum seruari debeat, quod



quod de venæ sectione dictum fuit. Applicandi autem ratio ea seruetur, ratione cuius sang. euacuandus cum facilitate & iuamēto adducatur, quod fiet, si partes ille spōgia aqua tepida aut poscha inbuta & expressa inprimis p̄tricetur, p̄sertim si sanguis crassior & ābiens frigidius, fuerit, ita. n. sanguis fundetur, & mobilior reddetur, meatusq; eutanei nimis densati laxabuntur & aperientur ut sanguinem procul ab omni impedimento suscipientes, euacuatio melior sequatur.

*Quando agē  
dum.*

*De Cucurbitulis non scarificatis.*  
*CAP. XXXIII.*

**I**N eundem usum ueniunt etiam cucurbitulæ non scarificatæ, sed non tanquam materia auxilii sanguinem sensibilibiter euacuantis, sed insensibilibiter, & potius ut materia auxilii sanguinem attrahentis ad uterum, si contingat ut ad alia loca raptum habuerit: tales autem cucurbitulæ cum & ratione doloris & caloris uim attrahendi habeant, idēdō facillē possunt sanguinem auertere, dum ad alia loca motum habuerit, & illum cum impetu ad uenas uteri retrahere; quæ si occlusæ fuerint ex tali impetu, facillē aperiri poterunt, hoc autem ut p̄stent, admoueri, inprimis debent cruribus, mox uerō coxis utrisq; , ut primō euacuatio reuellendo fiat, deinde deriuando, & p̄terea ratione qua sunt materia auxilij attrahentis, melior fiat attractio, si prius admoueātur in lōginquis partibus, deinde in proximis: eo autem modo erunt applicandę, ut cum magna flamma administrentur, hac enim ratione efficacius attrahent, & sanguinem qui superiora petit, cōtrario motu reuellent: quibus etiam eo tempore uti debemus, quo dicta purgatio non fit, dum modō quippiam non

*Gal. 13. Me  
th. 19.*

*Cucurbi quo  
modo attra  
hant.*

*Locus.*

*Modus.*

*Tempus.*

## De Morbis Muliebribus. 29

### *Prohibentia*

non prohibeat, quod autem prohibere potest uel totius est plenitudo, uel caco-chymia, utrorumq; ratione à dictis cucurbitulis desistendum quia maior obstructio contineret, earum enim causa ad uteri uasa copiosior materia attraheretur, quod ne contingat, remouenda erunt talia prohibentia, quod fiet, si merito plethorix, sanguis prius mittatur, & meritò caco-chimix peccantes humores purgauerimus, quibus peractis, tutius & cum utilitate ad dictas cucurbitulas peruenire poterimus: præterea eandem cucurbitulæ non solum post totius euacuationem & purgationem admouendæ erunt, sed eo potissimum tempore, in quo, naturalis & consuetæ uteri purgatio fieri deberet.

## De Ligaturis & frictionibus. CAP. XXXIII.

### *Quid agendum.*

### *Locus.*

### *Modus.*

PRÆTER Cucurbitulas non erunt prætermittendæ ligaturæ & frictiones, cum pariter uim habeant sanguinem attrahendi ad uterum, & ligaturæ id præstant ratione doloris, qui attrahendi uim habet, & propterea dolorosæ esse debent, frictiones uerò idem præstent, uimq; habent attrahendi, non solum ratione doloris uerum etiam caloris, idè mollioribus prætermisissis, asperiores faciendæ erunt, Admouentur autem ligaturæ non supernis partibus quia tunc maior suppressio fieret, sed infernis potius, & infra genua nempe pedibus & digitis primùm, deinde supra nempe in coxis, hoc enim ordine primò agent reuellendo, deinde deriuando, & idem de frictionibus dicendum est, quæ pariter remotioribus partibus sunt prius administrandæ, deinde uicinioribus. Modus autem talis esse debet, ut earum causa fiat attractio, idè ligatu



ra dolorosa ut sint oportet, quemadmodum & frictio-  
nes quæ cum dolore & cum calore fieri debent. *Tempus.*  
autem idoneum administrandi erit post totius purga-  
tionem, & eo potissimum tempore, quo menses flue-  
re solent.

*De Hirudinibus. CAP. XXXV.*

**H**irudines sunt materia auxiliij euacuantis sanguinem  
sensibiliter tum à toto, tum à parte, ut ab eisdem *Quid agen-*  
indicentur à quibus etiam uene sectio & cucurb. indicaba-  
tur circa quarum rectam administrationem nihil de quã  
titate dicendum occurrit, cum eadem pariter sint seruan-  
da, quæ de uenæ sectione & cucurbitulis dicta fuere. *Quatitas*  
Circum locum tamen aliqua dicenda uidentur, imprimis, quod *Locus.*  
cubito applicari possint, euacuandi sanguinis gratia à to-  
to, si plethoricum fuerit, satis compertum haberi potest,  
quod etiã in infernis partibus applicentur, cruribus inquam  
& coxis, reuulsionis & deriuationis gratia, nemo dubitare *Dubitatio.*  
debet; an uerò in locis consuetis, nempe in uenis hæmor-  
rhoidalibus administrare conueniat in hoc affectu, ali-  
qua uidetur esse controuersia. Ex altera enim parte opti-  
mum uidetur in suppressione menstruum has uenas a-  
perire, fuit enim Hip: sententia, quod menstruis deficien-  
tibus, ex naribus fluens sanguis, bonum est. Et Galenus *5. Aph. 33.*  
in commento dicit, eum Aphorismum intelligi etiam pos-  
se de euacuatione quæ fit per sedem, ita ut hæc possit æ-  
quæ iuuare in suppressione menstruum, sicut fluxio san-  
guinis per nares; ut idem prorsus dicendum uideatur, de  
euacuatione facta per hæmorrhoidas, nec obstat, quod  
Hip: loquatur de euacuatione per nares: ea enim semper  
fuit Hip: consuetudo, ut ad unius exemplum respicien-  
tes, uniuersalem ueritatem colligamus in omnibus eiusdẽ  
generis;

## De Morbis Muliebribus.

*Lib. curati-  
uo p̄ sang:  
miss:*

*Lib: ad Post  
humū c. 8.*

*Resolutio  
quæsit.*

generis quare non excludit euacuationes per uaria loca .  
Accedit, quòd si ceteras euacuationes excludere uoluisset,  
dixisset, in suppressis menstruis solam euacuationem san-  
guinis per nares iuuare, qua autoritate ita nudè intellecta,  
si quis in praxi innitatur , longè lateq; aberrare posset ,  
quandoquidem ex altera parte uidetur talem euacuatio-  
nem per hæmorrhoidas minimè conuenire, quoniam ex  
Gal: habetur, quòd existente aliquo uicio in hæmorrhoi-  
dibus, nempe immoderato fluxu, expedit pro illius suppres-  
sione menstrua prouocare, quia deriuando sanguinem ab  
utero , illum moderat, & sistit . A pari dicendum uice  
uersa, quòd eodem utero plus æquo fluente , optimum  
erit hæmorrhoidas aperire, quarum euacuatio, uteri im-  
moderatum fluxum deriuando compescet ; quare utero  
non fluente , consequenter in suppressione eius nequa-  
quam præstabit hæmorrhoidales venas aperire, quia ratio  
ne talis euacuationis, uterus adhuc magis supprimeretur,  
quod Gal: etiam obseruasse uisus est in muliere patien-  
te profluuium muliebri , Ad quod sistendum utebatur  
materia auxilii euacuantis per sedem deriuando . Ergò  
ubi suppressa erit uteri euacuatio, hæmorrhoidas aperire  
minimè conuenire uidebitur , quia euacuantibus ab utero  
deriuando, magis ac magis cōsuetam uteri euacuationem  
impediemus, Cuius dubitationis resolutio , cum in praxi  
& ad finem plurimum conducat , negligenda ullo modo  
erit. Sed distinguendum de duplici suppressione, quarum  
altera est in habitu & confirmata, ut nulla sit sanationis  
spes , Altera est in habitudine, quæ salutis spem pollice-  
tur, ut per consueta loca uacuatio denuò reuerti possit;  
si sermo fuerit de suppressione in habitudine, ac proinde  
de illa, quæ curam admittit, ab illis euacuationibus ca-  
uendum omninò erit; quæ reuellendo aut deriuando eua-  
cuant, quia ab istis magis ac magis contumax illa reddi-  
tur, & tunc nec per uenam cubiti, nec per hæmorrhoides  
sanguinis



sanguinis euacuationem moliri oportet & de tali suppressione Gal: loquebatur in muliere illa profluuium patiente. Si autem sermo fuerit de illa suppressione, quæ est in habitu, & confirmata, cum ullis remediis cedere amplius posse uideatur, debet talis sanguis ita præter naturam intus cohibitus, aliqua alia ratione uacuari, cumq; per uenas uteri, ut per loca consueta educi nequeat, consilium erit, per alia loca eius euacuationem tentare, siue deriuando facta fuerit, ut si uenæ hæmorrhoidales aperiantur, aut reuellendo, ut si per alia loca longinqua retrahatur, nempe ad nares, uel per uenam cubiti, & hoc modo Hipp: loquebatur, quando dicebat, quod menstruis deficientibus, sanguis è naribus fluens, bonum, non enim per talem euacuationem scopus erat mensens prouocare, cum illius causa magis impedirentur, sed potius quia ratione talis euacuationis, sanguis in corpore uiolenter retentus, educebatur, idq; cum patientis maiori iuuamento, quàm si intus relinquatur. Ad quod respiciens, dixit, bonum. A pari in tali suppressione in qua nulla est salutis spes, si sanguis per uenas hæmorrhoidales euacuat<sup>us</sup> fuerit, ob eandem causam bonum, & laudabile erit; præsertim autem conuenit dicta euacuatio, per nares inquam, uel hæmorrhoides, si per dictas partes natura consueuerit uacuationem moliri: quod si per dicta loca ulla unquam euacuatio obseruata fuerit, non solum per dictas partes, uerum etiam per sectionem uenæ cubiti uel malleoli facienda erit euacuatio.

*De Cauteriis. CAP. XXXVI.*

**C**Auteria sunt materia auxilii sensibiliter uacuantis, *Quid agendum.*  
 indicati ab humore, qui sensim & assiduò generatur, qui consuetum exitum non habens, intra corpus &  
 M præter



## De Morbis Muliebribus.

*Vssus caute  
suspectus*

*Causa 1. 2.*

*Tertia.*

præter naturam detinetur, cuius etiam præsentia corpus alteratur, symptomatumq; magnitudo & numerus augetur, cui medici solent, aliis non conferentibus, cauteriis occurrere, per quæ materia ista, ut sensim generatur, ita proprium emissarium habeat per quod extra corpus effluat, quorum usus adeò frequens hoc tempore habetur, ut in morbis omnibus materialibus & contumacibus, ad hæc ut ad sacram anchoram confugere soleant. quantum tamen beneficii, inde colligant, uideant ipsi, hoc unum scio, multos non solum nihil boni consecutos fuisse, sed illa etiam suppressere coactos fuisse.

Accedit hoc remedii genus non esse ita tutum, cum sæpe experientia comprobatum fuerit, in aliquibus in gangrænas degenerasse, ut ex adhibito potius remedio, quam ex morbo mortui fuerint, huius diuersitatis causam multiplicem esse existimo, in primis quia patientes propriæ salutis ualdè cupidi, latentes & longas naturæ digestionis diutius sustinere nequeunt, Secundò quia medicus tanquam naturæ minister, in eandem respicere negligit, ad cuius tamen exemplar, procul ab omni errore operari posset, & quò illa uergit, per eadem etiam ducere, si per loca conuenientia id fecerit; At per hæc emissaria intempestiuè ad mota naturam sæpè cogimur, ut non solum crudiores materiam euacuet, sed per eas etiã partes, ad quas nec potest, nec uult euacuare, quod cum contingit, non solum naturam rectè operaturam impedimus & ante digestionis tempora ad euacuandum prouocamus uerum etiam ad loca non conuenientia sed opposita potius sæpe & cum uiolentia illam auocamus.

Quod dum contingit ex dictis cauteriis maius nocumentum quàm iuuamentum consequimur; præterea sæpe, etiam accidit, quod medicus, ut artifex coniecturalis, sedem generationis materiæ euacuandæ ignorat, qua ignota, necessarium est quoq; loci etiam opportunitatem igno-



ignorare, per quem materia ista detenta educenda sit: nam si deriuandæ materiæ gratia, cauterium facere uoluerimus, locum propinquum sedi affectæ eligere oportet, quemadmodum si reuulsionis gratia id ipsum fiat, locum remotiorem, rectitudinem tamen seruantem cum sede affecta inuenire opus erit. At nondum optimè perspecto loco, ubi materia generatur, necessarium quoq; est aliarum sedium propinquitatem & remotiorem, rectitudinem & obliquitatem ignorare, quod est in causa, ut medici optato fine frustrentur, & miseri patientes, duplicatis molestias toto uitæ suæ curriculo patiantur. sed quicquid sit, de hac auxili materia plura hic non dicam, quia alibi ex proposito diffusè magis locutus fui, sed supponendo, in suppressis menstruis cauteria locum habere, ita indicante materia, quæ generatur & intus cohibetur, statuendum erit, post reliqua præsidia hæc quoq; tenenda esse, atq; hæc modo plura modò pauciora facienda erunt, pro maiori & minori copia materiæ, quæ assiduò generatur, & tam diu detinenda erunt, quo ad præsentia genitæ materiæ adfuerit, & generandæ suspicio habebitur. Sunt quin etiam in eo loco affigenda ubi materia subsistit et quiescit, nisi aliunde fluxerit. Quapropter meritò uteri supra genua affigi poterunt, quia deriuando euacuabunt. Ratione autem totius uolunt applicanda esse alteri uel utriq; cruribus, quemadmodum ratione partis, si Epar aut Venter fuerit, in brachiis utriq; uel altero fieri decernunt. Vbicunq; autem facta fuerint, cum fieri possint igne actuali & potenciali, magis probatur, ut ferro uel auro ignito fiant, quàm causticis medicamentis: ignis enim actualis & sine dolore & quàm citissimè & tuto ager, quæ aliis materiis nequaquam præstamus, ideo si curatio, cito, tuto & iucunde fieri debet, prætermissis cauteriis potentialibus, actualibus utendum erit.

*Plura & pauciora cauteria.*

*Quanto tempore cautoria detinenda sint.*

*Locus ubi sunt affigenda.*

*Modus faciendi cautoria.*

M 2 DE



De Morbis Muliebribus.

De Pharmacia. CAP. XXVII.

Pharma. 2.

Ordo.

Quid agen-  
dum.

Materia au-  
xilii alte-  
rantis sub-  
stantifice.

Secundum genus medicinalium materierum ex fonte  
Spharmacentio desumebatur, de quo in præsentia insti-  
tutum est agere. Pharmacia igitur est in duplici differen-  
tia, alia respicit corpus uniuersum, alia partem determi-  
natam, & quia in praxi totius prouidentia semper præ-  
mitti debet, & præsertim ubi totum habet rationem cau-  
sæ efficientis fouentisq; partem affectam, & causæ sine  
qua non, ideo de istis materiis sermo prius instituendus  
erit. Quare in suppressione menstruorum, priusquam ad  
localia descendamus, de uniuerso corpore consideratio  
habenda est, quod si plethoricum fuerit, sanguis etiam  
prius mittendus est, ut antea dictum fuit. Si autem ple-  
toricum non sit, considerare oportebit an mensium de-  
fectus sit, quia materia non generetur, an potius quia  
genita præter naturam cohibeatur, si non adsit præsentia  
alicuius materiæ in toto corpore uel in parte, nulla neces-  
sitas purgandi corpus habebitur, sed solum alterandi, ut  
si corpus fuerit plus æquo exiccatum propter nimiam in-  
grediam, insignem euacuationem, exercitium immodera-  
tum, & ob alicuius febris diurnitatem, huic occurren-  
dum erit uictus ratione substantifice humectante & re-  
staurante deperditum humidum, cuius auxilii materia ci-  
bus erit, & potus, laudabilis chymi, & facilis coctionis,  
cuiusmodi sunt oua recentia & sorbilia, carnes caponum,  
uituli, hædi, phasianorum, perdicum, suilla caro recens  
& iunior, ptisana, amyllum lacte paratum, lac humanum  
ex propriis mamillis emunctum, iuscula dictarum car-  
nium, & quæ consummata uocantur, vinum etiam boni  
& iucundi odoris; dum modò aliquid non prohibeat, nec  
solum tale corpus secundum internas partes substantifi-  
cè humectari debet, uerum etiam extra: ideo probantur  
bal-



balnea tepida parata tùm ex aqua dulci simplici, tùm etiã alterara cum maluis, lactucis, foliis uiolarum, hordeo, seminibus melonum & similibus. His uerò præstantiora erunt, quæ ex iure carniū parantur, & omnium præstantissima, quæ ex lacte fiunt, hæc enim non nudis tantum qualitatibus agunt, sed substantificè etiam humectabunt. Post quorum usum præstabit etiam Oleo amygdalino dulci corpus uniuersum inungere. Vbi autem adsuerit præsentia materiæ, ratione cuius consuetus fluxus impediatur, studium nostrum primò erit, talem materiam remouere, & purgante medicamento educere; quod statim fieri potest, dum modò aliquid non prohibeat. Quod autem prohibere potest, est crassities & lentor materiæ, quæ purganti medicamento non cedit, nisi prius attenuetur, detergatur, & ad facilem motionem disponatur, idè præparantia medicamenta, quæ id præstent erunt primo administranda, ad quæ pariter, quamprimum deueniendum, nisi quippiam pariter prohibuerit. Quod autem prohibere potest, est præsentia superfluitatum primæ coctionis in ventriculo & intestinis existentium, quæ prius sunt remouendæ leniente aliquo medicamento. Tale autem uel per supernum os educet, cuiusmodi est uomitorium uel per infernum & per secesum, cuiusmodi sunt clysteria & lenientia per os exhibita. Vomitoriis utemur, ubi aderit præsentia materiæ euacuandæ in ventriculo tantum, præsertim si mobilis illa fuerit, & non in tunicis impacta: ubi autem in infernis tantum intestinis extiterit, solis clysteriis euacuari poterit. Si deniq; omnia intestinorum spacia occupauerit, leniens medicamentum per os erit præbendum. Vbi igitur uomitoriis uti expediet hæc esse possunt in triplici differentia, ualida, mitiora & mediocria, cum hic sermo habeatur de uomitorio, ratione qua leniens est, abstinendum erit a ualentiori, quoniã hoc cum à longinquis partibus uim attrahendi habeat

*Purgans*

*Preparans*

*Leniens*

*Vomitóriū  
in triplici  
differt.*

in-



## De Morbis Muliebribus

indicatur etiam à materia tùm longius posita , tùm etiam concocta , quare utendum erit leuiori uel saltem mediocri , cuius usum si crassities & lentor materię impedierit , optimum erit ante exhibitionem uomitarii talem materiam cum oxymellite , melle rosae uel Syr: acetoso simp: pręparare, & mobilem reddere , quę pręparantia ad onc. i. singulo mane & absq; diluto propinari poterunt , quia locus ubi materia pręparanda residet ita est propinquus, ut uehiculo aliquo non egeat, imò scopus noster esse debet , ut tale pręparens diutius in uentriculo immoretur, ut ratione longioris motę efficacius agat in dictam materiam, qua deinde pręparata, faciliori negotio educi poterit , consequenter leui uomitario cuius materia parari poterit , ex aqua hordei , uel iure uituli , aceto permixto, Si materia crassior fuerit : uel melle rosaceo si uiscida, uel Oximelite, si crassior & uiscidior simul fuerit, atq; hoc, modò simplici, modò composito, pro maiori crassitie & uisciditate dictę materię.

**Quantitas.** Quantitas autem aquę uel iuris sit ab onc. iiii. usq; ad viii. & x. aliorum uerò ab onc. 5. usq; ad ii. accipiendo uerbi gratia Aquę hordei Onc. viii. Oximel: simpl. Onc. xv. Misce pro uomitario. Tempus autem exhibendi conueniens erit ante cibum manẽ aut uesperis, nisi aliquid prohibeat. Quod autem prohibere potest uirtutis est imbecillitas, siue in pręsentia eiusmodi sit, siue immineat, ut etiam ex uomitario talis euadat : tunc enim cibus prius dandus erit, ratione cuius uentriculus roboretur, expultrixq; eius ad expellendum fortior euadat. Vt autem uomitus facilius prouocetur , debet uomitorium exhiberi non frigidum sed tepidum, ut ingratitudinis etiam ratione nauseam & uomitum magis excitet. Merito autem excrementorum in infimis tantum intestinis existentium leniens clyster admoueri debet, quod parari poterit ex foliis Maluarum , matrum uiolarum, Althę, betarum, Mercurialis,

**Primo ad glauc. pręparans.**

**Quantitas.**

**Modus.**

**Materia uomitorij.**

**Quando agendum.**

**Quomodo agendum.**

**De Clysteriis.**



curialis, fufurum & fimilibus, ex oleo communi maturo  
uel lini cum fuccharo & modico fale, iuxta hanc formam.  
℞. fol: maluar: matrum uiol: an. Mi. aque q. f. Mifce &  
fiat decoc: ad confumptionem tertiæ partis, ℞. dictæ de  
Gionis lib. i. Olei communis Onc. iiii. uel iiii. Succhari  
rubei tantundem, falis communis Scrop. i. Mifce pro  
Clyst: Debet autem hoc Clyfter adminiftrari ante cibum  
potius quàm post cibum, & præterea calidum potius,  
quàm frigidum, quia uirtus citius ac melius excitatur ut  
copiofius operetur: ex parte uerò excrementorum sub  
fiftentium in intestinis, infimis, mediis & fupremis, imò  
etiam in uentriculo, præftabit uti medicamento lenien  
te per fupernum os exhibitò, per feceffum tamen euacuân  
do dictas fupfluitates, cuius materia erit caffa, El: leni  
tium defebefce, Diaprunis folut: fimplex, Diacatholi  
cum, Hiera mel. rofat: folut: Syr: rof: folut: mel: uiolatum  
fol. syr. uiol. fol. Manna, & fimilia ex quibus aliqua con  
ueniunt, ubi bilis magis abundauerit, qualia funt syr. rof.  
uiolatus folutius & Manna. Aliqua ubi magis melanco  
lia, ut El. lenitium, Diacatholicum: Aliqua ubi pituita  
potius apparuerit, ut mel rofaceum, mel uiol: fol: & hie  
ra, quæ potiffimum locum habebit, ubi pituita in Ventri  
culo & intestinis hærebit, & ubi etiam uentriculus frigi  
dior fuerit. Si autem non magis hic quàm ille humor re  
dundare uideatur, caffa eligi poterit, uel Diaprunis fo  
lut: quæ indifferenter quofcunq; humores educere uiden  
tur. Dofis autem fyrupi rofati, mellis rofati & uiolati  
folut: erit ab Onc. ii. ufq; ad lex, pro copia materiæ, pro  
alui adftrictione ætate confuetudine & bonitate medica  
mentorum. Diffolui autem debent talia medicamenta  
cum decocto fibi proportionato, exhiberiq; poterunt per  
horas quatuor & quinq; ante cibum iuxta hanc formã  
℞. Syr. rof. fol. Onc. iiii. uel v. aque cichorei stillat: q. f. Mif.  
& fiat potio. Quæ autem in Bolo & potione propinari  
pof

*Materia cly  
fte. leni.*

*Quantitas.*

*Tempus &  
Modus ad  
miniftran  
di.*

*De Lenienti  
bus per os  
exhibitis.*

*Materia au  
xilii lenien  
tis per os.*

*Quantum a  
gendum.*

*Motus.*

*Tempus.*

*Forma pot.*



## De Morbis Muliebribus

possunt, sunt calcia & cætera electuaria proposita, quorū omnium Dosis erit à Drac. vi. vsq; ad 16. variatur autem pro eorum diuersitate, de quibus proximè meminimus. In bolo igitur leniens ita perscribi poterit ℞. floris cassiæ, El: lenitiui uel aliorum Drag. x. Anisorum ruditer contusorum Scrop. i. Misce. & cum succharo fiant boli, præbeanturq; per horam ante cibum, cassia enim medicamentum est familiare, & alimento ualde affine: ideo si diutius inedia sustineretur, facile posset in alimentum transmutari, quod non ita contingit de illis Electuariis, quæ ex aliis medicinalibus materiis constant, quæ poterunt per duas horas & ultra ante cibum præberi, citra suspicionem ut in alimentum uertantur. Si quis autem in potione potius uoluerit, cum proportionatis decoctis dissolui singula poterunt. Circa Dosis autem ipsius hieræ aliqua difficultas esse uidetur, cum in eare Gal. contraria dicere uideatur, nam 7. Meth. 1. habet Dosis hieræ triplicem esse, maximam, minimam, mediocrem. Maximam uult esse Onc. 5. minimam Drag. 1. s. mediocrem quæ interiacet inter utramq; 3. autem de cōpos. med. secundum locos cap. 2. inquit, quod maxima Dosis hieræ sunt Drag. ii. aliter habet 2. de cōpos. med. cap. 1. ubi inquit magnam dosin hieræ esse dra. 1. minimā esse Drag. 5. Quidam uolentes hæc loca conciliare, dixerunt Dosis uariari pro diuersitate loci, ubi pituita euacuanda reperitur, quæ esse potest in cauitate uentriculi, uel in illius tunicis impacta. Si fuerit impacta cum hæc maioris sit resistentiæ, eget etiam medicamento retinente maiorem uim illam euacuandi. Vis autem omnis materialis tunc augmentum suscipit, quando est in maiori quantitate & tunc conueniet præbere hieram non solum ad duas Drachmas, sed tres & quatuor, & hoc modo dicunt Gal. loqui 7. Meth. 1. si autem sermo sit de pituita in cauitate uentriculi residente, quia hæc est minoris resistentiæ, ideo

*Forma boli.*

*Dub. de dosi  
hyera.*

*Solutio alio  
rum.*



ideò faciliori negotio educetur, ut illius magna Dosis  
 drac.ii. excedere nequeat Quæ solutio ad mentem Gal.  
 non uidetur, cum 8. illo de compos. med: loquens de hac  
 dosi exemplificet de pituita imbibita: quare pro intelli-  
 gentia dictorum locorum, duo erunt notanda. Primum  
 respicit componentia hieram. Secundum scopum indicā  
 tem illius usum. Merito compositionis, ea duplex est, ex  
 eodem Gal: locis citatis, alia fit ex Drachmis centum  
 Aloes, alia ex octoginta. Si primo modo, summa Dosis  
 erunt drac.ii. si secundo modo erit onc. 5 & ita loquitur  
 Gal. 7. Meth. 11. alio uerò modo intelligi debet 8. de cō-  
 pos. Ex parte autem usus notandum, quòd ea uti dupli-  
 citer possumus, gratia scilicet euacuationis uel præpara-  
 tionis, si sermo fuerit de hiera gratia præparationis, tunc  
 illa utimur quæ recipit, Aloes Drachmas octoginta, hæc  
 enim propter Aromata quæ recipit, & minorem quanti-  
 tatem Aloes, maiorem uim habet attenuandi, & præpara-  
 di impactos humores, altera uerò potius euacuandi, hæc  
 enim cum recipiat aloes drac. centum, maiorem uim e-  
 uacuandi, quàm præparandi habebit, ideò si materia pi-  
 tuitosa impacta fuerit in uentriculo, consequenter sit  
 magnæ resistantiæ, indicabit prius esse præparandem, quā  
 euacuandam, pro cuius præparatione uti licebit attenu-  
 antibus & detergentibus calidis, quorum materia erit hie-  
 ra, quæ recipit drac. octoginta Aloes, quæ dum utimur  
 gratia præparationis, magna Dosis erit drachma una,  
 minima autem scrup. i. & ita intelligitur Gal. 2. de com-  
 pos. med. Quod sit uerum habet hoc loco cum hiera cō-  
 ponatur ex Drach. centum Aloes, & ex Drach. octogin-  
 ta, præstantius inquit est medicamentum quod accipit  
 Drach. 80. quàm 100, quòd dictum falsum esset si de  
 hiera loqueretur euacuationis gratia, quia euacuando ma-  
 gis præstat illa hiera quæ recipit drac. 100. quàm 80: at si  
 intelligamus de hiera præparationis gratia potius propi

N na-

*Improbatio*

*Verior sol.*

*Compositio  
Hye. 2.*

*Vsus Hye-  
ra. 2.*

*Confirmatio*

## De Morbis Muliebribus

*Modus dan  
di hyeran.*

*Ordo.*

nata, optimè locutus erit: quoniam hiera, ut præparet materiam impactam, diu in uertriculo detineri debet, diu autem detinetur si à scrup. usq; ad drach. accipiat, quam Dofin si transeamus citius descendet, quia à maiori quanto, maiorem euacuandi uim acquirit, quàm præparandi. Hæc de Dosi. Quo ad modum exhibendi hieram, non erit negligendus, præsertim cum hiera sit amarissima, consequenter ingratissimū medicamentum huic autem occurremus, si in bolo potius quàm in potione præbeamus, quemadmodum si permiscetur cum conserua de Betonica uel Saluia, & præsertim hic modus est seruandus, si præparationis gratia illa utamur, quia hac ratione diutius in uentriculo immoratur, ubi materia præparanda residet: quare accipere poterimus Hieræ drac. i. conseruæ de Beton. drac. ii. & bolum formare. Præparata autem materia uolentes illam cum hiera euacuare, & non solum cum hiera, sed addentes etiam mel ros: sol: non debemus hæc duo simul permiscere, & potionem facere, quia tanta esset illius amaritudo, ut à patiente sustineri ullo modo posset, idèò consultius erit hieram seorsum exhibere in bolo, statim deinde præbere poterimus mel. ros: ros: in potione. Obseruandus quin etiam erit in praxi ordo in exhibendis istis lenientibus, ratione cuius conuenientem materiæ euacuationem consequamur, secundò ut euacuando solum iuueamus & ullo modo noceamus, quod fiet, si patientem præseruemus ne circa uenas uteri maior obstructio contingat, idèò ante exhibitionem dicti lenientis, præstabit præmittere clyster, ratione cuius euacuentur superfluitates contentæ in illis intestinis, & simul etiam fiat aliqua deriuatio ab utero ad intestina, quæ euacuatio clysteri facta, nisi hieram per os exhibendam præcederet, facile contingere posset, ut ab assumpta hiera, portio aliqua illius materie ad uterum quoq; deducatur, quia hiera est ea

ma-



## *Liber Primus.* 50

materia auxilii, quæ omnium maximè solet per uterum euacuare, quare ex illius usu, maior obstructio fieri posset, quod nequaquam continget, si per clyster materia illa prius educta fuerit; gratia autem maioris euacuationis, præstabit si post medicamentum leniens sumptum, nos exhibeamus lib. 5. uel onc. x. ipsius mulsæ, quod Gal. et obseruasse uisus est. Hæc de lenientibus.

*Lib: ad Post  
hum: c. 8.*

## *De Preparantibus .* *CAP. XXXVIII.*

**C**irca præparantia hæc respicere debent genus materiae præparantia hæc respicere debent genus materiae præparandæ, illius qualitatem & locum affectum, ut meritò materiae obstructis debeant esse attenuantia & detergentia consequenter menstrua prouocantia, quorum alia sola partium tenuitate id præstant, alia uerò calefaciendo & humores fundendo. Merito autem loci affecti, cum uterus sit, debent cum ipso familiaritatem habere, & ratione longinquitatis uehiculum etiam retinere, ut ad illum usq; locum deducantur. Materia igitur eorū præparantium, quæ partium tenuitate magis agunt quàm calore sunt liquiritia, citrach, pentaphyllum, capilli ueneris politricon, aspraragus, malua, saxifragia, cichoreum, radix graminis, semina hordei, melonum, amygdalarum dulcium & huiusmodi. Inter composita extant mel Ros. Syr. acetosus, Oxymel. Syr. de Cicho. simp. & cætera, quæ ex Cichoraceis componuntur. Quæ uerò ratione potius caliditatis humores fundendo, menstrua prouocant, multa sunt, de quibus etiam Gal. 5. de simplici med. passim & lib. curat. p. uen. sec. cap. 18. sunt autem Betonica, Salvia, Arthemista Maiorana, Lauandula, seu Pseudonar-

*Præpa. sunt  
in dup. diffi.*

*Materia  
preparan-  
tium, tenui-  
tate sub.*

*Materia præ-  
para. per  
calid.*

*Hip. libro  
de morb.  
mulie.*

*Folia.*

N 2 dus



## De Morbis Muliebribus

- Radices.* dus, Nepita, Epithymum, Pulegium, Thymus, Hyssopus, Serpillum, Melissa radix filicis gladiori, Paulo ualentiora sunt radix Apii, Dauci, Ammeos, Petrosolini, feniculi, eryngii, Raphani, Aristolochiæ rotundæ & longæ, gentiana, origanum, calamentum, eruca, myrrhis, nasturtium, mentha, polium, ruta sabina, semina etiam corundem, fileris etiam montani, urtica, orobi agni casti cicerum rubeorum pœonia nigra & similia. His accedunt Aromata omnia, cina momû, iūcus odoratus, spica, costus, squināthū, galāga, cyperus, ginger, nux moschata, zedoaria, & cetera id generis.
- Gumæ.* His adduntur styrax, bdellium, opoponax, therebinthum, myrrha sagapenum, galbanum, castoreum & reliqua id generis. Præter hæc simplicia non desunt etiam composita, qualia sunt Syr: de Beton: de duabus de quinque radicibus: Oxymel compos: squilliticum, Syr: de Epithymo, de polypodio, de cichoreo compositus, de cichoreo cum Rhabbar: trochisci etiam galliæ moschata, rubiæ, sagapeni, de myrrha, de Eupatorio, de Epithymo, de Rhabbarbo, cyphodies, de Capparibus. Accedunt etiam Aromaticum ros: Diatrionpip: diacalament: diacyminum, diaspoliti: trypheta magna, Mithrit: theriaca, & reliqua id generis, his adduntur etiam vnguentum agrip. ægyptiacum ex galbano & huiusmodi omnium uerò validissima in mesti. prouocandis sunt materiæ auxilii ellectiue ducuntis. Quales sunt rhab. agar. scen. el. nig. & alb. coloc. cant. succus tit. flos aris, mezercon Ebulus. Quamuis autem hæc & plura menstrua prouocantia habeantur, non illis tamen indifferenter utendum, sed cum aliquo ordine, ita ut inter initia & eo tempore quo materia cruda adhuc conspicitur, leuioribus tantum uti liceat, quæ scilicet partium potius tenuitate, quàm calore agant: repugnat enim cruditati materiæ, ut ualentioribus euacuari possit citra maius nocumentum quàm iuuamentum, quando euidem eorum usu, pars tenuior materiæ crudæ educeretur, & cras
- fio.



fiores intus manerent, à quibus maior obstru&io fieret, tempore autem quo materia suæ co&tionis euidentia signa præ se fert, tutius erit ad ualenter prouocantia ascendendum, quæ Hipp. et fuit sententia, qua monetur, concocta esse medicanda, cruda autem nequaquam mouenda: per medicationem intelligens non solum euacuationem, quæ per secessum fieri solet, sed per alias quascunq; partes, siue per sudorem fiat, siue per lotium, siue per uterum qualis hæc est, de qua sermo habetur, in utroq; autem præparantium genere, cum multi sint gradus, ita erit progrediendum, ut in quolibet genere semper à leuioribus incipiamus, & ad ualentiora sensim ascendamus.

Ex propositis, itaq; materiis multæ medicamentorum formæ perscribi poterunt, deco&iones uidelicet, infusiones, succi, stillaticia aqua, pulueres, Syrupi, electuaria, trochisci, balnea, sessiones, fomenta, pessaria, clysteria, sacculi, cerata, suffitus, & cætera id generis. Cum autem sermo de his materiis hoc loco habeatur, & habeant rationem auxilii præparantis, ideò præparans medicamentum debitam quantitatem seruare debet, ut si utamur stillaticis aquis, infusionibus uel deco&tis, tempore hyemali in minori copia præbeantur & actu calida, in æstate uerò etiam frigidis ut poterimus, & in maiori copia, ut ab onc. iiii. ad libram ascendamus. si syrupis utamur, Dosis non sit ultra duas vnc. Dilutis uerò in duplum utemur, si succos potius eligamus uel erunt condensati, & horum Dosis non transibit drag. ii. si nondum condensati à drag. ii. ad 8. & ultra ascendere poterimus. si pulueres uel trochiscos à scrup. i. ad tres & quatuor peruenire poterimus, de quibus plura non dicam sed ad uacuantia descendo.

I. Aph. 22.

Forme medic.  
Decoc.  
Infus.  
Succi.  
Aqua stil.  
Pulueres.  
Syrupi.  
Electuaria.  
Trochisci.  
Balnea.  
Sessiones.  
Fomenta.  
Pessaria.  
Clysteria.  
Sacculi.  
Cerata.  
Suffitus.

De Morbis Muliebribus.

De Vacuantibus.

CAP. XXXIX.

Quid agēdū.

Euacuantia  
in multip.  
disse.

Purg. bilem

Monitum.

Hyp. prima  
aph.

Q VONIAM praeparantibus utimur euacuandæ materiæ gratia, ideò de eorum quoq; recta administratione loqui oportet, quæ tunc potissimum locum habent, quotiescunq; materia concocta & preparata est, & nihil prorsus, sponte naturae euacuatur, uel solum ex parte, tunc enim si tota uel eius pars intus detineatur, facillè potest prauam qualitatem uel putredinem suscipere & Symptomata quæ ad sunt intendere, uel noua etiã producere, quod ne contingat, Medici consueuerunt medicamentis adhibitis illam educere, & quò natura uergit: si per conuenientia loca id fecerit. Ad illius quoq; imitationem medicus per eadem solet euacuare, ut hinc ortum habeant plura genera euacuantium, ut alia per secesum per lotium, per sudorem uel uterum expurgent. Merito igitur eorū quæ per secesum purgāt, uaria sūt, pro purgantis materiæ uarietate, quæ si bilis fuerit, in communi usu hæc sunt, syr: ros: sol: uiolatus solut: manna, diaprunis solut: simplex & comp: El: de succo rosarum, species hieræ magnæ, quæ recipit scammonium, trochisci uiolati, rhabar: pillulæ ex Aloe, aureæ, de tribus cum Rhabar: & reliqua eiusdem generis, in quarum omnium materierum recta administratione, talis ordo pariter seruandus erit, ut in quibus morbis opus fuerit, non semel, sed pluries expurgare, illa semper præmittamus, quæ mitiora sunt, & ad ualentiora sensim ascendamus, quod potissimum fieri consueuit, ubi nihil adest quod prohibeat. Quod autem prohibere potest, est turgentia materiæ, uel eiusdem decubitus in principē aliquā partē; tunc enim non solum ualentiori purgante quamprimum utimur, uerum etiam nulla habita ratione de materiæ co  
ctio



Etione, illud exhibebimus, at ulla urgente necessitate  
tutius erit mitiora semper eligere, ut tali medicamento,  
bilis peccans commodè educi possit, accipientes Rhabar:  
electi drag. i. uel scrup. iiii. anisorum scr. s. aquæ stillaticæ  
capillorum Ven: saxifragiæ, hordei, q. s. Misce & fiat in-  
fusio. s. a. & facta diligenti expressione R. syr: ros: solut:  
onc. iiii. Mannæ electæ onc. ii. Misce & fiat potio brevis,  
quod medicamentum si pro necessitate valentius redde-  
re uoluerimus addere poterimus trahiscorum uiolat:  
drag. i. El: de succo rosarum tantundem: Tempus autem  
opportunitatem exhibendi tale medicamentum, non solum  
erit post coctionem materiæ euacuandæ, uerum etiam  
post coctionem cibi nuper assumpti, & per horas quinque  
& sex ante cibum propinari poterit; nisi aliquid prohi-  
beat. Quod autem prohibere potest, erit uirtus imbecil-  
lis, siue ex superuenienti euacuatione talis euadat, siue ob  
alias causas; & si contingat ut patiens medicamentum in  
potione non admittat, in bolo perscribere poterimus, ac-  
cipientes Diaprun: solut: simpl: onc. i. uel floris cassiæ  
tantundem, Rhabar: electi puluerisati drag. i. El: de succo  
rosar: drag. i. & semis, mannæ el: drag. ii. Misce & cum zuc-  
charo fiant boli quinque. Si pillulas libentius acceperit,  
poterimus accipere drag. i. uel unam cum dimidia, & duas  
etiam ex propositis pill: & cum Syr: de cichor. simpl. for-  
mare pillulas quinque; & inaurare. Si autem in corpore  
peccauerit potius pituita, habemus mel ros. sol. mel uiol-  
lat. sol. Diaphoenicum, Hieram simplicem, & comp. char-  
tatum, agaricum, succum utriusq; sambuci Diaturbith,  
pillulas de hiera simpl: & compol. Alephanginas, de A-  
garico, cocchias, foetidas & huiusmodi: ex quibus omni-  
bus ordinari pariter poterunt potiones, boli & pillulæ.  
Si potionem cupimus, ita perscribi poterit, accipientes  
Agarici trochiscati drag. i. uel scrup. iiii. gingiberis, gran. 7.  
uel 8. de coct. Betonice q. s. Misce & fiat infusio s. a. &  
facta

*Forma pot.*

*Tempus.*

*Forma boli.  
Pil.*

*De materiis  
euacuantibus  
pituitam.*

*Potio.*

## De Morbis Muliebribus.

facta diligenti expresseione, adde Mellis ros: sol: onc.iii.  
Diaphoeniconis drag.ii. Misce & fiat potio brevis. Bolum  
uerò reformabimus tali pacto, accipientes El: Diacathol:

*Bolus.*

Misce & cum succharo fiat Bolus, Si pillulas patiens cu-

*Pil.*

piat poterimus priores eligere à drag.vna usq; ad ii. cum  
melle ros: pillulas quinq; reformantes. Si scopus fuerit  
euacuare melancholiam, habemus Epithymum, polypod:

*Materia au  
xiliu vacua  
tis mel.*

folia senæ, & præcipuè orientalis, helleborum nigrum,  
conf: stamech, pill: etiam cœchias præparatas, de suma-  
ria, de lapide lazuli, Indas, Aggregatiuas & consimiles:

*Potio.*

ex quibus pariter materiis medicamenta componere pos-  
sumus, in potione, in bolo, & pillulis, in potione quidem  
ut si acceperimus, folioru senæ Orientalis drag.ii. Epithy-  
mi polypodii an.drag.i. anisorum scrup.ii. feri caprini.q.s.

*Bolus.*

Misce fiat infusio ut supra, cui dissolvere possumus mel-  
uiol: solut: uel rosati sol: uel etiam defumaria so-  
lut. ad onc. 2. conf. Hamech drag. ii. Misce & fiat

*Pil.*

potio brevis. Quod si ualentius reddere uoluerimus,  
pro infusione addere poterimus cortic:hel:nigri scrup.ii.  
in bolo autem hoc modo præscribi poterit, capientes  
El: lenitiui drag.vi. pulueris senæ orientalis drag. ii. cort:  
hel:nigri drag.5. confect: hamech. drag.15. Misce:& cū  
succharo fiat bolus eadem & de pillulis ratio habeatur.

## De Localibus.

### CAP. XXXX.

**V**Niuerso corpore ita expurgato ad localia deueni-  
endum erit, quæ pariter uaria sunt pro causarum  
uarietate. In primis si menstrua non fluant ob materiæ  
defectum & ratione inedie occurrendum erit cum reple-  
tibus,

*Ratio uic.*



tibus, quorum materia alimentum erit boni succi & facilis coctionis: cui tota reliqua uictus ratio correspondere debet, secus è medio tollitur ipsa conceptio, quæ sine generatione huius sanguinis superflui fieri ullo modo potest. Si autem menstrua non fluxerint ob labefactatam facultatem totius uel partis, cum id fiat ob aliquam intemperiem, illi semper occurrendum erit cum alterantibus in contrarium quare si intemperies calidior & siccior fuerit, consultum erit ab illis desistere, quæ suo calore, & humores fundendo menstrua prouocant; quia ab istis adhuc magis dicta intemperies augebitur, ut aucta suppressionis causa, consueta euacuatio magis cohibeatur; propterea in illis potius erit insistendum, quæ temperata sunt, uel ad frigidum & humidum magis uergunt, partium tamen tenuitate obstruentes causas remouere possunt, cuius generis sunt folia maluarum, matrum uiolearum altheæ semina melonum. amygd. dulces, hordeum, passulæ, lac & huiusmodi, quibus uti licebit, tum intus præbendo succos & decoctiones in iure paratas, ex quibus, etiam conseruæ, & electuaria confici poterunt, ex eisdem parantur etiam balnea cum aqua dulci, sessiones, & præterea corpus etiam totum inungi poterit cum oleo amygd. dulci, & liliorum alborum. Vbi autem locum habuerit intemperies potius frigidior, ratione cuius uix sint adstrictæ & densatæ, occurrendum erit cum moderatè calefacientibus & laxantibus, atq; istis pariter intus & extra admotis, potissimum autè conducet balneorum ac sessionum usus, si ex floribus Chamomillæ, anethi, arthemisiæ, matricanæ, maluarum & similibus parata fuerint. Si deinde menstrua non fluant, quia eadem facultas sit potius impedita cum à multis causis impediri possit, uarias etiam auxiliorum materias ex postulabit, ut si impediatur ratione materiæ genitæ, quæ in alias partes raptum habeat, tunc materia ista effluet, uel in his partibus detinebitur. Si intus detineatur,

O omni

*Materia auxilij temperati aperiētis.*

*Materia auxilij moderate calefacientis et laxantis.*

*Cura suppressionis à facultate impedita.*



## De Morbis Muliebribus

*Materia auxilii reuellentis*

*Vene sectio*  
*Cucurb.*

*Ligat.*

*Frictiones*

*Lotiones.*

*Lenimenta.*

*Balnea.*

*Sesiones.*

*Pessaria.*

*Suffitus.*

*Locus uene sec.*

*Lotio.*

*Modus.*

omni ingenio educenda erit: Si autem effluat, cum ratione huius mulier infœcunda reddatur, scopus erit talem materię motum ad consueta loca auertere, atq; tunc locum habebunt materię auxilii reuellentis, quales esse possunt uenę sectio, cucurbitularum applicatio cruribus & coxis, frictiones, ligaturę lotiones, lenimenta, balnea, sessiones, pessaria suffitus & reliqua: Vnde si sanguis sursum petat, & per uomitum & narium uenas euacuetur, pro sterilitate remouenda ad propositas materias reuellentes deueniendum erit, ut merito sectionis uenę secari debeat in partibus remotioribus, non quidem supernis, sed infernis, cuiusmodi sunt malleolorum uenę, & modò in dextra modo in sinistra parte, seruata semper rectitudine cum partibus superioribus magis affectis: eadem sit ratio de cucurbitulis, quę eisdę cruribus primò erũt affigendę, quas si repetere opus fuerit, deriuandę materię gratia, coxis etiam admoueri poterunt; & secundum partem earum potius internam quàm externam. Eadem ratio habenda erit in administrandis cucurbitulis non scarificatis, & frictionibus; lotiones etiam in eisdem partibus negligendę non erunt, paratę tamen ex moderatę calefacientibus & aperientibus, & eo modo admoueri debent, ut actu calidę fiant, ut utriusq; calor ratione, non solum à supernis partibus attractio fiat, sed uiarum quoq; apertura, ex quo ipso decocto in eundem usum parabuntur sessiones, in quibus omnibus ea semper permiscenda erunt, quę laxandi uim etiam habeant, ut sunt folia maluarum, matrum uiolarum, radices altheę & huiusmodi, hac enim ratione nullum periculum imminet de maiori obstructione, quod sanę contingere posset, si solis calefacientibus uteremur, ex quorum usu partes tenuiores detentę materię resoluenterentur, & crassioribus relictis maiorem duritiem acquirentes, obstructionem etiam ualentior redderent; quod ne contingat laxantia permixta prohi-

hi-



hibebunt. Si deinde menstrua non fluxerint, quia facultas impediatur à causa obstruente uenas, non solum vteri & colli ipsius, sed earum quoq; partium, quæ ad vterum deducuntur. Huic obstructioni occurrendum erit, causas ipsius remouendo, quæ cum esse possint materiæ copia, crassities, aut lentor, copiæ occurremus euacuando, cuius euacuationem si materiæ cruditas crassities & lentor prohibuerint priori loco erit coquenda, & præparanda, deinde euacuanda, quorum auxiliorum materiæ, quædam intus exhibentur, quæ præcipuè locum habent, ubi obstructio in internis magis uenis fuerit, quæ ad vterum deducuntur, alia extra admoventur, quorum usus magis habendus erit in ea obstructione quæ uenas vteri & colli eius potius occupat. Si igitur expedierit illis aperientibus & menstrua prouocantibus uti, quæ per os exhibentur, locum habebunt omnia superius enumerata, tum simplicia tum composita, ut merito simplicium conueniant illa quæ partium tenuitate & caliditate agunt, eisdemq; modis & formis propinabuntur, sicuti dictum fuit. Eadem sit ratio de compositis, siue parata habeantur, siue pro nostro arbitrio ex iam propositis materiis componantur. Et inter cætera summè laudantur trochisci de myrrha, ut ex sententia ipsius Rhasis, quorum usus non solum suppressa menstrua prouocare possit, uerum etiam mortuum fœtum educere: Dari autem possunt cum aliquo uehiculo, ut cum vnc: tribus & quatuor ipsius mulsæ singulo mane, uel cum aqua succharata uel iure cicerum rubeorum, succharo permixto: nam ex Gal: & experientia habetur, vterum rebus dulcibus summoperè oblectari, ut medici etiam testentur, quòd eadem medicamenta uario modo exhibita, modò lotium modò menstrua prouocent; Si cum dulcibus permixta fuerint, menstrua magis prouocabunt: Si autem sine his lotium potius mouebunt. Oportunum uerò tempus exhibendi talia medicamenta, erit non solum post totius euacuationem, sed

*Cura suppressionis à materia obstruente.*

*Aperientia per os exhibenda.*

*Troc. de myrrha.*

*Modus.*

*Lib: de præcog: ad Posthu: 8.*

*Quando agendum.*

O 2 sta-



## De Morbis Muliebribus

*Extra appli-  
canda.*

*Monitum.*

*Vnctiones.*

*Materia la-  
xantes.*

*Materia ca-  
lesfaciemus*

statim etiam à balneo, hoc enim tempore uia sunt para-  
tiores, & magis apertæ: & præsertim si illius etiam tem-  
poris ratio habeatur, in quo pro consuetudine talis expur-  
gatio per uterum fieri consueuerat: hoc enim tempore  
natura aliqua ratione materiam commouere solet, quæ  
adiuta à propositis medicamentis, facilius poterit per cõ-  
suetæ loca uacuationem repetere: Quo deinde attinet ad  
ea, quæ extra aduinculantur, non est ut de his multa di-  
cam, cum pariter illæ eadem materiæ, & rationes con-  
ueniant, de quibus supra locuti fuimus. Quare eadem bal-  
nea, sessiones, fomenta, lotiones, suffitus & reliqua confe-  
runt; in quorum omnium usu, illud perpetuo obseruan-  
dum erit, ut dum fiunt balnea aut sessiones, non solum  
fiant in pura & simplici aqua, sed probatur magis aqua  
stillatitia ex illis parata, quæ uterum respiciunt. hæc enim  
& partiū tenuitate, & familiaritate, quā cū utero habet, effi-  
caciior uidetur: permiscere quin et debemus succharū aut  
mel ut ratione dulcedinis maiore agendi uim in uterū ha-  
beant. Præstabit etiam eadem in uino parare, & uino dul-  
ci potius quàm austero. Alterari autem poterunt, modo  
cum his quæ prouocant menstrua sola partium tenuitate,  
& laxandi uim etiam habent, præsertim si uteri densitas  
adfuert, modò illis uti magis conuenit, quæ calore etiam  
uim habent maiorem attenuandi, pro diuersitate mate-  
riæ obstruentis. In eundem usum præstabit etiam inun-  
ctiones adhibere ad partes uteri, & in illis præsertim mu-  
lieribus quæ balnea uel sessiones non admittunt, quæ pa-  
riter poterunt parari ex laxantibus & calefacientibus, ut  
merito laxantium conueniat oleum Amygd: dul: recens,  
liliorum alborum uel pinguedo uituli & humana. Merito  
autem calefacientium uti poterimus oleo rutaceo, de mē-  
tha, de spica unguentareorum, belzoino & similibus. Et  
si efficacioribus opus fuerit, permiscere poterimus por-  
tionem aliquam alicuius olei stillatici, et ut uterus talia  
fa-



facilius suscipiat : et iuuamentum habeat, in praxi id per  
petuo obseruandum, ut aliqua odorata permisceamus, qui  
bus uterus et spiritus eius maxime oblectantur, cuiusmo  
di sunt muschus, ambra, styrax, belzoinum, calamita et hu  
iusmodi. Quemadmodum si iuxta hanc formam, inunctio  
paretur, accipientes Olei amygd. dul. olei rutacei, de spica  
unguentariorum an. drag. 11. Calamitæ scrup. 5. Muschi gr. 11  
misce pro in unctio. Si ad lenimenti formam hanc in  
unctionem deducere cupimus, illi addere poterimus pin  
guedinem galliæ autem uituli, uel medullam cerui mu  
cil. alth. frenug. sem. li. quibus potissimum utimur, ubi e  
tiam ratione duritiei menstrua non fluunt. locus autem  
inungendus, non solum erit secundum internas uteri par  
tes, uerum etiam externas, quare inunctio fieri pote  
rit in pube, et inter anum et uulvam. his autem et  
similibus potissimum utendum statim à balneo. Hoc eo  
dem tempore negligenda etiam illa non erunt, quæ plan  
tis pedum applicari possunt, quæ partes tum ratione re  
ctitudinis cum utero, tum magni consensus cum eodem,  
maximè possunt alterationem quam recipiunt, illis etiam  
communicare, quod fit propter insignes uenarum arteria  
rumq; propaggines, quæ ad dictas partes ducuntur. Qua  
propter gestatio ipsius sabinæ, rubæ tinctorum, urticæ,  
matricariæ et similium sub dictis plantis pedum, maximè  
prodesse poterit. uel eorum loco inungi poterunt eadē  
partes cum supra dictis oleis. Praeter proposita auxilia  
illa etiam accedunt, quæ intus immittuntur, cuiusmodi  
sunt pessaria, clysteria, suffitus et huiusmodi. Quo ad pes  
saria attinet, uaria hæc erunt, pro uarietate supprimentis  
causæ, quæ si fuerit durities uteri, uel callositas eiusdem  
in emollientibus erit insistendum, qualia sunt quæ paran  
tur ex radice altheæ, malua et similibus, prius tamen  
istis oblititis, et laxante aliquo oleo imbutis, nempe oleo  
amygd. dulci, liliorum alborum uel mulla, uel cremore  
pal-

*Monitum.*

*Materia o-  
dorata.*

*Modus un-  
ctionis.*

*Lenim.*

*Locus.  
Tempus.*

*Pessaria.*

*Pessaria e-  
mollientia.  
Modus.*

## De Morbis Muliebribus.

passularum, uel pinguedine etiam aliqua iam proposita, poterunt quin etiam dictę radices & folia in dictis oleis uel pinguedinibus decoqui, mox contusis & tenuissimo linteolo exceptis ad digiti formam deducere, & filo appenso intra uuluam immittere. Lana etiam succida dictis oleis imbuta & ad digiti, formam redacta intromitti etiā poterit. Si deinde post lenitionem duritiei cum prædictis cerninam medullam acceperimus, & includatur pariter in linteolo raro, in mulierisq; pudendum recondatur, multū conducet in educendis menstruis ex duritie suppressis. Vbi uerò non fluxerint ob uenarum potius obstructiōnem, si obstructio facta fuerit à materia crassa & uiscida, qualis est pituita & melancholia, pessaria conficienda erunt ex materiis auxilii calefacientis, attenuantis, detergētis et aperientis, in quo genere extant materię ualentiores & minus ualentes, in quarum usu a leuioribus auspicantes, parare poterimus in primis pessaria ex radice petroselini, apii, dauci, feniculi, matricarię, arthemisię, myrrhidis, & similibus; quę decoqui poterunt in oleo chamomeli: antehino, ol: de spica unguentariorum, de ruta, liliorum alborum cum aromatis & similibus, quibus ita optimè coctis & contusis, modico croco permixto, & muscho, excipi poterunt uel in cirbo castrati, uel in linteolo raro: & formato pessario in uuluam immittere. Si paulò ualentiori pessario fuerit opus, parari poterit ex ualentioribus calefacientibus, cuiusmodi sunt sabine folia, ruberę tinctorum, radix centaureę minoris, gladioli seu iridis & huiusmodi; quę pariter decoqui poterunt in oleo petroleo, uel laurino, additis odoratis & ad formam pessarii deducere. Valentiora adhuc pessaria erunt, si componatur ex materiis determinatos humores euacuantibus, ut si suppressio facta fuerit ab obstructuente pituita, accipere poterimus Agarici trochiscati, carthami, singulorū scrup. i i i i. decoctionis matricarię,

athc-

*Pessaria in obstruct.*

*Materiæ pef. calef.*

*Modus.*

*Pessaria ualentiora.*

*Aliud.*



arthemisiæ in mulla uel aqua succharata factæ, in qua illa infundi debent per noctem, ut ab illis non solum calefaciendi & attenuandi sed etiam euacuandi uim acquirât, mox perunctis cum dictis oleis, per modum pessarii immitti debent. Parari etiam poterunt ex magnis Antidotis, ex theriaca & mitrhidato & aliis, ut si theriacæ, mitrhidati, diateffaron an. drag. s. acceperimus, nigellæ & mirrhæ an. scrup. i. & simul cum bombace uel lana contundantur, & ad formam pessarii deducantur, & immittantur: ubiq; etiam familiares materias habere poterimus, quibus talia pessaria fient, cuiusmodi sunt Allium, radices raphani, radices est semina urticæ & aliorum propositorum. Ex allio enim contuso & oleo de spica permixto & raro linteolo excepto, satis potenter suppressa menstrua euocantur, & uterum etiam mira quadam uoluptate afficitur & repurgatur, ut tali ratione plarissq; mulieribus ad concipiendum etiam uia paretur: Idem statuendum erit, si obstruens materia melancholica fuerit, tunc enim si expurgantibus pessaria conficere uoluerimus, infusiones, decoctiones & reliqua parari poterunt, ex illis materiis, quæ talem humorem educere possunt, cuiusmodi sunt epithymum, sena, cortices hellebori nigri & huiusmodi, ad quæ & similia ualentiora Hipp: etiam quandoq; ascendit; ex quibus ad priorum similitudinem pessaria præscribi poterunt. Pro eodem utero ex dictis materiis clysteria etiam parari poterunt, quæ pariter uaria erunt pro multiplici uteri affectione, ut si duritie & callositate aliqua correptus fuerit, ex propositis laxantibus & emollientibus componenda sint, siue olea ea fuerint, succi aut decocta pinguedines aut medullæ. Quantitas autem modica esse debet, quia loci angustia maioris copiar non est capax. Tempus uniuersale post totius euacuationem esse oportet particulare autem erit ante cibum, & eo modo administranda erunt, ut non frigida nec calida sed tepida

*Aliud.*

*Aliud.*

*Pessaria in obstia mel.*

*Lib: de morbis mul:*

*Clysteria Gal. s. met.*

*Quantitas.*

*Tempus.*

iniician-



## De Morbis Muliebribus. 20

*Modus.* iniiciantur, premissa tamen uiarum obliuione cum oleo,  
*Locus.* amygdalino, butyro et similibus ut instrumentum facilem,  
ingressum habens, in transitu suo nullum dolorem pro-  
ducatur. Si idem uterus obstructione detentus fuerit à ma-  
teria crassiori et lenta producta qualis est pituita et melā-  
cholia, eligendæ erunt illæ materiæ attenuantes, calefacien-  
tes, & detergentes, quare parari poterit ex decocto Arthe-  
misæ, matricariæ, myrrhæ, thymo, & aliis iam propositis,  
decoctioq; fieri poterit in mulla, aqua succharata,  
uel in uino etiam dulci, & urgente necessitate a-  
scendere etiam poterimus ad illas quæ eandem mate-  
riam ab utero euacuare possint, quæ si pituitosa  
fuerit, capere poterimus decoctum carthami & Agarici  
trochiscati, ut omittam turbith & pulpam coloquinth:  
quæ ualentiores sunt, addendo etiam aliqua aromatica.  
Si autem scopus fuerit Melancholiam potius educere pa-  
randum erit clyster ex decocto polypodii, epithymi, suma-  
riæ, centaureæ, foliorum senæ & similium. Tempus uerò  
oportunum erit non solum post totius euacuationem, ue-  
rum etiam post materiæ præparationem. Præter Clyste-  
ria conferunt etiam suffitus seu euaporationes, quæ po-  
tissimum locum habebunt in illis mulieribus, quæ clyste-  
ria aut pessaria nequaquam admittunt aut quia uirgines  
sunt, aut ob aliam causam. Hæc autem suffumigia uaria  
& ipsa sunt pro affectionis uarietate: quare in duritie &  
callositate uteri ex dictis laxantibus & emollientibus pa-  
rari poterunt, permiscendo semper odorata, quemadmo-  
dum si acceperimus, decoct: Maluarum, matrum uola-  
rum, pastularum dulcium, serpilli, thymi, maioranæ, ci-  
tri addendo etiam modicum galliæ moschata, styracis aut  
muschi, omnibus in mulla aut uino odorato decoctis,  
uti poterimus, ut uase undiq; bene cooperto, uapor in  
uterum suscipiatur, mediante arundine, cuius altera ex-  
tremitas à summitate uasis ducatur, & secundum alteram  
in uuluum



in uulnam recipiatur: sic enim uapor aliunde transpirationem non habens, mediane arundine utero communi-  
cabitur. Post talem sufficum uterus inungj poterit cum  
oleo amygd. dulcium. Vbi autem locum habebunt ob-  
structiones, parabuntur suffitus ex materiis calefacienti-  
bus & attenuantibus & urgente necessitate euacuantia  
iam proposita permisceri poterunt. Quemadmodum si  
acceperimus arthemisiæ, lauandulæ, thymj, matricariæ  
añ. M. j. Cinamomi, styracis añ. 35. & in uino dulci uel  
mulsa decoquantur, & pro suffumigio parentur. Parari  
quoniam etiam poterit ex thure, styrace, bdellio æqualibus  
partibus acceptis & super prunas positis, ut suffumigium  
fiat. Omitto inunctiones & sessiones, de quibus supra. si  
deinde menstrua non fluant ob pinguedinem, tota cura-  
tio consistet in recta potius uiuendi ratione, quam in  
ceteris auxiliorum materiis: quare uniuersa uictus ratio  
extenuans & exiccans esse debet; quemadmodum è con-  
tra si menstrua defecerint, quia non generentur,  
ut in corpore febricitante uel ex longa inedia ema-  
ciato curatio consistet tum in ablatione febris tum  
in corporis restauratione & refectione; largiorj uictu &  
optimj succj ac facilis coctionis peracta. De illa uero sup-  
pressionem, quæ fit à tumoribus comprimantibus, uel ab  
ulcere, consultò non tracto, quia de hac agere esset  
curacionem ulcerum atq; tumorum propone-  
re, de illa deniq; suppressione, quæ fit  
ob cicatricem uteri tractare non  
est opus, sed ut incurabilis,  
prætermittenda erit. Vi-  
ctus autem ratio ea  
semper sit, quæ  
proportionem respondeat causis obstruen-  
tibus & propositis medicamentis.

*Inunctio e-  
mel.*

*Suffitus ca-  
lesati.*

*Cura ex  
ping.*

*Cura ex ma-  
teria defec.*

*Cura ex tu-  
moribus.*

*Cura ex cica.*

P DE



## De Morbis Muliebribus

### De Præfocatione Matricis.

#### CAP. XXXXI.

Ordo & ordinis ratio.

Nominis explicatio.

Nomen à qualitate mut.

Nomen à symp.

Nomen à loco affec.

Nomen à morbo.

Plato.

Quamuis doctrinæ ordo exoptulare uideatur, ut post tractationem de suppressis mestruiis, De immoderato profluvio eorundem sermo habeatur; ut pote de illo symptomate, quod suppressioni ualde opponitur, non propterea legibus dicti ordinis repugnabimus, si de præfocatione matricis orationem interpoluerimus, quæ affectio ob magnam affinitatem quam habet cum suppressione in essentia loco affecto causis & curatione, priorem etiam tractationem exoptulare uidetur; Cuius initium à notione nominis accipietur. Nam per suffocationem matricis intelligo illud symptoma, ratione cuius mulier ob affectum uterum, secundum uniuersum corpus suum ualde refrigeratur, Respirationemq; & pulsationem amittit, nonnunquam sensu ac motu uoluntario priuatur, ut ab omnibus insipientibus, mortua potius quàm uiua iudicetur. Quem affectum latini uocant uteri strangulatum, quia in ipso mulieres eandem suffocationem pati uidentur, ac si strangularentur, Alii ablatam respirationem nuncupant, nomine desumpto à loco affecto, aut à superuenienti symptomate: Paulus & Aetius uteri peruerlionem, & ad superiora uel ad latera recursum appellant: Non quia in hoc affectu uterus instar cuiusdam animalis localiter per corpus moueatur, ut Plato quandoq; dixisse uisus est, sed potius quia, in tali uitio uterus contrahitur ad superiora, uel ad latera peruertitur, Et quanuis cordi officiat, syncopim faciendo, & pulmonibus ac diaphragmati respirationem impediendo, non tamen hec & similia in muliere præfocata contingunt, quia uterus per corpus erret, ut qui ad sopitum transuersum perueniens respirationem impediat, & ad cor pa-

rietur



riter ascendens, meatū spiritus obstruendo, animi defectū faciat. Hoc enim sensui repugnat, & iis quæ in dissectionibus apparent, ceteris q; omnibus functionibus naturalibus ac uoluntariis obeundis aduersatur, ut iure optimo Gal, hanc sententiam pluribus et demonstratiuis rationibus confutauerit. Non propterea credendum est, platonem philosophum alioquin diuinum, eius fuisse opinionis, ut illius uerba significare uidentur. sed existimo ego, ut per uterum potius intellexerit, malignum corruptūq; illius uaporem, à cohibito semine aut mestruo ortum, qui substantiæ suæ tenuitate, ac proinde mobilitate, instar cuiusdam animalis per corpus mouetur et errat. suaq; uenefica & corrupta natura, cæteris partibus omnibus corporis plurimum nocere ac officere potest: & pro illarum diuersitate, uariisq; officiorum generibus, modo respirationem tollit, si septum transuersum petierit, modo lipothimiam facit, si cordis substantiam magis occupauerit, modo corpus totum uehementer refrigerat, si per unam illius anatomiā se diffuderit; Ab horū autē uaporū minera replente uasa ad uterum pertingentia, ejusdē retractio & conuulsio oritur: Hac eadem ratione pariter putato, non solum diuinum Platonem à Gal. calumniis facile uendicari posse, uerum etiam. Arist. qui? statuere uisus est, cœrebrum factum fuisse frigida & humida temperaturæ tum ob proprias functiones edendas, tum etiā propter cordis fœruorem contemperandum; Quam sententiam Gal. secundum nuda uerba considerans, potius, quàm germanum sensum, illum etiam reprobatur, & ea ratione innititur, quia oportuisset naturam fecisse hec duo membra magis propinqua, ut mutuo contactu, uel saltim maiori uicinia facile contemperari possent. At uidemus has duas partes non solum per satis magnam distantiam differentes collocasse, uerum etiam inter utraq; multas alias interposuisse, ut distantia huius ratione, & partium

6. de loc. eff.  
cap. 5.

Platonis de  
sensio.

2. de par. a-  
nimal. c. 7

8. de usu pa.

Ratio prima

Secunda ratio

in P 3



## De Morbis Muliebribus

interpositione nequaquam rationabile uideatur, quod de illarum partium actione & passione Arist. sensisse uisus est. Quæ Gal. ratio etiam si probabilitatem aliquam, continere uideatur, Si tamen ipsius Arist. mentem magis penetremus, optime loutum fuisse inueniemus; & Gal. improbatione dignum magis iudicabimus: Ea enim fuit, ni fallor, Arist. opinio, cœrebrum uidelicet frigidum & humidum fuisse, ut cor calidius & siccius contemperaret, hoc est ut spiritus uitalis cordis partium omnium nostri corporis calidissimus in cœrebrum influens, ab eius temperatura moderaretur, & hac ratione animalis euaderet, ac proinde facultatum omnium animalium cœrebrj idoneum instrumentum, pro earum muneribus & officiis obeundis existeret: At ne à principalj nobis proposito scopo digrediendo, nimis recedere uidear; supposita nominis explicatione, ad subiectæ rei essentiam indagandâ accedo, quæ cum ex causarum inuentione & cognitione pendeat, formalj inquàm materiali & efficiente, ideo studium meum erit singulas diligenter inuelligare, & examinare: prima omnium formalis occurrit, communi autem medicorum omnium consensu iam diu confirmatâ habetur, quod præfocatio matricis in genere sympt. sit; quamuis in specie determinata dissentire uideantur, ut quidam statuunt esse in genere lesæ actionis, Alij, exeuntis mutati, non nulli in qualitate mutata potius collocant: quorum controuersis consulto prætermis, ego facile credo, sub quocunq; genere indifferenter collocari posse imprimis qualitas mutata dici potest, ratione qua in hoc sympt. naturalis & tangibilis uterj ac totius qualitas alterata immutataq; est, & per frigidum à statu naturalj plurimum recedit; Nam huius symptomatis presentia mulier usq; adeo perfrigerari contuget, ut à cadauere uix distingui possit, Nec propterea confundimus sympt. cum morbo, quia perfrigeratio ista quæ præ-

fo-

*Defensio Arist.*

*De essentia præf.*

*Forma naturalis præfoc.*

*De forma specifica uariæ opin.*

*Concilium.*

*Præfoc. esse sympt. in*

*qual. mutata.*

*Obiectio.*

*Solutio.*



focatonem sequitur, à morbo in intemperie frigida longe dītat, Nam refrigeratio ista affectio quædam est, morbum in uia consequens, ac proinde est symptoma in tangibilij qualitate mutata consistens, intemperies autem frigida affectus potius est, & ex morbi genere, sub quo præfocatio matricis ullo modo collocari poterit: ut quidam modernj secus sentientes, in magno errore uersantur. Quam ueritatem tum alia, tum illius generationis modus clare ostendere potest; quandoquidem præfocatio non sensim, & longiorj tempore fit, successiuq; incrementa suscipit; sed ut cito oritur, ita etiam citissime quandoq; desinit, ut spacio unius horæ miseras mulieres quandoq; interficiat, ergo morbus in intemperie esse minime poterit: cum Gal. teste intemperies, nec cito, fiat nec cito desinat: quo eodem fundamento innitebatur probando epilepsiam esse symptoma, quod in morbum in intemperie ullo modo reducj poterat, sed potius in morbum male compositionis & in uia. præterea si refrigeratio hæc quæ in præfocatione obseruatur, morbus esset in intemperie frigidiorj, ea certè non remissa, sed ualde intensa esse deberet, cum uniuersum corpus adeo frigescat, ut corporj mortuo coequetur; & propterea calefacientibus utero & totj admotis tolleretur, quod tamen est falsum, & Gal. etiam repugnat, qui aperte testatur curari quandoq; hanc præfocationem, nullis remediis utero adhibitis sed sola seminis uel mēstrui euacuatione per eundem uterum facta: quare præfocatio matricis ita erit totius perfrigeratio, ut nequaquam morbus sit in intemperie: sed potius symptoma in qualitate mutata: quod etiam dici possit symptoma in exeunte mutato, patet quia in hoc uitio intus & præter naturam retinetur, quod naturaliter exire deberet. quod autem cohibetur ex hyp. & Gal. est sanguis mēstruus uel semen, uel utrunq; simul, à quibus deinde elleuatur aura quædam frigida & uenefica,

*Contra modernos.*

*Ratio prima*

*3. de loc. affec. cap. 7.*

*Ratio 2.*

*Ratio 3.*

*6. de loc. affec. cap. 5.*

*Præfec. esse symp. in exeunte.*

*Lib. de mor. muli.*

*6. de Loc. affec. cap. 5.*



## De Morbis Muliebribus.

ca, quæ alterando & agendo tantæ est efficacie, ut in alias partes corporis se diffundens, tum uaria symptomata producat, tum potissimum corpus totum insigniter refrigerando immutet, ut suo loco clarius constabit. quæ duo symptomatum genera, sub quibus præfocationem contineri diximus, ea affinitate coniuncta esse uidentur, ut perfrigeratio uteri & totius non fiat, sine precedenti retentione dictarum materierum, & iisdem pariter euacuatis, nullisq; alijs remedijs utero adhibitis, auferratur symptoma & in pristinum statum mulier reuertitur. Hec ipsa præfocatio si quis etiam in lesam actionem magis referre uoluerit, non repugnabo, Nam ea ratione qua materia per uterum non effluit, quæ alioquin effluere deberet, actione expultricis uteri ablata, poterit in genere actionis lesæ etiam reponi: Erit igitur præfocatio matricis actio ablata expultricis uteri, Eadem erit exiens mutata quia retinetur, quod omnino exire deberet, Deniq; erit, & qualitas mutata, ratione qua uterus & corpus uniuersum perfrigeratum obseruatur, & hec de forma. Affectus uerò locus in hoc symptomate erit uterus, qui perpetuo patitur, & illius causa ceteræ quoq; partes omnes in consensum trahuntur, ut non immerito à priscis illis medicis huiusmodi affectiones hysterice uocate fuerint, quia ad uterum tamquam ad radicem pertinent: communicat autem uterus has suas affectiones, cæteris partibus & corpori uniuerso, non solum ob communem illam conspirationem quam habent partes inter se, & cum suo toto, uerum etiam per singularem consensum, quem idem uterus retinet cum partibus principalibus, ac proinde cum corpore uniuerso; Cordi quidem communicat per arterias, ut hinc lipothimia syncopis, pulsus & respirationis ablatio prodeat; Cerebro communicat per menbranas spinalis medullæ. Hinc sopores melancholicæ uertigines epilepsia appoplepsia & similia contingere possunt.

Ic

*Præfoc. esse  
symp. in  
acti. lesa,*

*Locus affect,*

*6. de loc.  
affect. cap. 5*

*uteri consensus.*



Iecori tandem communicat per uenas, hinc febres tumores & cetera eiusmodi fieri solent: His autem partibus uel omnibus uel pluribus uteri causa affectis, totum etiam corpus in consensum facile trahitur. Cæterum hoc genus symptom. licet mulieribus potissimum adueniat, non tamen solis, sed uiris etiam aliqua ex parte commune est: Quamuis enim accidentia illa quæ suppressos menses sequuntur, foeminis tantum propria sint, ea tamen quæ seminis ratione nascuntur utrisque communia erunt; Quemadmodum enim semen in utroque sexu generatur, ita in eisdem etiam coaceruari intusque cohiberi & alterari potest; quod dum sit easdem mutationes anbo subire poterunt, & ideo Gal. testatur, repertos fuisse homines qui ueneri assueti, pretermissa tali consuetudine, uariis symptomatibus subiiciebantur, capitis uidelicet grauitate uertigine inappettentia cruditate febre: Alii frigidi & torpidi euadebant, quidam melancholici, omnes tamen quam primum ad pristinam consuetudinem reuertebantur, nullis aliis presidiis adhibitis, sponte liberabantur; Quod hominum genus ita fecundum Plato Arboribus immodice fructiferis comparasse iure uisus est, in quorum numero Diogenes ille cynicus collocari potuit, qui etiam si moralium uirtutum omnium splendore predictus esset, & earum precipue quæ ad continentiam magis spectabant, proprio tamen genio ac naturæ indulgens, uenere soepius utebatur, idque non coniuncte uoluptatis gracia, fecisse existimatum est, sed magis ut propriæ salutis & conseruationi incumberet, & multa illa nocumenta euicaret, quæ ex retento semine sibi aduenire posse facile intelligebat; cuius rei singulare testimonium esse potest, quod meretricem tardius accedentem quam illi pollicita esset, libenter reiecit; in illiusque tardo aduentu se excusans, respondisse fertur, manus hymenæum celebrando te præuenit: Quamuis autem propositum symptom.

*præfoc. cois  
est uiris &  
foeminis.*

*Lib. de sem.*

*6. de loc.  
aff. 5.*

*Historia.*

*Differentia.*

ptoma



## De Morbis Muliebribus. 20

### Ratio prima

### 2. ratio.

### 3. ratio.

### 4. ratio.

ptoma mulieribus ac uiris commune sit, magna tamen eorum latitudo habetur, quandoquidem in muliere omnia ennumerata symptomata maiora frequentiora plura & scœuora conspiciuntur, quam in uiris, cuius diuersitatis ratio multiplex assignari potest, primo quia in uiris ob calorem rebusiorem omnis superfluitas magis absurtur, ob eiusdem autem inbecillitatem in scœminis copiosius aggregari permittitur. secundo in uiris ob continuos & maiores labores, non tam cito & facile copiosum semen aggregatur, at in mulieribus quæ uitam magis ociosam & umbratilem degunt in maiori quantitate coaceruari oportet. preterea ubi in uiris semen redundat, quæ superueniunt symptomata, non nisi solius seminis aggregatione contingent; At in mulieribus preter seminis cohibitionem, mēstruorum quoq; retentio simul accedere solet, ut ex hac duplici materia retenta, duorum etiam generum accidentia oriantur. Accedit etiam quod in symptomatum magnitudine numero & scœuitate distinguuntur; Nam quæ mulieribus symptomata adueniunt, maiora sunt, plura scœuora & diutius duratura; & diuersitatis ea est ratio, quia in uiris semens cohibitum non est adeo prauum & uiciosum, ut in scœminis esse consuevit; quod fortasse in causa esse potest quod ex hoc superuenienti symptomate, non æq; ut scœminæ interire solent.

## De causis efficie. præfoc.

### CAP. XXXXII.

CÆterum quia symptoma ratione qua dependet, in causam & morbum suum reducj debet, ideo quæ sint eius causæ inuestigare oportet, de quibus etiam diligenter



genter agendum est, tum quia sine earum cognitione natura propositæ affectionis conspicua esse nequit; tum magis quia recta curandj ratio adhiberi non potest: & pretertm quia in hoc modo multa uaria & lethalia symptomata conspiciuntur, & ommitto quod etiam in illis omnes non consentiunt, sed apud ueteres & recentiores uariæ semper fuere opiniones, Alij enim in frigidiores intemperiem Alij in sicciorem, quidam in morbum instituerunt, plato causam in uterum reducit cum uidelicet ijs priuatur, quæ concupiscit, quo tempore corpori uniuerso maxime nocere consuevit, ut ea pars, inquit, quæ mulieribus uterus nuncupatur, cum sit animal prolem generare cupiens, si intempestiue diuq; in fructuosum fuerit, succensens ægre fert, erransq; per totum corpus, & spirituum meatum obstruens, respirareq; non sinens, in extremam anxietatem deicit, atq; multos alios morbos excitat: Cuius dicti occasione, alii addiderunt, quod idem uterus ita per corpus errando, si ad septum transuersum peruenerit respirationem impediet: Quas opiniones omnes consulo pretermittam, tum quia à Gal. fuere recitate & consulate, tum magis quia ex proponenda ueritate & legitima causa huius symptomatis clare ellucescet & aliorum error de facili emmendabitur: propositi igitur sympto. causæ, quædam se tenent ex parte contenti, quædam ex parte continentis quo ad contentum est materia, atq; hec duplex uaporosa & corpulenta, quarum uapor est causa immediata, minera autem uaporis mediata est: quæ tamen non uidetur præfocationem facere posse, nisi aliqua ex parte in uaporem attollatur, quicum suæ mineræ proportionem semper respondeat, ideo cognoscere oportet quæ nam sit illius minera, de qua loquens Gal. duplicem esse statuit, sanguinem mestruum & semen, quarum quælibet uel utraq; simul si preter consuetudinem intra corpus detenta fuerit, & in prauam au-

Q ram

cognitio causarum quæ sit utilis.

De causis præfoc. uariæ opin.

6. de loc. aff. 5.

6. de loc. aff. 5.

Causa præfoc. 2.

Causa ex parte contenti.

6. de loc. aff. 5.



## De Morbis Muliebribus

*Ratio prima* ram extenuetur, prefocationem ipsam causare poterit; cuius euentus probabile argumentum hoc erit. quod ex omnium medicorum consensu affectus iste ut plurimum uiduis accidit, & illis præcipue quæ probæ antea purgabantur, & uirorum concubitu gaudebant; ideo Gal. loco citatto, hystorjam refert de quadam uidua, quæ cum à consueto coitu abstinuisset, solitasq; purgationes haberet, nihilominus matricis prefocatione corripiebatur, quæ certè non aliunde quàm à retento semine fieri poterat;

*Historia.* Quod clarius ad huc eius curatio ostendere potest, quoniam ex calorificis medicamentis utero admotis & eiusdem pertractatione, & titillatione facta, crassiori & copiosiore semine excreto ex tali symptomate liberabatur.

*Ratio secunda.*

*Semen et sang. mest. quantitate & qualitate peccare.*

### CAP. XXXXIII.

*Semen quādo corpori est innoxium.* Sanguis menstruus & semen quamdiu debitam naturā conuenientem mensuram & qualitatem retinet, consuetisq; temporibus per conuenientia loca integræ expurgatur, tam diu etiam naturalis status integer & illesus in eodem corpore seruatur. Nam semen licet humor excrementicius sit, utilis tamen est, & præterea sui natura benignus, & uitali spiritu copiose refertus; qui in debita matrice susceptus, aptus est illi simile generare unde decius fuerat, Mestruus quoq; sanguis etiam si totius massæ sanguineæ excrementum habeatur, Neutrum tamen toti corpori officit, sed in non pregnantibus & non lactantibus tantum molestiam inferre solet; quod contingit quando præter terminos à natura constitutus, intra

cor-



pus maiora augmenta suscipit,quàm pro naturæ modo  
conuenit:si autem consuetis temporibus & secundum  
naturam utriq; humores euacuentur , tantum abest ut  
quicppiam mali corpori afferrant,ut eodem potius depu  
rato in meliorem conditionem deducant : ab ista autem  
euacuatione excluduntur pregnantes & lactantes , quia  
in prægnantibus secundum aliquam partem in alimentū  
ipsius fœtus degenerat, quod deinde post nutritionem  
superest , in membranis fœtui circumiacentibus recipi  
tur,& ad patiendi tempus citra aliquam noxam custodi  
tur;eumq; ussum habere uidetur,ut tempore partus an  
te fœtum effluere incipiat,& effluendo partes uteri lu  
bricat,& lubricando faciliorem exitum efficit: postquàm  
autem mulier peperit,hoc excrementi genus denuo gene  
ratur, jta tamen ut à propria mamillarum substantia in  
lac asiduo uertatur,ut ex illo tamquàm ex alimento jã  
æditus fœtus conseruetur , ob quam causam fit , ut in  
his mulieribus dictum sympt. minime contingat ; in  
in quibus igitur accidit , necessarium est alteram uel v  
tranq; materiam retineri,& pluribus rationibus à natu  
rali statu recedere: & primo in quantitate,ratione cuius  
in uasis pertingentibus ad utrum plenitudo oriatur .  
in substantia etiam, quia longiorj tempore intus detenta  
cralescit, & cralesccta obstructiones parit , & partas au  
get : Deniq; etiam in qualitatibus alteratur , primis in  
quàm & secundis manifestis & occultis: vt ex parte qua  
litatum manifestarum dicta materia in frigidiorē aurā  
extenuetur , ut superueniens perfrigeratio toti corpori  
clare ostendit ; merito autem occulte in perniciosam &  
ueneficam qualitatem degenerat , à qua nouas proprie  
tates & agendi uires, prioribusq; contrarias sibi ascisit,  
quo tempore non solum conseruandj indiuiduj,& propa  
gandę speciej potestatem omnem deponit,sed subiectum  
etiam sibi corpus male afficit,multisq; & diris symptoma

*In preg. &  
lacta, san  
guis me  
struus cur  
nihil no  
ceat.*

*Peccatū in  
quanti.*

*Peccatū in  
substantia.  
Peccatū in  
quali.*

Q 2 ti



## De Morbis Muliebribus

tibus excruciat : Dum autem à dictis materijs hec in corpore fiunt, non sub sensibili & propria earum specie contingunt, sed uaporis & spiritus formā primo induunt, qui substantiæ sue tenuitate mobilitatem acquirens, in omnes etiam corporis partes quàm citissime se diffundit, & accedente corruptione in agendo & corrumpendo ualde efficax euadit. Hoc ipsum clarius ostendit, enumerationum symptomatum generatio & generationis modus; quandoquidem sensim & longiorj tēpore non fiunt, sed confestim & quasi subito producuntur, quod minime contingeret nisi penderent à causa magnæ actiuitatis cuiusmodj est substantia spiritiosa, quæ quo tenuior fuerit tanto ad agendum erit promptior. Accedit quod partes principes & ab utero ualde distantes, in hoc symptomate quasi momento grauissime afficiuntur, quod ullo modo fieri potest, quandiu semen & sanguis menstruus, crassiorem & sensibilem substantiam retinet : Eo autem ordine illa emergere obseruamus, ut ab hoc uapore genitalia primum ligamentaq; & uasa ad uterum pertinentia nimia plenitudine obstruantur, ut pote illa in quibus materia non solum copiose recipitur, sed copiosius etiam retinetur. Hinc uterj conuulsio, & ad superiora uel latera contractio oritur: In qua repleta corpora quo magis in latum & profundum extenduntur, tanto magis in longitudine abbreviantur: Dum autem uterus ita contrahitur. duplicj modo contrahj solet, equaliter .s. & recte, uel inequaliter & obliq; , recte & æqualiter contrahitur, quando uincula & uasa ad uterum peruenientia æq; plena sunt, inequaliter autē & obliq; contrahuntur, si maior fuerit plenitudo in una quàm in altera parte, tunc enim maior conuulsio sequetur ex parte maiorjs plenitudinis quàm minorjs, & hoc est in causa quod per id tempus referrant obstetrices, uterum obseruare modo sursum re tractum, modo ad latera reclinatum, non tamen, quia in-

star

*Præfoc. fit à uapore .*  
*Ratio prima*

*Ratio secundā*

*3. ratio.*

*Ordo generis sympt.*  
*Obst. à copia .*

*Conuuls. à plen.*

*Uterum 2. conuelli.*



star animalis per corpus erret, sed in proprio loco semper existens plenitudinis causa contrahitur, ad cuius contractionem eius quoque cœraicem retrahere necesse est. Hec eadem materia quàm primum in frigiditatem & ueneficam auram eleuatur, anabibus etiam qualitatibus uteretur afficitur, quæ frigiditatem & deleteriam eius agendi uim moleste ferrens, non minus quàm ex dicta plenitudine, in originem suam contrahitur, mox in altum corporis distat qualitates magis deductæ, & partium principum, totiusque corporis anatomiam occupantes, potestatisque suæ insignia ubique figentes, numerosa, & lethalia accidentia inferunt. atque hec multorum generum, pro partium suscipientium diuersitate multitudinisque & perniciosæ qualitatis ratione, Ad cor enim peruenientes animi defectum & syncopim inducunt, pullandj ac spirandj actionem omnem e medio tollunt, si in spinalem medullam decubuerint, in subiectis partibus conuulsionem facient, si incœrebrum ascenderint, in ipsumque pari ratione egerint, non solum soporem melancholiam & aliud delirij genus causabunt, sed efficacius agentes, sensu motu omni; uitali calore corpus uniuersum destituent, ut hoc tempore miseræ mulieres à mortuis distingui ullo modo possint. Nec mirum alicui esse debet quod ex tam modica aura circa uterum primitus orta, deinde alijs partibus & toti communicata, tam multiplicia & lethalia sympt. nascentur: imprimis quia, nudis & manifestis tantum qualitatibus illa non operatur, sed occultis etiam & ueneficis, in quibus certè tanta est cum natura humana contrarietas & alterandi potestas, ut à corporea sensibili; molle soluta, & in spirituosam substantiam sublimata, eam agendi & corrumpendi uim aquirat, qua, in exigua etiam quantitate totum corpus quàm primum peruadere & in pessimum statum deducere ualeat: Quod Gal. aliorum uenenosorum animalium exemplo clare patefacit: quis.n. sibi

Conuul. à  
quali.

Obiectio.

6. de loc. aff.  
5.

## De Morbis Muliebribus.

sibi persuaderet quod ex insensibili materia, quæ ex phalangij & scorpionis ictu in corpus nostrum procedit tã dira & pessima symptomata quasi repente fieri possent; quis etiam putaret quod marina torpedo, tam insignem agendi uim habeat, ut solo tactu per qualitatũ uim sibi uecina alterare possit, & piscatoris baculum tangendo, illius quoq; manum stupifaciat: Hec & similia patefacere planè possunt, in corpore humano corruptionem quãdoq; oriri posse, quæ uiribus & qualitate ueneno omnino sit coequalis, sic in proposito malo, omnium medicorum consensu contingit. sed quispiam obiecere posset de hac materia quæ si tam perniciosa & uenefica est, quomodo in subiecto corpore tamdiu quæta delitescat, ut per longum temporis spacium ullam molestiã inferrat: Cui dicendum quod si quelibet materia præter naturam eadem haberet suæ digestionis tempora, si corpora pariter actionem dictæ materiæ suscipientia æq; disposita forent, nulla dubitandi occasio orta fuisset; quinimo uno & eodem tempore ubiq; ageret, & corpora etiam æq; paterentur; At quia digestionis tempora diuersa sunt, & corporis suscipientis multiformis dispositio, ideo nemini mirum esse debet, si in muliere præfocanda, materia huius symptomatis auctor, & si in corpore præfocanda, non tamen præfocacionem subito faciat, cum nec tam cito in ueneficam naturam degeneret, & malignum uaporem attollatur, sed intra corpus tacitæ ac diu delitescens digestionis & exaltationis suæ tempora expectat, quæ ut primum attigerit, subito et quasi momẽto Agendi potestatem quam occulte continebat, pallam manifestat, & subiectum sibi corpus alterando & corrumpendo magno patientis labore ac uitæ discrimine iugulat; in qua actione tam diu uersari solet, quam diu spiritus omnis uenificus à propriis mineris exhaustas consumptusque fuerit, Nec prius incipit mulierem denuo af-

*Obiectio:*

*Solutio.*

*Quando à  
presentia  
materiæ fit  
præfoc.*

*Quandiu  
præf. duret.*



affligere, nisi posteaquàm per nouam relictae materiae sublimationem, recentes & consimiles spiritus re-  
generati fuerint; Quem generationis modum clarius ad  
huc ostendit rabidus canis, in quo tanta humorum cor-  
ruptio fieri solet, ut solius eius sputi contactus, si corpus  
nostrum tetigerit, eandem rabiem efficere possit. Ea ta-  
men ratione ut illius uires, & alterandi proprietates non  
prius in corpore appareant, quàm exiguum illud sputum,  
& sputi qualitas suae digestionis tempora absoluerit, cor-  
poriq; parem affectionem communicauerit, quod sex me-  
sium spacio aliquando succedere solet; ante quod tem-  
pus nulla rabiei nota deprehenditur, Hoc igitur quàm  
primum contingit, imperium etiam supra corpus statim  
acquirat, & secundum propriam naturam alterando, sub-  
stantiam spirituum humorumq; massam quàm citissime  
immutat corrumpit, & citra ullam uitae speciem, corpus ra-  
bie infectum tandem interimit; Nec aliter fit de semine  
& sanguine mestruo aggregato & incorpore cohibito &  
corrupto, à quibus aura illa uenefica oritur, quae partem  
aliquam principalem pettens, consimilem sibi reddit, mox  
illius causa, secum etiam rapit corpus uniuersum: Cate-  
rum animaduertendum est. quod quamuis ex maligno  
hoc uapore, matricis praefocatio ceteraq; enarrata sym-  
ptoma nascentur, non tamen equalis & eadem semper erit  
agendi potestas, sed in magnitudine & uehementia diffe-  
rentia erit: quandoquidem ex corrupto semine, & in spi-  
ritum ellato, longe scœuora auidentia, quàm ex sanguine  
mestruo contingent. Quanto enim semen propriam ser-  
uans naturam, essentiae suae bonitate ac benignitate me-  
struum superat, tanto etiam ex superuenienti sibi corru-  
ptione, in maiorem & deteriore uenenositatem degenera-  
re uidetur, ut ab hoc magis quam ab illo scœuora & ma-  
gis lethalia symptomata producantur: Quod planè ille  
mulieres testari possunt, quae cum non sint uiduae, & con-

*Quanta sit  
corrup. in-  
sputo rabi-  
dicanis.*

*à semine ue-  
hem. symp.  
oriri quàm  
à mestr.*

*Ratio prima*

luc,



## De Morbis Muliebribus. 20

9. de loc. of-  
fe. cap. 5. luctas purgationes suppressas habent, etiam si pluribus  
accidentibus infestari possint, nunquam tamen spiratio-  
ne priuantur, nec syncopi laborare uise sunt, sed hec & si-  
milis seminis potius suppressionem sequuntur: Accedit  
reperiri quasdam uiduas, quæ licet pro consuetudine pur-  
gentur, nihilominus propositis symptomatibus corripiun-  
tur. Præfocatio igitur erit perfrigeratio uteri corporisq;  
totius dependens à uapore non solum frigido, sed etiam  
uenefico, ellato ex sanguine mestruo semine uel utrisq;  
simul; Et hec de causis quæ se tenent ex parte contenti di-  
cta sint. Reliquum est, ut de illis etiam agamus, quæ se  
tenent ex parte continentis, continens autem in hac affe-  
ctione est corpus ipsum, quod licet secundum partes om-  
nes affectum esse conspiciatur, non tamen eodem modo,  
sed, earum aliqua primario aliqua secundo leduntur.
2. ratio.
6. de loc.  
ast. 5. Quæ primario afficitur est ipse uterus secundum ligamē-  
ta & uasa ad ipsum pertingentia, deinde etiam secundum  
propriam sui substantiam & uasa, mox reliquum corpus  
consensum trahitur. Quis autem sit iste affectus Gal. de  
clarat, statuens esse obstructionem, consequenter dictum  
symptoma referri debere in morbum mal. compositio-  
nis, hoc est in uis obstrutis, & debitam latitudinem non  
seruantibus, fit autem hec obstructio non solum à copio-  
so semine & mestruo sanguine, uerum etiam ab eorun-  
dem crassitie & lentore, nec non etiam ex parte uasorum  
si contingat angustiora & densiora esse, siue talis angustia  
natiua fuerit, siue adscititia; Vnde merito copiarum repletio-  
nem faciētis in dictis uiculis & uasis uteri, oritur cōuulsio, &  
eiusdem in propriam originem contractio. idem dicatur  
si à crassitie & lentore obstructio fiat. Merito autem pra-  
uæ qualitatis idem uterus, non solum sursum uel ad late-  
ra trahitur, uerum etiam eadem communicata cæteris  
partibus corporis, iam enarrata symptomata producere  
consuevit: Sed hoc loco dubitare aliquis posset, si in præ-  
focatione
- De causis ex  
parte con-  
tinentis.
- Præfoc. fieri  
ab obstr. ut  
à morbo.
- Causæ ob-  
struct.
- Dubitatio.



focatione conuellit vterus, & conuulsio fiat non solum à repletionem, sed etiam ab innanitione, cur est quod altera causa pretermisa, de sola repletionem mentio habita fuit: Soluas quod quamuis conuulsio ab utraq; causa fieri possit, non tamē quelibet ab utraq; simul perpetuo fit, quod tum in aliis tum in matricis præfocatione contingit, in qua sola repletio locum habet, quod ostendit modus generationis & solutionis eius. Nam suffocatio matricis nunquā fit, citra seminis & sanguinis menstrui cohibitionem, Et eadem non nisi eorundem, uacuatione tollitur, uel saltim prauæ aurę dissipatione facta. Nec obstat hyp. auctoritas libro primo de morbis mulieribus ubi habet, vteri præfocationem fieri quando illius uenæ innanitæ sunt, ad quarum innanitionem, vteri exiccatio sequitur: quoniam præfocatio si debet in suū morbum referri, non nisi in eorum ligamentorum & uasorum obstructionem reduci poterit, quæ ad vterum per tingunt, quæ obstructio perpetuo producit à nimia sanguinis menstrui & seminis plenitudine lentore etiam & crassitie, ob quā uasorum repletionem fit, ut propria etiam ipsius uteri innaniantur, ut consueta humiditate priuatus vterus, secundum uniuersam sui substantiam exiccetur; Ad venas igitur proprias uteri illiusq; substantiam respiciens hyp. recte dixisse arbitror, quod in præfocatione uene uteri innaniantur & illius substantia exiccatur, At ratione talis innanitionis & exiccationis non fit præfocatio, sed potius propter aliorum uasorum extra uterum repletionem & obstructionem, huius enim causa, & tamquā à morbo in uia præfocatio oritur, ad quā deinde innanitio & exiccatio in propria vteri substantia & uasis eius consequitur: sed ratione huius nec conuulsio nec præfocatio fit, & hoc modo hyp. & Gal. intelligi debet, & hec de causis internis tum ex parte contenti & cōtinentis dicta sufficiant. Quo uerò ad cau-

6. aph. 39.

5. aph. primo.

Solutio.

Obligatio.

Solutio.

Causæ ext.

R las

## De Morbis Muliebribus

*Libro de  
morb. mu-  
lieb.*

*Definitio .*

fas externas attinet, de his pauca sunt dicenda, tum quia ab his nulla indicatio utilis oritur, tum etiam quia non sunt ueræ causæ sed potius occasiones, de his tamē loquitur Gal. & hyp. passim quæ potissimum capiuntur à mala uiuendi ratione. Qui error & si multiplex esse possit, ad id tamen quilibet dirigitur, ut aptus sit obstruere dicta uasa, semen præterea & mēstruum sanguinem copiosius generare, uel crassum & lentum producere: ne autē circa manifesta versari uidear. de his plura non dicam. Sed totum negotium, diffusā oratione hætenus explicatum, breui hoc compedio colligam. statuendo quod præfocatio non aliud est quam uteri totiusq; corporis perfrigeratio, prodiens ab aura frigidiori corrupta & uenefica, genita à semine & sanguine mēstruo copia & qualitate peccante, uinculaq; & uasa ad uterum pertingentia, obstruente, & consuetam uteri fluxionem remorante.

## De Differentiis . CAP. XXXXIIII.

*Differentia  
form.*

*Differentia  
materiales.*

EX proposita essentia facili negotio differentiarum omnes ellucescunt, formales inq; materiales & efficientes. Vt merito formalium præfocatio ratione qua perfrigeratio est, pro causarum magnitudine & uehementia, modo intensior modo remissior sit, & rursus modo longior modo breuior, quæ tamen specificæ non sunt, sed secundum magis & minus tantum distincte: Ex parte deinde loci affecti, is semper est uterus, qui afficitur primo secundum uincula & uasa, ad ipsum peruenientia, tum etiam secundum propriam substantiam & interna uasa, cæteræ autem omnes partes illius causa leduntur, quibus  
omnibus



omnibus totidem species correspondent ; Tandem merito causarum efficientium, totidem species nascentur ,  
 quotuplex est morbus & morbi causa , At morbus unus est, uidelicet in uijs obstructis, à quo etiam non nisi vnica species orietur, pro multiplici autem obstructionis causa, multiplicabitur specierum numerus; statutum autem fuit talem obstructionem fieri à semine uel sanguine mestruo uel utrisq; simul, & quodcunq; fuerit peccare potest, copia & qualitate, tum manifesta tum occulta, & si manifesta tum prima tum secunda, ut cum excedit secundum frigiditatem, uel lentorem & crassitiem ; si occulta, hec uenifica est, quæ solis gradibus sui diuisionem pati potest, hinc igitur plures species præfocationis orientur, & numero semper respondebunt iam propositis causis .

*Differentia à causa effec.*

*De Signis.*

*CAP. XXXXV.*

**S**ignorum autem quædam indicant præfocationem futuram & imminetentem, quædam præsentem. Am-  
 borum tractatio utilis futura est, cum ex cognitione imminetentis illi occurrere liceat, ac proinde mulierem à tanto Symptomate præseruare. Meritò autem præsentis, eandem debitis remediis expugnare poterimus. Imminetentem itaq; suffocationem cognoscemus, si in primis menstruum uel seminis consueta purgatio cohibita fuerit, ad quam consequitur totius corporis pigrizia, & crurum insueta imbecillitas, idq; ob materiæ aggregatæ copiam plenitudinem facientis, pallida facies euadet cum tristi quodam aspectum mentisq; torpore, Anhelitus difficilis, oculorum uertigo, & in uteri regione dolor, quæ & simi-

*Signa duplicia esse.*

*Signa imminetentis suffocationis.*

R 2 lia

## De Morbis Muliebribus

lia symptomata fiunt, quia collecta materia cum antea quiesceret, crudaq; esset, incipit digeri & per corpus moveri, & consequenter aliquas molestie notas illi inferre. Dum autem adest, & praesens est, proposita omnia symptomata euidentiora grauioraq; euadunt, ut sopor grauis & profundus fiat, mentis & sensuum omnium appressio cum uocis interceptione, & totius perfrigeratione os uteri clausum & durum euadit, per quam duritiem a praegnante muliere distinguitur. Accedit, quod in praefocatione matricis idem uterus una cum ceruice saepe conuellitur, & ob uasorum & uinculorum plenitudinem, ad superiora & latera retrahitur. manus praeterea affixas habent uentri & supra unilicium. An uero tale symptoma fiat ratione suppressi menstrui uel potius feminis, distinguemus in primis ex adstantium & patientis relatione, quia si menstrua fluxerint, & praefocatio occurrat, statendum erit, eam ex semine fieri, & praesertim si consuetum coitum dimiserit. Si contra menstrua fuerint suppressa & consueta uenus non fuerit dimissa, iudicandum potius erit, tale Symptoma fieri ratione menstruorum quam feminis. Si utraq; materia detenta fuerit, utriusq; etiam ratione fieri poterit, quod dum contingit Symptomata erunt plura diuturniora et uehementiora. At si talem relationem habere non poterimus, ad alia signa recurrendum erit, & in primis genera symptomatum & uehementiam perpendere debemus. Vbi igitur a semine suppressio facta erit, sequiora Symptomata conspicientur, quoniam spiratio erit ablata, pulsus ullus apparebit, Syncopis etiam hanc mulierem apprehendet. Deniq; sensus motusq; omnis abolitus erit, ut a mortua distingui non uideatur. Quae autem retenta menstrua sequuntur, mitiora erunt, quia spiratio erit exigua & difficilis, pulsus ualde imbecillis & rarus lypothymia potius quam syncopis, sensatio deniq; ac motio omnis maximè debilitata & deprauata

*Signa praesentia suffoc.*

*Hyp. lib. de morb. mul. gal. 6. de loc. aff. 5. Ani. in ca. proprio.*

*Signa ex semine.*

*Signa ex mestr.*

*Signa utriusq; materiae.*

*Ex sem. sup. uehem.*

*symp. fiut.*

*Ex mestr. sup. debiliora symp. fiut.*



prauata erit, nondum tamen abolita: præterea si contingat retentum semen copiosum non esse, strangulatio fiet citra uterj peruerfionem: At si plurimum & crassum fuerit æquè uasa replendo, ut menstruus sanguis, uterum etiã peruertet: præterea si ex titillatione affectarum partium semen enociatur, sanatioq; subsequatur euidentius indicabitur præfocatio ex semine: distinguetur autem præfocatio ab Apoplexia, Epilepsia que fiunt uicio cerebri & Syncope quæ fit leso corde, quoniam licet in sopore respiratione abolita, pulsu ablato, sensusq; & motus priuatione cum illis communionem habere uideatur, ab istis tamen adhuc distinguetur, Et primo ab Apoplexia cerebri uicio facta, per stertorem, qui in præfocatione matricis non sentitur. Ab Epilepsia uerò per spumam circa os, quæ fit ex angustia spirituum, & materie agitatione, ex oculorum etiam uersione, præterea in præfocatis uultus tumet & rubet, uenæ temporum & oculorum sunt inflatæ, in Apoplexia autem, Epilepsia & syncope pallent. præterea in Epilepsia quædam membra spasmodicantur & os contorquetur. Accedit, quod in præfocatis ab umbilico usq; ad muliebria dolor quidam sentitur, memoria etiam non amittitur, sed post paroxysmum, narrare mulier potest quæcūq; eo tempore acta sūt, lecus est de Apoplexia & Epilepsia ex parte cerebri: A lethargo uerò distinguitur per febrem, cæterum quia sæpe contingit præfocatam mulierem, uitali omni functione ita frustrari, ut à se ipsa mortua ullo modo distingui posse uideatur, præsertim cum ob refrigerationis intensiorem, calor imbecillis adeo reddi soleat, ut pulsatio respiratio sensus ac motus omnis ablati sæpe conspiciatur, magnoq; errore illam tamquam mortuam presbiteris aliquando commitimus; ideo ut procul ab omni mendacio sententiam nostram proferre ualeamus, cum Gal. imprimis tenuem lanæ floccum, uel plumam natibus præfocate ad mouendam curabimus, quæ

*Signa distinguunt præfocationem ab aliis affectibus*  
Ab appo.  
Ab opi.  
A sync.  
A leth.

*signa distinguunt uiuam à mortua.*

6. de loc. aff.  
5.

si

## De Morbis Muliebribus.

*Experim. 1.* si pulsum aliquem patietur, non leue uitæ argumentum  
*Experim. 2.* nobis erit: Ad cuius similitudinem, uirum quoq; aqua  
*Experim. 3.* plenum super uentriculi regionem alij imponunt, diligenter  
 etq; intuentur, si aqua illa quouis modo moueatur, tunc  
 enim uestigium aliquod uitæ in eadem superesse significabitur; & mihi semel in mea urbe occurrit nobilis matrona, quæ hoc symptomate correpta, astantium omnium  
 4. *Experim.* consensu mortua iudicabatur, cuius rei ut certior ego  
 quoq; fierem, speculum perpolitum accepi, oriq; & naris  
 eius apposui, quod cum aliquo modo infectum & obscuratum obseruassem, spe aliqua de illius uita concepta  
 astantibus omnibus statim significaui, in mortua muliere  
 aliqua adhuc me experiri uelle: Cumq; multa & uaria  
 fieri iussissem, tandem, summa omnium admiratione sensim  
 reuiuiscere cœpit. ut ad consuetas functiones tandem  
 reuersa etiam fuerit. Quod cum præter omnium opinionem  
 euenisset, Mulierem à mortuis reuocatam fuisse magno  
 gaudio & mei applausu clamabant omnes. Et detam  
 insperato scilicet tamen euentu, mutuo amplectebantur,  
 & toto corde mecum simul congratulabantur, Vbi autem  
 perfrigeratio usq; adeo intensa facta fuerit; internusq;  
 calor ita exiguus redditus, ut externa omnis respiratio  
 sublata sit, iam proposita experimenta ad uerum  
 iudicium deferendum nihil nobis amplius conferrent.  
 Sed tenuem lanæ flocum plumam & uirum aqua  
 Transp. & plenum immota manebunt, speculiq; nitor integer  
 uita insep- bitur, non propterea mulier ista necessario uita  
 rab. esse. destituta erit, quia etiam si omnis pulmonum motio,  
 qua respiratio fit auferratur, adhuc tamen interna caloris  
 transpiratioq; seruari potest, quæ non pectoris aut pulmonum  
 motu editur sed cordis potius, internarumq; arteriarum  
 latenti quadam motione efficitur, cuius solius gratia uita  
 seruari & superesse potest, quemadmodum pleraq; animalia  
 testari possunt, quæ tota hyeme frigida & immota

ta



ta in cauernis permanent ut omnibus citra ullam contro-  
uersiam mortua esse uideantur , quia tamen interna illa  
transpiratio cordis & arteriarum occultiori motu facta  
adhuc permanet, hinc fit ut æstate superueniente, inter-  
noq; calore ad exteriora denuo reuocato, ueluti à mor-  
tuis refurgant; Quod sanè illis euenire minime posset, si  
cum externa illa respiratione, interna quoq; caloris tran-  
spiratio sublata esset, cum à priuatione ad habitum re-  
gressum fieri posse, negent philosophi omnes; Tanta igitur  
est transpirationis caloris necessitas ad uitam, tantaq;  
horum duorum unio extat, ut quemadmodum uita sine  
transpiratione, ita nec transpiratio sine uita esse non po-  
test. Cæterum quia interna hec caloris transpiratio ullo  
sensu ulloq; signo à nobis distingui potest, ac proinde si  
mul etiam ignorare oportet, an præfocata mulier, uitali  
omni calore destituta sit, Quid nobis agendum erit , ne  
in hoc symptomate mortis æmulo, errorem committamus  
in magna; nostra infantia tamquam mortuam sepelien-  
dam admittamus? Consultius fore ego existimo, ut no-  
bis deficientibus certis signis, uitam à morte distinguen-  
tibus , familiaribus saltim mandemus imperemusq; , ne  
pro consuetudine huiuscemodi mulieres sepeliri  
permitant, sed propriæ domi longiori tem-  
pore illas detineant, per duos in-  
quam & tres dies, quo tem-  
pore si ullum uitæ uesti-  
gium apparuerit ,  
sed fœtorem  
potius  
emiserint, mortis certissimum  
argumentum omnibus es-  
se poterit .

*Transp. in-  
terna ullo  
signo cogno*

De

❧ *De Morbis Muliebribus.* ❧

*De Curatione .*

*CAP. XXXXVI.*

*Indic. omnes  
locum ha-  
bent .*

*Indic. curat.*

*Indic. pre-  
ser.*

*Indic. uita-  
lis .*

*Prognosti-  
cum .*

**C**irca partem practicam , quæ rationem & modum operandi respicit, in proposito Symptomate locum habebunt indicationes, curatoria, præseruatoriæ est uita-les, Curatoria capientur à materia plenitudinem faciente, quæ siue menstruum fuerit siue semen , cum & copia & qualitate agat, idè ex parte copię auxilium euacuans in dicabit, ex parte uerò qualitatis manifestæ, auxilium alte-rans in contrarium, sicut ratione occultæ Alexiterium ali-quod expostulabit. Meritò uerò materia, quę plenitudi-nem facere potest, siue in toto siue in parte fuerit, auxi-lium indicabit præseruatorium quemadmodum ratione continentium auxilium roborans insinuabitur. Ex parte deinde Symptomatis actu affligentis, cum illius causa uir-tus undiq; suppressa & oppressa sit, ut spiratio, pulsus & cæteræ facultatum functiones , indicabitur auxilium ui-tale . Quod symptoma generatim sumptum magnum ac uehemens est, cum illius causa omnes corporis actio-nes siue ad uitam siue ad sensum & motum attineant, de-bilitatæ, deprauatæ & sæpius etiam abolitæ esse possint , deterius tamen illud est, quod à cohibito corruptoq; se-mine fit, idè ex eo etiam seuiora & magis lethalia Sym-ptomata nascuntur, quàm ex sanguine menstruo. Adhuc deterius erit si diuturnum & confirmatum fuerit. si præ-terea instar comitalis per circuitus repetat. Si deniq; fre-quentiores & plurium generum accessiones habuerit , quod sanè genus symptomatum facilè potest eadem die, & intra paucas horas mulierem interimere, quapropter illius curatio quamprimum aggredienda est .

De



De materiis Auxiliorum.

CAP. XXXVII.

Sunt autem praesidiorum materiae in duplici differentiâ, aliquæ respiciunt imminens symptoma, alia præsens. Priores consultò prætermitam, quoniam illæ eadē prorsus convenire videntur, quæ in tractatione de suppressis menstruis propositæ fuere. Illud tantum adiciâ, quod respicit præfocationem à semine factam, in qua illa adhibenda sunt quæcunq; seminis generationem prohibere, vel saltem minuere possunt, siue hoc congrua ratione victus præstiterimus, siue medicamentis, in quo genere enumerantur semina agni casti, viticis, cannabis, ruta, radices nymphae folia lactucae, castoreum, diambra, diamoschus, ex quibus parari poterunt decocta pulveres, electuaria & similia: quibus accedunt pessaria, clysteria, fessiones, inunctiones, in pectine inguine & lumbis administrandæ: præterea usus veneris amplecti debet, præsertim si consuetudine fuerit, quod si id fieri vitæ conditioni ac generi non conveniat, cum iam dictis erit progrediendum. Si deinde nobis occurrat mulier, quæ actu hoc Symptomate detenta sit, studium nostrum erit, virtutem à materia copia ubiq; occupatam & malignitatem oppressam, excitare & reuocare, quod non aliter fieri poterit, quàm per remotionem peccantis nocentisq; materiae: quapropter cum in tali Symptomate plenitudo adsit à semine menstruoq; sanguine cohibito, & sympt. vehemens sit quamprimum per lectam malleoli uenam, uel scarificatas cucurbitulas euacuandus erit, neq; existimandum, in tali casu hoc genus auxilii à uirium imbecillitate ac syn copi prohiberi, ut pleriq; putant. Et ratio est quia ex gal. vires in tribus consistunt, in spiritibus carnoso ge-  
S nere

*Presidia esse duo.*

*Materia prohibentes generationē seminis.*

*Forma.*

*Cura præfoc. actu.*

*Misio sanguinis.*

*Improbatio aliorum.*

*xi. meth. 3.*

## De Morbis Muliebribus

*12. meth. 5:* nere & solidis partibus, in prefoc. vires languent ratione spirituum tantum, aliorum autem ratione sunt robuste, & huiusmodi vires non prohibent sang. mis. & ideo  
*4. de ratione uic. gal.* seccabat uenam in hoc sympt. in quo patiens ob mutescebat pulsus erat ablatu consequenter in ea prefoc. in qua actu synco. aderat quia hec virium imbecil. non causatur ex caloris resolutione & spirituum inanitione, sed potius ex suffocatione, à plenitudine prodeunte, cuius certè præsentia ut hoc Symptoma oritur, ita eiusdem absentia remouebitur, non lecus ac ignis, dum ex nimia lignorum copia extinctioni est proximus, per solam lignorum subtractionem, facile reuiuiscit: sic corpus plethoricum & athleticum ex hypoc. à nimia sanguinis copia suffocatum ex copiosa sanguinis euacuatione restituitur: ita profectò dum mulier ob dictam plenitudinem strangulationem patitur, præsentaneum remedium ei erit per uenę sectionem sanguinem copiosè detrahère: ita enim nimia illius corporis plenitudo inanitur, ex qua euacuatione tantum abest ut vires quippiam mali patiantur, ut potius illas oppressas & solita ventilatione carentes, denuo uiuificemus, & consuetam caloris transpirationem illi tribuimus: quapropter in tali casu non solum sanguis audacter mittendus erit, sed quamprimum id faciendum erit, quia ita indicat sanguinis præsentia actu vires ualide opprimentis. Quod etiā Hipp: in Aphor: tacitè monuisse uisus est, qui de habitu athletico loquens, consequenter de eo corpore in quo insignis est plenitudo, ratione cuius periculum imminet de uasorum disruptione, uel virtutis suffocatione, iubebat ut statim uena aperta, sanguis copiosè minueretur. Quod si faciendum est tempore quo copiosus sanguis nihil mali agit, sed præseruationis tantum, gratia, quantò magis idiplum quam citissimè præstandum erit, tempore quo uirtus ab illius copia suppressa suffocataq;

*Ratio prima*  
*Gal. 2. de diff. feb.*  
*Prima aph.*

*Tempus.*

*Prima. aph.*  
*3.*  
*Ratio. 2.*

*Ratio. 3.*



taq; fuerit, quemadmodum in strangulata muliere contingit; & Galenus pariter habet quod in magnis inflammationibus, uehementissimis febribus & maximis doloribus, nullum inuenit magis præsentaneum remedium, quàm sanguinem mittere usq; ad animi deliquium, sanguinem quidem mittit, quia sanguis sua copia plenitudinem facit, mittit in magna quantitate quia copiosè peccans, magnam efficit plenitudinem, ratione cuius morbi magni uehementia Symptomata fiunt: quare si ubi hæc imminet ob copiam sanguinis, negare nemo audet, quo minus pro præseruatione & curatione copiosa sanguinis missio non fiat, cur nos hæsitare debemus de eiusdem sanguinis missione facienda, in muliere præfocata dum illius causa & præsentia actu adsunt tam uehementia Symptomata: qualia etiam sunt in illis qui à nimia plenitudine actu uehementioribus symp. molestatur ut sunt febris ardētissime inflammationes & insignes dolores. Dico autem illius causa, quia si hæc non fierent à sanguine plenitudinem faciente, sed ab alio humore longè distante à natura sanguinis, nequaquam mittendus esset, sed purgante medicamento potius educendus. Ad quod Gal. & Auic: etiam respiciens, docuit quod in morbis, in quibus conuenit sanguinis missio, si aliquid prohiberet, à tali sanguinis euacuatione desistendum esse, ut in dolore uentriculi aliundè quàm à sanguine producto, non conueniat sanguinem mittere, etiam si ratione alterius mitteri sanguinis ratio haberetur, sed dolor prius sedandus est deinde sanguis mittendus. At in præfocata muliere omnia simul conspirare uidentur ad sanguinem euacuandum. Primò illius copia, ratione cuius oritur plenitudo, à plenitudine deinde suffocatio, secundò uires non prohibent, quia in hoc Symptomate non sunt resolutæ, sed à copia potius oppressæ: ætas quin etiam, quia tempore fluxionis menstruorum ætas est florens, quare cum o-

1. Aph. 27.

Prohibetia.

Gal. primo  
ad glauc.  
14.

S 2 mnia

## De Morbis Muliebribus

omnia indicent sanguinis missionem, & nihil prohibeat, ideo non solum sanguis mittendus erit, sed etiam tempore quo suffocatio est presens, & quamprimum hoc agendum, priusquam virtus suffocetur. Circa locum autem, quantitatem & modum idem observandum quod in suppre. mest. dictum fuit. Eadem pariter ratio habenda erit de cucurbi. scarific. quibus uti consuevimus tamquam vi chariis sectionis uenarum, in quarum administratione ille distinctiones adhibende erunt, quæ in suppressis mestruiis diæ fuerunt. Post sanguinis missionem ad frictiones deveniendum erit, quæ pariter in extremis partibus tibiis inquam & soleis faciendæ erunt, & ualidæ conueniunt, quales sunt quæ asperioribus linteolis fieri solent, imò etiam cum nitro sale Synapi & aceto permixtis, ut partibus calefactis & ita ualenter perfricatis grauata sopitaq; uirtus excitetur, & à centro ad circumferentiam euocetur. In eundem usum uti etiam poterimus ualidis ligaturis & cucurbitulis cum magna flamma eisdem partibus appositis. Omitto magnas uociferationes & alia quæ possunt uirtutem oppressam ex alto reuocare.

*Quantitas  
locus.  
Modus mittendi sang.*

*Frictiones  
locus.  
Modus.*

*Ligature.  
Vocifera*

## De Pharmacia. CAP. XLVIII.

**I**N quacunq; præfocatione matricis, siue à semine siue à mestruiis fiat, illis perpetuò utendum, quæ utero ad mota non solum odorata sint, sed uim etiam, habeant ex tenuandi crassos humores, densitatemq; & duritiem distarum partium laxandi, & præsertim actu Syncope molestante; quo tempore suffitus utero fieri poterunt, ex odoratis, calcfacientibusq; moderate, ut si ex Styrace, ligno Aloe, cinamomo, muscho, & similibus parentur, ut si acceperimus

*1. ad Glauco.  
Presidia.  
Suffitus.*

*3. Aphor.  
28.*



teperimus gal. mosch. 3 i: musci scrup. 5. ol. de spic. un-  
guent drag. ii. m. Illinationes etiam pubi ac inunctiones  
lumbis adhiberi poterunt cum calefacientibus, flatus di-  
scutientibus, & laxantibus, cum oleo liliorum alb: cum a-  
romatibus, oleo rutaceo, nardino, irino, de spica & simi-  
libus; obstetrix etiam inunctos digitos intromittat usq; ad  
os uteri, imò leniter ac diu eas partes pertractare pote-  
rit, uirtutem prouocando, & titillationem faciendo, ut se-  
men excernatur, præsertim si suffocatio à suppressio semi-  
ne orta fuerit, pessaria etiam ex eisdem parentur mate-  
riis, de quibus in sermone de suppressis mensuris men-  
tio est habita, hoc eodem tempore naribus illa adhibean-  
tur quæ tetrum habent odorem, à tali enim vapore ute-  
rus quasi perterritus deorsum facilius fertur & ad odora-  
ta illi supposita reuertitur, neq; obstat Syncopis, quæ hoc  
tempore urget, quoniam non est ex eo genere, ut odora-  
ta expostulet, Hec enim spiritum animale primo com-  
mouent & quodammodo impellunt, qui tali ac tanto fœ-  
tore quasi proteritis facultatem motiuam cœrebrî simul  
etiam pulsant, quæ pariter eiusdem tetri odoris prauitate  
irritata, propriam arcem deserit, & cum spiritu animali  
in cor tamquam corporis vniuersi centrum se recipit, ubi  
uitalem spiritum compressum & ueluti suffocatum exci-  
tat, & auget, qua ratione expulsi fac. roborata, matri-  
cis assensum omni conatu deorsum deponit, & expulsis  
ac superatis corruptis uaporibus quibus uterus obsidetur,  
organa uitalium spirituum depurando, patientiora red-  
dit, pristinumq; & consuetum motum, citra impedimen-  
tum eiusdem denuo tribuit, & à præfocatione mulierem  
liberat: cuiusmodi ea est, quæ à spirituum resolutione &  
à corde primo affecto dependet, quorum restauratio bo-  
nis odoribus & alimentis fit, à malis autem magis cor-  
rumpuntur, quia hæc Syncopis, quæ præfocationem le-  
quitur, à spirituum potius suffocatione dependet uterò  
primo

*Titillatio.*

*Pessaria.*

*Suffumigia.*

*Obiectio.*

*Solutio.*

## De Morbis Muliebribus.

primo leſo proinde rationibus omnibus excitandi erunt  
 ſpiritus à centroq; ad circumferentiam euocandi, quod  
 fit naribus admouendo odores tetros, ſubiectis uerò par-  
 tibus bonos & fragrantès, quapropter hoc tempore ſuf-  
 fumigium parari poterit ex elichnio ſulphureo accenſo,  
 ex caſtoreo aſſa foetida galbano, ſagapeno & ſimilibus, na-  
 ribus appoſitis: ex eiſdem in acerrimo aceto prius tritis  
 nares illiniri poterunt. Idem præſtent pix liquida, bitu-  
 men, ruta, allium, capæ ſi ex his odoramenta ſiant, hec  
 enim ſpiritum animale comouent & impellunt, qui tan-  
 to foetore excitatus & impuſus per neruos ad cœre-  
 brum primo aſcendit & fac. motiuam pulſat, quæ tali  
 foetore irritata ad cor cum ſpiritu animali recipitur, ubi  
 uirtus omnis unita magno conatu in corruptos uapo-  
 res agit. Inter cetera autem quod omnium maximè  
 ſolet mulieres præfocatas quaſi momento reuocare, eſt  
 euaporatio facta ad nares ex puluere uerrucarum quæ ti-  
 biis equorum adnaſcuntur, quæ ſi in calente furno exic-  
 centur, & in puluerem redigantur & naribus ſuſſumigium  
 fiat, tanquam præſentaneo remedio & magna aſtantium  
 admiratione ſolent mulieres quaſi à mortuis reuocari.  
 Sternutationes etiam hoc ipſo tempore faciendæ erunt,  
 inſuſſando intra nares puluerem piperis, ſinapis & ſimi-  
 lium. Hoc eodem tempore prætermittenda non erunt  
 ſuppoſitoria & illa acriora, præſertim ſi alius etiam ſup-  
 preſſa fuerit, quæ parari poterunt ex hiera, ſale gemma  
 cumino, ruta & ſimilibus melle permixtis. Vt ſi accepe-  
 rimus Hieræ etiam compoſitæ ex coloquinthide ſcrup. ij.  
 ciminj ſcrup. i. ſalis gemmæ drag. s. Mellis q. ſ. miſce &  
 fiat ſuppoſitorium, & in aliquo ex ſupra dictis oleis prius  
 peruncto & filo appenſo imponatur, Reuocata muliere,  
 ad illas auxiliorum materias deueniendum erit, quæ futu-  
 ram præfocationem reſpiciunt, de quibus in præſentia ni-  
 hil dicendum occurrit, cum ea omninò conueniant, quæ  
 propo-

*Suffumig.*  
*pronaribus*  
*illinitio.*  
*9. de com-*  
*poſ. med.*

*Singulare re-*  
*medium.*

*Sternutamen-*  
*ta:*  
*Suppoſit.*

*Forma.*



proposita fuere in curatione suppressionis menstruorum. Illud tantum adiciam, quod assiduus usus castorei ad pondus Drach: unius singulo die exhibiti cum decocto Artemisiæ matricariæ mulsæ aut etiam uino plurimum conducit, ut longo illius usu non pauca mulieres à tanto Symptomate in posterum præseruata fuerint. *Præseruatiua.*

*De Profluvio Mensum.*  
*CAP. XLVIII.*

**Q**uia cōtraria iuxta se posita magis ellucescunt, ideo post tractationem suppressorum menstruum, doctri- næ ordo requirere uidetur, ut de eorundem profluvio agamus. Intelligo autem per profluvium non cuiuscunq; materiæ, sed sanguinæ & menstrualis, intempestivè factæ & cum mulieris incommodo: hac enim ratione profluvium, de quo hic sermo habetur, suppressioni erit oppositum, ut hinc excludendum sit aliud quodq; genus immodicæ fluxionis, siue seminis fuerit, ut in gonorrhœa contingit, siue alterius humoris à sanguine distincti, de quibus fluxionum generibus suo loco tractabimus. Interimq; ad essentiam huius Symptomatis explicandam accedo, cuius forma eiusdem est generis cum priori Symptomate: quoniam Symptoma est in exeunte mutato, ab illo tamen distinguitur, quia in hoc exit quod retineri deberet, in illo autem retinetur quod exire deberet: quod enim exit sanguis est, qui in maiori copia effluit quàm pro naturæ modo conveniat, & longiori etiam tempore fluxio illa perdurat, & proinde est illud Symptoma quod fit cum læsione facultatis, ad differentiâ fluxus naturalis, qui nec copiam nec temporis debitam mensuram excedit, sed excrementis certo tempore coaceruat.

*Nomen.*

*Essentia.*

3. de sympt.  
caus. cap.  
4. lib. De  
sympt. diff.  
ult.

## De Morbis Muliebribus.

*Materia exiens.*

*3. de causis  
symp. c. 26.*

*Profluuium  
mest. 2.*

*5. Aph. 36.  
6. de loc. aff.  
5.*

*Locus affe-  
ctus.*

uatis undiq; respondet, & statutis temporibus cum iuua-  
mento effluit. Ex parte exeuntis materiæ quæ sanguis  
est, seiungitur etiam à quocunq; alio fluxu in quo exit  
alia materia à sanguine distincta, qualis esse potest pitui-  
ta uel altera bilis, à quibus materiebus alterum genus flu-  
xus oritur, quod muliebri profluuium est, dependens à  
materia, à sanguine contradistincta, cuiusmodi est mate-  
ria seminalis, à qua nascitur gonorrhoea & pituita uel bi-  
lis à quibus prodit profluuium muliebri & uteri. Qua-  
propter profluuium mensium est exiens mutatum non  
solum immoderatum, sed etiam sanguinolentum, ad dif-  
ferentiam aliarum materierum, non tamen toto genere  
est præter naturam, sed multitudine potius & quantitate,  
ad differentiam aliarum fluxionum sanguinearum, quæ in  
mulieribus fieri possunt, & toto genere præter naturam  
sunt, quia modum non seruant nec in copia, qualitate,  
loco aut tempore, sed omnibus rationibus præter natu-  
ram sunt: cæterum talis sanguis exiens esse potest imper-  
mixtus & simplex, & alteri materiæ coniunctus. Si sim-  
plex fuerit, ut solus menstruus sanguis seorsum ab alte-  
rius humoris permixtione effluat, orietur profluuium mē-  
sium exquisitum. Si autem alteri materiæ permisceatur,  
uel sanguis menstruus humorem sibi permixtum supera-  
bit, uel ab illo superabitur. Si primum oritur profluuium  
mensium nothum, & uocari solet menses decolores, quia  
non seruant unicum & consuetum colorem, sicut in exqui-  
sito fit, sed uarium pro materiæ permixtæ uarietate. Si  
secundum fuerit, oritur aliud genus, quod uocatur pro-  
fluuium muliebri vteri nothum, denominationem ac-  
cipiens à prædominante humore permixto. Quodcunq;  
autem fuerit hoc profluuium siue exquisitum siue nothū,  
cum Symptoma fit, necessarium est, ut alicuius subiecti  
Symptoma dicatur, quod esse potest totum corpus uel  
pars eius determinata: quamuis autem huius ratione &  
totum



totum & pars lædatur, quia tamen hic sermo habetur de profluio mensium, quod fit per partem corporis determinatam, nempe per uterum, ad differentiam fluxionis factæ per alias partes, idè statuendum est, affectum locum esse ipsum uterum, non secus ac immoderatus fluxus sanguinis per hæmorrhoides habet pro sede affecta uenas hæmorrhoidales, & fluxus sanguinis narium, uenas eiusdem partis determinatæ, per quas sanguis iste effluit, quamuis totum corpus simul etiam afficiatur, si contingat copiosius euacuari. Dum autem uterus in hoc profluio afficitur, primariò & secundario affici potest. Primò læditur si hæc fluxio aliunde non dependeat, quàm ab ipso utero læso, sicut contingere solet ex difficili partu, uel etiam coitu uiolenter indecenterq; facto. Secundariò autem afficitur, quando alterius causæ talem fluxionem paritur, quod dum fit, dupliciter contingere potest, ratione totius uel partis determinatæ: totius quidem ratione, ut in febre contingit, partis verò, ut si consuetæ aliqua euacuatio cohibita fuerit, siue sanguinis fuerit siue alterius humoris.

*Uterus ledi potest. 2.*

*De causis efficientibus.*

*CAP. XXXXX.*

**S**anguis per uterum immoderatè fluens, ratione quæ Symptoma est, debet in suas causas & morbum referri, sine quorum cognitione essentia ipsius ignoratur, & simul etiam recta curandi ratio nescitur. Itaq; tùm cognitionis tùm curationis gratia, de causis dictæ fluxionis agendum erit, de producentibus inquam & fouentibus, internis & externis, proximis & remotis, & de illis potissimum, quæ sunt ex usu artis, quæ iuantia auxilia indi-

*Quæ cause inueniende sint.*

T cant.



## De Morbis Muliebribus

*Causæ inter-  
næ .*

5. *Aph.* 57.  
3. *de sympt.*  
*causis* 4.  
*lib. de diff.*  
*sympt. ulti-*  
*mo .*

*De causis a-  
pertionis .*

*Internæ cau-  
sæ apertio-  
nis .*

*Gal.* 5. *aph.*

*Causæ media-  
tæ .*

cant. Ab internis itaq; & proximioribus incipiam, quæ non aliunde erunt sumendæ, quàm ab affectis uenis & vasis, in quibus effluens materia contineri deberet, & à quibus, & per quas præter naturam mota profluit. Exit igitur sanguis ex uenis triplici potissimum de causa. Primo quia dictorum uasorum orificia aperiuntur, cum clausa esse deberent, & præsertim maiora, & tunc per Anastomosis affici dicuntur, ob quam causam sanguis & copiosè & confertim fluit, vel quia eorundem uasorum tunica & oscula nimis rarefiant, ut tenuior pars sanguinis sensibilibiter exeant, sensimq; resudet, tuncq; vasa affici dicuntur per Diapentesis. Tertio, quia eadem uasa solutam unitatem patiuntur, ut cum à difficili partu disrumpuntur, ab acriori materia corroduntur vel aliis externis causis scinduntur & punguntur. Quocunq; autem modo sanguis exierit, dicta uasa per diæresin affecta esse dicuntur, nec ob alias causas, præter enumeratas fluxio ista uenis affectis fieri potest. Cæterum quia nulla ex propositis causis immediatis ex usu artis est, cum ab illis iuuans auxilium non indicetur, ideo in illis non quiescendum, sed illæ causæ adhuc inquirende erunt, per quarum ablationem hic fluxus sanetur. Sunt autem istæ quæcunq; dicta uasa afficiunt secundum triplicem enumeratum modum, aperiendo scilicet, rarefaciendo & unitatem soluendo Venarum igitur orificia aperiri possunt à causis tum internis tum externis. Si internæ fuerint, esse possunt immediata & mediata. Interna causa & immediata apertio nis, esse potest humidior intemperies uasorum, à quæ eorum ora laxari aperiiriq; solent, uel est sanguis copia redundans, qui si ad uteri uenas cum impetu moueatur, facillè potest earum orificia aperire ac proinde fluere. Cui si accedat eiusdem caliditas & mordacitas, citius adhuc expultricem stimulo fluere poterit. Causæ uero mediata erunt quæcunq; concurrunt ad generationem sanguinis



sanguinis copiosi, quales sunt totius temperatura calida & humida, corporis habitus sanguineus, ætas iuuenilis, & huiusmodi. Si autem apertionis causæ externæ fuerint, esse pariter poterunt immediatæ & mediatæ. Causa immediata cum Auic: erit ulus balnei calefacientis & aperientis uel fomenta, uel alterius medicamenti aperientis administratio; quemadmodum est hiera, quæ maximè sollet uenas aperire, uel alia medicamenta quæ easdem laxare possunt. Si autem causæ externæ mediataq; fuerint, esse possunt necessariò & non necessariò occurrentes. Quæ necessariò occurrunt, capientur ab uniuerfa uictus ratione aperiente, & copiosum sanguinem generante. Ita concurret aer calidior, uictus copiosior & boni succi & cætera huiusmodi. Si autem externæ causæ necessariò non occurrant, capiendæ erunt à medicamentis calidis & aperientibus, siue intus siue extra fuerint administrata, & si intus siue soluentia fuerint siue alterantia siue aperientia. Et si extra siue balnea extiterint, frictions, lotiones & huiusmodi. Si deinde profluuium ut Symptoma in raritatem potius tunicarum referatur, tanquam in causam immediatam, raritas ista produci pariter potest à causis internis & externis, & utrisq; mediatis & immediatis. Causæ internæ & mediata raritatis erunt, sanguis ipse, qualitate peccans, hoc est, in caliditate & tenuitate, cuius modi est sanguis biliosus, aquosus & serosus: his enim ob propriæ substantiæ tenuitatem per uenarum tunicas & orificia facilè permeare & resudare potest, præsertim si hæc sanguinis tenuitas fuerit cum caliditate coniuncta, ratione cuius dictæ tunica rarefcunt, consequenter paratiores fiunt, ut tenuior sanguis per illas penetret atq; resudet. Causæ uerò internæ sed mediata sunt, quæcunq; hanc sanguinis tenuitatem adiuuare possunt, quemadmodum est totius ac partium temperatura calidior, ætas iuuenilis, corporis habitus gracilior & huiusmodi. Si uerò

Causæ externæ.

Causæ immediate.

Causæ mediatæ.

De causis raritatis.

Causæ internæ immediate.

Causæ mediatæ.

Causæ externæ.

T 2 causæ



## De Morbis Muliebribus

causæ istæ externæ mediatae fuerint & necessario occurrant, & desumentur à sex rebus non naturalibus calefacientibus & attenuantibus sanguinem. Si necessario non occurrent capientur à medicamentis, in quibus sit uis aperiendi laxandi, humoresq; fundendi. Si tandem immoderatum hoc profluvium per diæresin potius & solutam unitatem fiat, solui unitas poterit à causis pariter internis & externis incidentibus, pungentibus, frangentibus, ulcerantibus, exedentibus & huiusmodi, ea tamen ratione, ut si locum habeant causæ incidentes & pungentes, semper externæ sint. Si causæ frangentes internæ & externæ esse possunt, ut merito internarum, sanguis copiosior concurrat, & præsertim si cum multis flatibus fuerit coniunctus, hi enim ui sua distendendo continentia disrumpere possunt, non secus ac in musto recenter facto contingere experimur, à cuius copiosis flatibus & spiritibus liberiores exitum non habentibus, uas disrumpi solet. A pari uteri uasa nimio sanguine repleta, & spirituum copia referta, tantam distensionem pati possunt, ut de facili etiam disrumpantur. Præterea eadem uasa à foetu etiam ipso disrumpi solent, præsertim ubi contigerit, uiolentis inordinatisq; motionibus agitari. Quod etiam in difficili partu fieri consuevit. Si autem ab externis potius causis eadem uasa frangantur, locum habebunt casus ab alto, magni ponderis gestatio, uehemens clamor & huiusmodi. Si autem immoderatus hic fluxus fiat propter causas erodentes, talis erosio & ipsa fieri poterit ab internis externisq; causis, mediatis & immediatis. Internæ causæ erunt humor qualitate peccans, qualis est acris, salsus & mordax, siue talis humor à calidiori totius temperatura aut partis, genitus fuerit, siue etiam ex superuenienti putredine humores acriores euadant, atq; tunc præter erosionem febres etiam accedunt, ut pluribus causis ad erosionem concurrentibus, non solum in  
utero

*Causæ dieresis.*

*Causæ internæ.*

*Causæ externæ.*

*Causæ erosionis.*

*Causæ internæ.*



utero ulcera fiant , sed in caneros etiam sepe degenerant  
cuius erosionis causæ mediatæ erunt quæcunq; concur-  
runt ad sanguinem acriorem reddendum, cuiusmodi sunt  
totius ac partium calidior intemperies , ætas iuuenilis, &  
similia. Si ab externis potius causis erosio fiat, possunt ne-  
cessario & necessario non occurrere. Quæ necessario oc-  
currunt, sunt aer calidior , cibus & potus & uitæ indu-  
stria ei proportionem correspondentia . Si necessario non  
occurrant, erunt medicamenta calefacientia siue hæc per  
os accipiantur, ut Aromata, siue extra utero admouean-  
tur, ut acriora pessaria. Atq; hæc de causa formali, ma-  
teriali & efficiente immoderati fluxus menstruorum di-  
cta sufficiant: quæ omnia longiori oratione hætenus ex-  
plicata breui hac definitione contineri poterunt, dicendo:  
Quod profluuium menstruorum immoderatum est fluxus  
sanguinis uteri præter naturam prodiens à uasis affectis,  
per anastomosin, diapentestin & diæresin .

*Causa media  
ta .*

*Causa exter-  
na .*

*Definitio.*

*De differentiis .*  
*CAP. XXXXI.*

**E**X cuius definitionis particulis essentiam propositi  
affectus constituentibus, facile colligi possunt illius  
differentiæ, quarum aliquæ à forma, quædam à materia,  
plures à causis efficientibus capiuntur. Merito formæ non  
oriuntur ueræ & legitimæ species, sed illæ solum, quæ se-  
cundum magis & minus distinguuntur, pro ut dicere pos-  
sumus immoderatum hoc profluuium, aliud esse copio-  
sum, aliud minus copiosum , & utrumq; rursus conti-  
nuum esse uel intermittens . Merito autem materiæ seu  
Toci affecti cum is uteris sit, dicere possumus, tale pro-  
fluuium duplex adhuc esse, prout in illo uterus afficitur  
uel pri-

*Differentia.*

*Differentia  
formales :*

*Materiales.*

## De Morbis Muliebribus.

*Gal. 5. aph. 57.* uel primario uel secundo : & si secundo uel totius ratione, uel partis determinate, si totum concurat ob malum corporis habitum fiet, cuius corpus totum aggrauatur sanguine, ipsum ad uenas uteri expellendo siue hec expulsio à copia grauante fiat ut in muliere contingit cui mēstrua aīa retenta fuerint, siue etiam id ipsum contingat ex totius trāsmittentis robore & suscipientis uteri inbecillitate, ut in ceteris aliis fluxionibus euenire consuevit: Si autem partis causa fluxio fiat, pro partium diuersitate, totidem adhuc differentiæ nascentur. Tandem si consideremus causas effectrices, totidem nascentur differentiæ, quod fuere causæ enumeratæ, siue istæ internæ fuerint siue externæ, mediata & immediata, ex artis usu uel ratione contemplabiles, ut uerbi gratia, si dixerimus, tale profluuium triplex inprimis esse, pro triplici causa immediata ipsum producente, ut aliud sit ob apertionem orificiorum uenarum, aliud ob raritatem tunicarū, aliud ob solutam unitatem. Quot deinde fuere propositæ causæ dictarum differentiarum, totidem etiam species illis correspondebunt.

### De Signis.

#### CAP. XXXXII.

**Q**uia cognitio essentię propositi Symptomatis ad curationem ordinantur, ea autem unica non sit, sed pro causarum ac specierum diuersitate multiplex habeatur, ideo ut procul ab omni errore & citra omnem confusionem singulis speciebus sua peculiaris curatione adhiberi possit, necessarium est singularum specierum non à priori tantum notitiam habuisse uerum etiam à posteriori. Quapropter de signis agendum erit. Hac autem



autem in duplici sunt differentia, alia respiciunt profluuium hoc in genere, quedam ad enumeratas species diriguntur, generatim hoc profluuium cognoscimus, non solum ex relatione patientis, uerum etiam ex nobismet ipsis, qui colorem quandam foedum in toto corpore obseruabimus, pedes intumescere incipiunt, uentriculus conlucta appetentia & coctione laedetur, unde & robur totius corporis debilitabitur. Distinguemus autem tale profluuium immoderatum à profluuiio muliebri, signo in primis accepto ab exeunte materia, quæ in mensium profluuiio sanguinolenta & copiosa erit: in aliis uero profluuiis nec sanguinea nec copiosa effluet: præterea materia ista, ratione qua sanguinea, solet etiam extra uenas grumescere: at in profluuiio uteri uel muliebri exiens materia cum à sanguine diuersa sit, non grumescet, Dum autem sanguis fluit, cum fluere possit in debita quantitate, & consueto tempore, ut in fluxu menstruorum secundum naturam factum contingit, & immoderate ac quocumque tempore, ut in fluxu Symptomatico, de quo hic sermo habetur, ideo ut sciamus, cui fluxui occurrendum sit, utrumque distinguere oportebit. Distinguemus autem, accepto signo à iuuamento & nocumento ipsorum: nam ex fluxu omnino & secundum naturam factum, corpus totum ab omni sorde emundatur, & iuuamentum percipit: ex immoderato uero & præter naturam detrimentum accipiet, quoniam debilitabitur, & emaciabitur: præterea fluxus secundum naturam statutis temporibus fit, & determinato tempore durat: qui autem est præter naturam, nec constitutum habet suæ fluxionis tempus, uel si consueto tempore inceperit, non tamen pro more terminabitur sed in longius protrahetur: quod signum non est perpetuæ ueritatis, fieri enim potest, hoc profluuium diu perdurare, quam pro naturæ modo confluuerat, naturale tamen & laudabile esse, ad sanitatemque tendere: distin-

*Signa sunt, in dup. differ.*

*Signa disting. à proflu. muli.*

*6. de loc. aff.*

*4. 2. de morbis mul.*

*Signa dist. profluuii præter naturam à naturali.*

*Primum signum.*

*Secundum signum.*



## De Morbis Muliebribus. 20

*Signa di-  
sting. pro-  
fluuium cri-  
ticum à  
symp.*

*Primū sig.*

*Secundū sig.*

*3. sig.*

*Epilogus.*

*Signa differ.*

*Signa forma-  
lium differ.*

distinguemus autem profluuium diuturnum criticum à Symptomatico, si ad duo respexerimus. Primò ad noxam & iuuamentum, quod ex tali fluxu oritur. Secundò mulierem interrogare oportebit, an consuetam purgationem habuerit uel non: quare si profluuium diuturnum fuerit, & ex eo mulier peius habeat, fueritq; antea assueta debitas purgationes habere, statuendum erit, esse Symptomaticum. At si iuuamentum perceperit, si etiam per duos uel tres menses consueta purgatio suppressa extiterit, iudicandum erit hoc profluuium criticum & bonum esse: nam in tam longa mensium cohibitione copiosior materia aggregata longiori tempore eget, ut tota expurgetur, præsertim si in otio illa uixerit, & liberaliori uictu usa fuerit. A pari illud profluuium, quod à partu efficitur, copiosior materia effluit, & pluribus diebus perdurare solet, erit tamen profluuium laudabile: quare in huiusmodi naturalibus euacuationibus non quantitas aut qualitas & genus substantiæ æstimanda erunt, Sed potius si tempestiuè uel intempestiuè cum iuuamento aut nocumento fiant. Præterea cognoscemus diuturnum profluuium esse Symptomaticum ex corporis habitu, quod ex tali fluxu in malum habitum degenerat, ut cum carnosæ esset mulier, macilenta & gracilior euadat, cum floridi esset coloris, pallida redditur, totisq; habitus corporis cæticus sit, pedes intumescunt, totum corpus perfrigeratur, & diu perseverante, hydrops etiam succedit. His ergò & similibus signis cognoscemus profluuium mensium non solum in genere, uerùm etiam prout distinguitur à profluuiio uteri & muliebri, & præterea etiam, prout in proprio genere diuturnum profluuium Criticum se iungitur à Symptomatico, cuius deinde differentias, formales inquam, materiales & efficientes ita distinguemus. Inprimis quo ad formales cum hoc profluuium modo copiosius sit, modò minus, modò continuum, modò intermit-



termittens, ex sola relatione mulieris patientis cognoscemus. Ex parte materiæ dicimus utrum in quocunq; profluuium modò primario modò secundario affici, distinguemus quia si uterus primò afficitur, tunc reliquum totum corpus benè habebit: præterea præcesit partus difficilior uel uiolentus, & indecens coitus: At si hæc non fuerint, statuendum erit, utrum secundario affici, atq; tunc uel totius causa uel partis determinatæ, distinguemus recurrentes ad signa totius ac partis læsionem indicantia. Deniq; ea signa accedunt quæ efficientes causas respiciunt, quæ cum internæ & externæ esse possint, cognoscemus externas causas locum habere, si errores commissi fuerint in uictus ratione uel in aliis, quæ extra nobis necessario non occurrunt. Si præterea ante commissos errores, mulier naturalem statum seruabat, mox uerò in profluuium lapsa fuerit. At his non præcedentibus, Symptoma hoc in internas potius causas referendum erit, quæ cum esse possint apertio orificiorum uenarum, eorundem rarefactio & soluta unitas, cognoscemus inprimis fieri ex apertione orificiorum, ex plenitudine sanguinis, ex ipsius copia exeunte, & ex modo exeundi: quoniam exibat cum impetu & confertim, qui sanguis erit laudabilis, quoniam copia potissimum peccat, & ideò etiam sine dolore exibat. Quibus accedunt temperatura calida & humida, corporis habitus plethoricus, ætas iuuenilis, & prægressa uictus ratio. Si autem hoc profluuium fiat per diapentestin & raritatem tunicarum, conspicuum erit ex substantia sanguinis exeuntis tenuioris & aquosioris, ratione cuius nec facilè grumescet: præterea non exibat in tam magna copia, sicut fiebat ex apertione uenarum, à plenitudine prodeunte: quia in hoc profluuium sanguis qualitate potius quàm copia peccat. Modus etiam exeundi spectandus erit, quia confertim & cum impetu non exibat, sed sensim, diutius tamen perdurabit, quibus ad-

*Signa materialium.*

*Signa causarum effic.*

*Signa apertionis.*

*Signa diapend.*

V de tem-



## De Morbis Muliebribus

de temperaturam , ætatem & prægressam uictus rationem, quorum causa tenuior sanguis generari potuerit . Si verò fluxus per diæresin fiat, cum fieri pariter possit à causis internis & externis, distinguemus, quia si ab externis causis prædierit, præcessere causæ incidentes, pungentes, contundentes, disrumpentes, & huiusmodi alia, quæ continuum soluere possunt . At his non præcedentibus, indicium erit, causam esse internam, quæ si fuerit copiosus sanguis, aderunt indicia plenitudinis, uenæ erunt turgentes, corporis habitus plethoricus, color rubicundus, & reliqua id generis . Sanguis præterea in magna copia exhibit, cum impetu & confertim, quæ tamen fluxio dolorosa erit: quia ubi est solutio unitatis, ibi etiam est dolor ad illius fluxionis differentiam, quæ fit ex uasorum aperture. Si deinde solutio unitatis fiat à causa erodente, cum interna & externa esse possit, distinguemus, quia si præcessere pessaria acriora, balnea & cætera medicamentata eius generis, cogitandum erit , externas causas locum habuisse, quibus non præcedentibus, statuendum erit, ab internis potius causis prodire . Hæc autem cum non alia sit, quàm sanguis acrior & mordacior , cognoscemus ex indiciis, talem sanguinem indicantibus, nempe ex temperatura biliosa, calidiori & sicciori, corporis habitu graciliori, ætate iuuenili, uitæ industria & reliqua prægressa uictus ratione consimili. Modus etiam excundi spectandus erit, quia hæc fluxio non confertim, sed paulatim, non in magna sed parua copia sit: & præterea cum calore, morfu & dolore illarum partium, quæ ad uterum pertinent: Accedit, quod in parte hac dolente obseruabitur aliqua materia saniosa & alieni odoris . Cæterum talis erosio cum fieri possit à salsa pituita, uel utraq; bile, distinguemus, recurrentes ad propria eorum humorum indicia , quæ tum ex colore fluentis sanguinis, tum ex aliis indiciis ab Hipp: propositis, desumi poterunt.

DE



De Indicationibus.

CAP. LIII.

**H** Abita cognitione propositi symptomatis à priori per suas causas, & à posteriori per signa, ad auxilia nunc accedendum, quæ si dogmaticè proponi debent, uirtute indicationum inuenienda erunt, quæ cum ex parte rerum præter naturam curatoriarum sint, ex parte naturalium uitales, & ex parte eorum quæ sunt in uia ut præter naturam euadant, præseruanti uæ, de singulis hoc loco agendum erit. Vt merito rerum præter naturam, si profluvium fiat per apertionem uasorum, apertio ista non per se, sed ratione causæ facientis apertionem indicabit, quæ si fuerit copiosus sanguis cum impetu commotus ad uasa uteri, merito copiarum indicabitur auxilium sanguinem minuens, merito eiusdem sanguinis, pro ut cum impetum in uterum mouetur, indicabitur auxilium euacuans, primo reuellendo, deinde deriuando. si hoc profluvium fiat ob raritatem tunicarum, uasorum, per quas tenuior sanguis faciliè permeet, tunc meritò raritatis indicabitur auxilium densans & constringens, meritò sanguinis tenuioris, auxilium incrassans. Si deinde uenæ unitatis solutione patiantur, cum solui possint à causis internis & externis, ab externis nulla orietur indicatio, ensis enim incidens uel acus pungens, nihil indicant, sed indicatio capietur ab incisione, punctione, fractione & cæteris speciebus solutionis unitatis, quæ permanentiam habent, & auxiliū uniens & agglutinans, indicant. Si autem soluat unitas, ob internas causas, ut à sanguine copioso & ebulliente, indicabitur auxilium euacuans. si deniq; ab erodente causa eadem solutio fiat, cum hæc agat insigni suo calore, mordacitate & acredine, indicabit auxilium refrigerans, & omnem illius excessum commoderans, quæ causa si con-

*Indit. curat.*

V 2 fide



## De Morbis Muliebribus

*Indic. prefer* sideretur, ut nondum erodit, sed erodere potest, erit indi-  
*uatoria.* cans præluatorium. Cæterum quia omne ulcius saniosâ  
materiam annexam habet, quæ illius consolidationem  
impedire solet, ideò ratione huius indicabitur auxilium  
exiccans, detergens & mundificans. Tandem si ratione  
*Indic. vita-* huius immoderati profluvii, vires imbecilliores fiant, tunc  
*les.* merito earum, quæ totum respiciunt, oriatur auxilium  
vitalitatis & conseruans, cuius materia alimentum erit. Merito  
autem loci affecti, siue uterus fuerit, siue Epar, siue  
alia pars uel totum requiretur auxilium corrigens & robo-  
rans totum uel partem determinatam. Epar quidem cū  
*De Progn-* Epaticis, uterus cum matricibus, & sic de aliis. Quos  
*stico.* scopos explere modò magis modò minus difficile erit,  
pro differentiarum & causarum discrimine. si in genere  
hoc profluuium primò consideremus, magni momenti  
malum esse uidetur, cum illius causa corpus totum debili-  
*Gal. 1. ad* tetur, frigidius fiat & hydrope etiam corripiatur, imò ad  
*Glauc. 5.* syncopen etiam mulierem perducit. si deinde illius spe-  
*de loc. aff.* cies consideremus, & primò, si hic fluxus fiat per Anasto-  
*5. Aph. 51* mosin, à copia inquam sanguinis, cum impetu commoti,  
si non fuerit antiquus, si citra insignem noxam patientis  
fiat, hæc omnia facillè attestabuntur salubritatem. si præ-  
terea hic fluxus fiat ex uenis uteri, solutis acetabulis, abor-  
tus sequetur. si ex uenis ceruicis, & in parua copia, ne-  
cessariò abortus non sequetur. Si ex uenarum erosione or-  
tum habuerit, si continuus fuerit, antiquus, medicamentis  
non cedens cum dolore factus, accedente corporis Macie  
& uirium imbecillitate, intemperatura calidiori, æstiuo  
tempore: hæc omnia curationem reddere possunt ne-  
dum difficilem uerum etiam impossibilem. Ideò Gal. re-  
cè statuit, ad immoderatum profluuium sequi lethales  
morbos, quales sunt hydrops, conuulsio, animi defectus &  
reliqua nimiam inamissionem sequentia. Si fiat ob disrup-  
ta uasa, ab externis causis incidentibus, contundentibus  
&



& reliquis, pro dictarum causarum diuersitate, diuersa ratione prognosticandum erit. Si locum habeat tunicarum nimia raritas, & sanguis tenuior, impossibile non erit continentium raritatem densare, & contenti tenuitatem incrassare.

*De auxiliorum Materiis.*

*LIV.*

**Q**uemadmodum in curanda suppressione menstruorum: ita & in profluuiio eorundem locum habent materiae chirurgicae, pharmaceuticae & diæteticæ, ut merito chirurgiæ tunc conueniat sanguinis missio, quando tale profluuium ortum habuerit à plenitudine sanguinis in uterum impetum habentis, & ratione eiusdem, ut in alia loca non conuenientia mouetur, sanguis pariter tum reuellendo tum deriuando educendus erit. Quare in profluuiio per Anastomosin facto, ratione plenitudinis aperientis uel disrumpentis uenas, sanguis euacuandus erit. In ea etiam fluxione, quæ à ualorum erosione dependet, locum habebit. Dum autem in tali profluuiio sanguis inanitur, parcè potius, quàm copiosè euacuari debet: non enim ad sanguinis copiam respicere solum oportet, uerum etiam ad uires præsentis & futuras, quæ licet inter initia huius affectus robustæ esse ualeant, illo tamen progrediente, citò imbecilles euadere possunt, propterea, etiamsi sanguis copiosus esset, & uires in præsentia robustæ, ut ratione utriusq; copiosus sanguis mittendus sit, quia tamen in continuo fluxu uires quotidie imbecilliores fiunt, parca euacuatio facienda erit, & præsertim si fluxus aliquem progressum fecerit, fueritq; biliosus quàm alterius generis. Præterea, cum talis euacuatio reuul-

*Sang. missio*

*Quantitas.*

*Locus.*



## De Morbis Muliebribus.

*Tempus.*

*Concilium  
rhas. cum  
stetio.*

*Modus.*

reuulsionis potius gratia quàm euacuationis facienda sit, idè uena superior cubiti communis aut iecoraria aperi-  
ri debet. Iecoraria quidem, ubi peccauerit sanguis bilio-  
sus & calidior: per huius enim sectionem, non solum re-  
uellimus, sed iecoris etiam feruorem contemperamus.  
Communis uerò pertunditur, si talis fluxus à totius ple-  
nitudine, consequenter à sanguine, copia potissimum  
peccante, fiat, tuncq; sanguinem mittere oportet, quan-  
do adest præsentia principaliter indicantis, copia inquam  
sanguinis & illius impetus in uterum, & absentia prohi-  
bentis, ad differentiam illius profluii, quod fit quidem  
ex apertione orificiorum venarum, sed talis apertio non  
fit à copia in uterum cum impetu commota, sed potius  
à relaxatione dictorum orificiorum, ratione cuius san-  
guis in uterum quidem mouetur, sed hic motus à copia  
non producit, sed à uasorum relaxatione, propterea in  
tali profluo iubet Rhases nos primò astringentibus uti  
debere, quorum usu si dicta fluxio cessauerit, nulla amplius  
habebitur indicatio ualidioris auxilii, consequenter nec  
sanguinis mittendi; At si tale profluum dictis astrin-  
gentibus non cesserit, tunc cogimur etiam ad missionem  
sanguinis deuenire & reuulsionis potius quàm euacua-  
tionis gratia. Oppositum obseruamus in illo profluo,  
quod fit à sanguine copioso: quoniam prius debemus  
sanguinem euacuare reuellendo, deinde astringentibus  
uti, aliter si astringentibus prius uteremur, tunc sanguis  
intus ita cohibitus, magis seuire posset, & seuiendo ua-  
sa etiam dirumpere, quod genus profluii Aet; magis cõ-  
siderauit, cum iubeat primo uenam esse secandam deinde  
adstringentibus utendum. Dum autem sanguis mittitur  
reuulsionis gratia, eo modo mitti debet, ut reuulsio & me-  
lius fiat, & uirium robur seruetur, quod continget, si non  
semel sanguis euacuetur in magna copia sed illa potius  
partiatur, qui sanguis si crassior fuerit, extrahi poterit  
per



per foramen paulò latius : secus autem si tenuior. Præter uenę sectionem locum habent etiam Cucurbitulę atq; scarificatę & non scarificatę . Utimur scarificatis , ubi pariter expedit sanguinem mittere, uires tamen non sunt ita robustę, quarum recta administratio iisdem scopis ac fundamentis innititur, quibus etiam uenę sectio . Id tamen circa locum aduertendum , cum non idem ab omnibus esse statuatur, sed alii scapulis & dorso applicāt, alij inguinibus , nonnulli mammis , ut Gal. & Hipp. Ex omnium autem consensu infernis partibus nunquam applicandę erunt; Sed ut procul ab omni errore conueniēs locus inueniatur, ad propositos scopos mentem dirigere oportet . Quare dum scopus adest mittendi sanguinem per cucurbitulas scarificatas, uel illis utimur gratia euacuationis, uel deriuationis uel reuulsionis . Si cucurbitulis utamur ut simpliciter euacuemus , ita indicabuntur à copia sanguinis in toto corpore peccantis, & tunc affigi debent cucurbitulę illis partibus, ratione quarum totum corpus à copioso sanguine euacuetur, cuiusmodi erunt spatulę, dorsum, uel etiam brachia. Si autem sermo fuerit de cucurbitulis gratia reuulsionis tantum, cum reuulsio indicetur, non à copia simpliciter, sed à motu potius sanguinis decumbentis in partem lęsam, idē pro compe- scendo tali motu, illis partibus applicandę erunt, ratione quarum impetus eius intercipiatur, & in oppositam partem eamq; longinquam retrahatur, seruata semper rectitudine, & tunc magnę cucurbitulę cum Hipp: sub mammis applicari poterunt, qui locus est oppositus loco affecto, est longinquus & præterea cum utero rectitudinem seruat, magnumq; cum illo habet consensum ob uenas, quę mammis & utero sunt communes, & cum hac ratione cucurbitulas mammis applicamus, debent potius sine, scarificatione quàm scarificatę applicari, quia scopus est non sanguinem euacuare , sed potius illius motum  
ad

*De Cucurbitulis.*

*Fen. 21. c. 4.*

*5. Aph. 50.*

*13. Meth.*

*19.*

*2. de comp. medic.*

*Concilium*

*Auctorum  
contradicti-  
tium .*

*Locus .*

*2. de morb.*

*mul:*



02 *De Morbis Muliebribus.* 22

*Modus.*

*Locus inde  
rina.*

*Gal. de prec.  
post. cap. 8.*

ad inferiora interciperē atq; reuellerē. Et ideo in eo profluuio potissimum locum habebunt, quod fit uitio ualorum, quando nimis laxantur & aperiantur orificia citra copiam sanguinis: circa quarum administrationem cum Gal: id seruandum, ut eligantur cucurbitulæ magnæ & cum magna flamma applicentur, quæ plurimū attrahendo reuellendi uim maiorem habebunt: & præterea affixæ diutius detineri non debent, sed per certa potius interualla repetendæ, aliter tanta attractio ad illas partes fieri posset, ut anhelitus etiam difficultas contingat: Sunt quin etiam admouendæ parti dextræ modò sinistræ, uel utrisq; , prout mulier ita affecta magis conqueretur secundum unam quàm alteram partem uel secundum utraq; . Si deinde sermo fuerit de cucurbitulis gratia deriuationis tantum, hac ratione cum sint materia auxilij euacuantis sanguinem, non ob totius plenitudinem uel impetum compescendum, sed potius ratione partis repletæ euacuandæ, ideo loco etiam propinquo parti affectæ admouendæ erunt, & hoc modo locus conueniens erunt inguina, per quas partes sanguis iam in uterum defluxus, deriuando educetur, per quam deriuationem immoderatus fluxus etiam intercipitur & cohibetur. Quod idem præstant etiam crasse faciēdo, quia euacuantes illius partem tenuiorem, & crassiorem relinquentes, fluxum compescunt: quem modum sistendi immoderatum fluxum uteri Gal: etiam significauit lib. de præcognitione ad Posthumum, ubi dicebat curationem & detentionem profluuui muliebris deriuando fieri, prouocantibus lotiunt & aluum mouentibus, ut hinc pateat quod materia auxilij deriuantis, uim habet sistendi profluuuium uteri, siue sanguinis fuerit siue aliorum humorum. Quod autem omnes consentiunt, infernis partibus applicandas non esse, ratio est satis euidens, quia fluxus non sisteretur, sed potius augeretur, maiorēq;



maiolemq; motum ac impetum sanguini præberent, ut ad uterum magis præcipitaretur. De quantitate autem & tempore nihil dico, quia eadem seruari debent, quæ in uenæ sectione dicta fuere. Præter cucurbitulas accedunt etiam ligaturæ, quæ in immoderato profluuiio usum pariter habent tanquàm materiæ auxilii reuellentis. Reuellunt autem ratione qua dolorosæ: nam ratione doloris attractio fit ad partem dolentem, locus autem patet, quia non erunt admouendæ infernis partibus, quia fluxum auferent, sed supernis potius ut digiti in primis ligari possint, manus deinde & brachia sed circa locum difficultas oritur quia Hip. 2. de morbis mul: & Auic. in capite proprio loquentes de loco in quo ligaturæ faciendæ sūt statuere uidentur, præter supernas partes ligandas etiam esse infernas poplitis uidelicet, & supra genu, pro cuius difficultatis resolutione notandum est, quod dum sermo est de ligaturis in immoderato profluuiio menstruum uel de illis loquimur ratione qua uno & eodem tempore utrisq; extremis partibus admoventur, supernis inquam & infernis, uel in diuersis temporibus. Si primo modo cum Hip: statuendum erit, quod hunc fluxum immoderatum sistere poterunt, experientia enim compertum habetur, quod id mobile raptum habens ad determinatum locum, si eodem tempore ad contraria utrinq; trahatur immotum manere. A pari eandem materiam, quæ in hoc profluuiio ad inferiora mouetur, si ad loca contraria utrinq; trahatur, immobilem fieri, qua ratione profluuiū sistitur, hoc autem contingit, quando uno & eodem tempore utraq; partes infernæ & supernæ ligantur. si autem diuersis temporibus ligabuntur, procul dubio materia, quæ erat in motu ad motum trahentis mouebitur, ut cum Gal: loco citato, si ligentur partes infernæ tantum abesse, ut profluuium sistatur, quod potius augetur: contra contingit si supernæ partes tantum ligatæ fuerint,

Quantitas.  
tempus.  
De ligaturis

Modus.

Locus.

1. ad Glaucl.  
14.

Dubitatio.

Solutio.

X ab



## De Morbis Muliebribus

*Monitum. i.* ab his enim materia uel sursum trahetur uel saltem illius motus ad inferiora impeditur. Cæterum illud in praxi obseruandum est, ut dum ligantur ambæ partes contrariæ, talis ordo seruetur, ut, non eodem tempore ambæ ligentur, sed priori loco superiori deinde inferiores: hoc enim ordine sanguis, qui propensius est, ut ad inferiora magis moueatur, sistitur inprimis, & ad contrarium locum facilius euocatur, quàm si eodem tempore utræq; partes ligarentur: præterea id etiam obseruandum erit, ut ob propinquitatem quam maiorem habet sanguis ad inferiora quàm ad superiora, ligatura partium superiorum paulò ualidior fiat, in inferioribus uerò paulò remissior, ratione enim maioris doloris, in supernis partibus facti, maior etiam attractio ad superiora quàm ad inferiora sit, quod minimè contingeret, si ambæ ligaturæ, essent æquales, quamuis enim ratione æqualis doloris materia magis ad unam quàm ad alteram partem moueri non deberet, tamen ob propensionem quam ad inferiora magis habet quàm ad superiora fluxus iste minimè sisteretur, alterum quod in praxi obseruandum est, respicit ordinem seruandum in solutione earundem ligaturarum: non enim uno & eodem tempore solui debent, sed priori loco soluendæ erunt ligaturæ inferiores, deinde superiores: hac enim ratione sanguis qui procliuior magis erat in infernas partes, melius sistetur, & ad superiora magis mouebitur. Eadem ratio esse potest de frictionibus, quæ sunt materia auxilij insensibiliter uacuantis, & pro diuersitate locorum quibus admouentur, uim pariter habent modò reuellendi & intercipiendi hoc profluuium, modo etiam augendi & prouocandi. Si namq; fiant in infernis partibus profluuium augebunt, si in supernis, sistunt. Vtrumq; autem præstant tùm ratione caloris tùm doloris, quorum proprium est attrahere. Calorem autem & dolorem inducunt ille frictiones quæ

*De frictionibus.*

*Locus.*



quæ non leues & molliores sunt, sed mediocres & asperiores, quæ in hoc profluuium locum habent, si supernis partibus fuerint admotæ. Et hæc de Chirurgicis materiis dicta sint.

*De materiis Pharmaceuticis.*

*CAP. LV.*

**D**E materiis pharmaceuticis agens, eas omnes consultò prætermittam, quæ cæteris affectibus communia sunt, totumq; respiciunt, qualia sunt lenientia, præparantia & purgantia, de quibus supra semel egisse satis est, & ad propria descendam, id tamen in praxi perpetua obseruatione dignum existimo, ut in proposito symptomate ab illis omnibus medicamentis semper abstineamus, quæ possunt profluuium hoc seruare, fouere & augere, siue hoc fecerint uenarum ora laxando, aperiendo, rarefaciendo, dilatando, uel continuum soluendo. idèd à Diureticis aperiētibus, & calidioribus desistendū erit, ut pote ab illis, quæ sāguinē attenuare, acriorē & mordaciorem reddere, uiaq; magis dilatare possunt. quare in genere lenientium hiera & aloe locum non habebunt: Cassia etiam quia partes laxiores reddit, relinquenda erit. Sed ea potius erunt eligenda, quæ primas superfluitates tollunt, & simul uiscera roborant, cuiusmodi sunt, Syr: ros: sol: tamarindi, myrabolani, & similia. Eadem ratio de præparantibus & purgantibus haberi debet, ut merito præparantium desistendum sit à Syr: de duabus, de quinq; radic: & similibus, consultiusq; erit illos eligere, quæ aliquam roborandi uim retinent, quales sunt Syr: ros: recens, de rosis ficcis, de succo acetosæ, de acetositate Citri, de Cichor: & similibus. Et deniq; merito purgantium, si bilem educere opus fuerit, eligere poterimus Rhabarb: immatu-

*Monitum.*

*Quæ Materie sint relinquendæ.*

*Lenientia ellegenda*

*Præparantia eligenda.*



## De Morbis Muliebribus

<p><i>purg. eli- genda.</i></p> <p><i>Modus</i></p> <p><i>Localia</i></p> <p><i>Ad string. 2.</i></p> <p><i>7. de com- pos. med. 7. de simplic. med.</i></p>	<p>rum potius quàm maturum, ustum, quàm non ustum: quod si in infusione præbeatur, parandam erit potius in decocto Tamarindorum, Myrobal: citrin: &amp; similibus, quàm in aliis aperientibus uel laxantibus. Et tutius adhuc erit, eodem uti in substantia potius quàm in infusione. Supposita igitur totius purgatione, ad localia deueniendum erit, quæ respiciunt non solum partem læsam, sed læsionis etiam causam, tùm continentia tùm contenta: in primis si hoc profluuium fiat per apertionem orificiorum, distinguere oportebit, an illud fiat uicio materiæ uel potius uasorum. Si uasorum uicio contingat, quia aperta &amp; laxiora sint reddita, occurrendum erit cum exicantibus astringentibus, quorum materiæ duplices sunt, quarum aliæ astringunt stupefaciendo, &amp; ab his, pro uiribus desistendum erit. Alia id præstant, sed citra stupefactionem, &amp; istis magis utendum, &amp; ea potissimum cum Gal. eligenda erunt, quæ citra mordacitatem exiccant in erosis &amp; fractis uenis non solum exicantia, cōducent, sed illa potissimum quæ aliquid etiam glutinosi habet. Quibus utemur intus exhibendo, &amp; extra admouendo, magis autem istis quàm illis, pro loci affecti situ ac positione: si namq; afficiantur ora uasorum, quæ ad uterum tantum spectant, in illis astringentibus potissimum insistendum erit, quæ exterius applicantur: hæc enim iuuare semper possunt, nocere autem nunquam. At si hæc per os exhibeantur facillè etiam nocere possunt astringendo internas uenas, &amp; calotis consuetam uentilationem prohibendo, qua ratione febrem etiam accendere possunt. At si aperta fuerint eorum uasorum ora, quæ in alto corporis sunt magis locata cum ratione longioris situs uis astringentium, quæ extra tantum applicantur, eò usq; penetrare non possit, cogimur intus illis uti, &amp; præsertim si profluuium hoc confirmatum fuerit. Vbi autem utrobq; uenarum ora aperta fuerint, utrisq; etiam astringentibus</p>
--	---



gentibus uti oportebit, de quibus omnibus sigillatim agendum est. Et primò quæ & quot sint materiæ huius auxilij astringentis enumerabo, secundò quæ sit ratio & modus utendi monebo, Materiæ igitur astringentis & agglutinantis auxilij citra stupefactionem, & mordacitatem esse possunt frigidi & calidi temperamenti, quarum usus modò, seorsum, modò simul habendus erit, pro diuersitate dicti profluuij. vtriusq; autem auxilij materiæ ex triplici rerum ordine capiuntur, Mineralium uidelicet, uegetabilium & animalium, ut in genere mineralium hæc enumerentur: bolus armena, terra lemnia, sanguis Draconis, lapis hæmatites, corallia alba & rubra, Samius aster, Ocrea, lapis calaminaris, qui Cadmia est lapidosa, qui sæpè ustus & aceto extinctus, ualenter siccatur, scoria ferri, alumen ustum, es ustum, squama æris, chalcantum, quæ tamen exiccando, & cicatricem inducendo aciora sunt, sæpius tamen lota omnem acrimoniam deponunt. Inter uegetabilia sunt radices, folia, frondes, fructus & semina in quo genere numerantur rosæ rubræ, consolida plantago, uerbascum, mirthum, polygonon, qui ab effectu sanguinaria dicitur, bursa pastoris, Arnoglossa, cynoglossa uel lingua canina, folia pimpinellæ & radix, pentaphyllum, portulaca, semperuium, barba hirci, cauda equina, cortex granatorum, succus eorum, balauſtia, cotonea, sorbæ, mora immatura, mespila, fragæ, glandes, hypocystis, sumach, dipsacum, arancia acerba, Acatia, lycium, millefolium, lentiscus, tentalia, spodium, lens, uirga pastoris, uitis agrestis, nymphaea præsertim quæ candidam radicem habet, bistorta, semina acetosæ, coriandrum. Inter composita habetur Diabolianum Auicennæ, theodoricum magnum, tryphera minor, confectio Alkekengi, Athanasia, trochisci de terra sigillata, de Charabe, de spodio, de Camphora, de scoria ferri, diamargariton, triantalala, conserua myrthi, Symphyti-

*Materiae  
auxilij ad  
stringentis.*

*Ex genere  
mineral.*

*Ex genere  
uegetab.*

*Gal. li. de  
symp. me-  
dic.*

*Hyp. lib. de  
morb. mul.*



## De Morbis Muliebribus.

*Ex genere animalium* phyti, diacitonite, diacornu, saccharum rosatum anti-  
 quum Syr: de rosis siccis, de mirtho, de portulaca, de  
 agresta de ribes sunt etiam catapotia ex bdellio à Me sue  
 commendata. Inter animalia habentur cornu cerui-  
 uſtum & lotum, lepufculus uſtus, coagulum hoedi, lepo-  
 ris, cerui & uituli, mumia, cortex ouorum uſta, puluis of-  
 ſium ſepiæ, raſura eboris, margaritæ puluis ſpongiæ uſtæ.  
*Hyp. lib. de morb. muli.* quàm hyp. dabat cum uiuo & ſimilia. Materiæ uero exci-  
*Materiae.* pientes eſſe poſſunt aqua ſimplex uel ſtillatitia roſarum,  
 uel chalybeata, poſca etiam, uinum granatorum, uinum  
*Excipientes* auſterum, acetum, & huiusmodi. Quæ uerò aſtringunt, ſed  
 calida potius ſunt preter dicta erunt Abſinthium, mentha,  
*materiae au* maſtix, Ambra, mirrha, olibanum, coriandrum ſiccum, nux  
*xilii adſtrin* cupreſſi & huiusmodi. In quorum adminiſtratione id in  
*g. calidi.* praxi obſeruandum, ut cum expedit per os uti aſtringen-  
*Monitum.* tibus frigidis, ſolis non utamur, ſed permixtis cum portio-  
 ne aliqua calidorum. ſic enim uentriculo nō nocēbimus,  
 ſed ipſius robur aliqua ratione tuebimur. his accedunt  
*Tempus.* cōpoſita, dyacal. dyatriop, dyagal. dyaci. ther. mitr. & ſimil.  
 quibus utimur, ubi exiens mā aquoſior extiterit geni-  
 taq; fuerit ex uentric. aut hepate frigidiori, quibus pa-  
 riter uti expedit extra fluxum potius & pro preſer-  
 uatione, quàm fluxionis tempore & procuratio-  
 ne, & ratio eſt quia uin habent meſtrua prouocan-  
 di, ex prædictis igitur materiis uariæ medicamentorum  
*uarie for-* formæ parari poterunt, ut ſi de illis ſermo habeatur, quæ  
*mae medic.* foris applicantur, conficere poſſimus, fomenta, ſeſſiones,  
 ſuſſumigia, peſſaria, clyſteria, inunctiones, lenimenta, ce-  
 rata & ſimilia. Si interius illis uti magis expedit, propi-  
 nari poterunt decoctiones, infuſiones, ſucci, pulueres,  
 electuaria, conſeruæ, trochiſci, pillulæ & huiusmodi. Cum  
 igitur nobis curandum occurret profluuium quod ex la-  
 xatis uafis uteri fiat, eorumq; oris apertis, citra plenitu-  
 dinem, illæ materiæ adſtringentes eligendæ erunt, quæ

in



in passivis qualitatibus semper exiccent citra mordacita-  
tem, in actiuis uerò modò ad frigidum modò ad calidum  
vergant, pro caularum & intemperiei diuersitate. Vnde  
si uteri tantum uasa laxata fuerint, satis erit astringentia  
extra & ad partes uteri applicare, quemadmodum si pa-  
rentur seshiones ex foliis mirthi, plantaginis, polygoni,  
rosarum rubearum an. M. ii. Nucum cupressi onc. ii.  
quibus omnibus simul mixtis & contusis, excipi poterunt  
in communi aqua uel uino rubro astringenti, & facta de  
coctione in ea mulier sedeat singulo die per horam ante  
cibum. Ex hoc ipso decocto fomenta etiam parari pote-  
runt, quemadmodum ex eodem supposito luffumigium  
conficitur, pessaria etiam fiant madefaciendo pecias &  
ad formam digiti deducendo, & in oleo lentisci intinctis  
in uterum mittantur. Et si efficaciori pessario opus fue-  
rit, parari etiam poterit ex propria substantia dictorum  
astringentium, & pro necessitate etiam ualentiorum, que  
madmodum si prædictis simplicibus addiderimus hypo-  
cystidem, balauftia & in uino astringenti de coquantur,  
& bombace in eo madefcente & contuso ad formam pes-  
sarii deducatur, uel etiam eorum substantia in pecia tenui  
& rara excipiat & in uterum indatur. Ex eodem deco-  
cto clysteria etiam parari poterunt pro eodem utero ut  
Gal. testetur se solo usu succi plantaginis quatuor die-  
bus continuis immoderatum fluxum uteri sistisse. Leni-  
menta etiam parari poterunt ex sanguine draconis, terra  
lemnia, bolo armena, aquis partibus acceptis ad scr. i.  
addendo puluerem pineorū cupressi & masticis an. drag.  
i. gummi Arabici, tragacanthi: ann. Scrup. 5. olei mirthini  
uel melini aut de lentisco onc. 15, ceræ lotæ in uino a-  
stringenti uel chalybeato uel etiam in aceto ros: q 5. om-  
nibus mixtis lenimentum parabitur: & abasis prius pilis,  
dictæ parti applicari poterit. Adde aliud, quod ualentius  
adhuc astringens pro maiori etiam necessitate in usum  
uenire

Seshiones

Fomenta  
suffitus.  
pessaria.

Clysteria  
5. Meth.  
lenimenta.

Valentius  
astringens



## De Morbis Muliebribus.

uenire poterit, quod conficitur ex lopa ferri in puluerem tenuissimum prius redacta, deinde aceto infusa, & in loco calido per 24. horas detenta: sic enim illius uis in aceto recipitur, quod lento igni expositum, & ad mellis consistentiam redactum ualentissimum erit adstringens, siue intus siue extra admouetur & hoc genus medic. potissimum locum habebit in profluuiio ex apertione uasorū ex nimia humiditate laxante. Extat etiam ynguentum comitis, quod paratum habetur, ut lumbis ac pectini admotum, abortum etiam impedire soleat. Ex eisdem materiis parari etiam possunt medicamenta intus capienda. In quorum omnium recta administratione illud in praxi perpetuò obseruandum, ut cum dictis materiis aliqua semper permisceamus, quæ diuretica sint, ut pro uiculo aliorum inseruiant, donec ad uterum usque deducantur. Quantum igitur ad potiones, decocta potius probantur quàm infusiones uel aquæ stillaticæ, quia maiorem astringendi efficaciam retinent, quemadmodum si acceperimus foliorum plantag. mirthi, ros. rubearum, pineorum cupressi, & pro uiculo ac diuretico, matricariam addiderimus an. partes æquales, aquæ stillaticæ rosarum q. s. misce & fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, & de hoc decocto detur singulo mane ad Vn. 3. uel 4. ieiuno uentriculo, & pluribus horis ante cibum. Si adhuc magis opus fuerit laxatas partes astringere, iisdem etiam uti poterimus in substantia, cōficiendo pulcrem quemadmodum si acceperimus pul: boli Armeni, terræ lemnis, corall. rubeorum, triasandalorum, rosarum rub. pineorum cupressi ana drac. i. quibus mixtis poterimus ex hoc puluere dare singulo mane ante dictum decoctum uel etiam cum posca. Vel loco huius pulueris dare poterimus tantundem trochisc. de charabe, qui à Rhase tantopere commendantur, propinariq; poterunt cum uino granatorum, posca, aut uino sliptico

Ex

*Yng.*

*monitum*

*decocta*

*puluis*

*Troc.*

*ellec.*



Ex eisdem parari poterunt elect. quemadmodum si ex dicto puluere ad onc. 5. accepto ex saccharo rosato antiquo ad onc. i. cum Syr. de ros. sic: q. s. Elect. componamus, cuius Dosis erit drag. 5. singulo mane. Ex eodem puluere cum uino granatorum uel Syr. de ros. sic, pillulæ etiam ponderis scrup. i. formari poterunt, uel iam paratas accipere poterimus, quales illæ sunt quæ ex bdellio conficiuntur maiores & minores: si autem profluuium fiat ex apertis uasis à nimia copia sanguinis cum impetu commoti ad uias uteri, præcipuum auxilium erit, illius copiam minuere, impetumq; ac motum ad contraria reuolare, cuius auxilij materia erit sanguinis missio, ut supra dictum fuit. si idem profluuium fiat ob raritatem tumicæ & sanguinis nimiam tenuitatem, occurrendum erit cum densantibus partes rarefactus & tenuiorem sanguinem incrassantibus, cuius auxilij materia illæ eadem erunt, quæ proximè fuere enumerata, quibus semper ratio uicinus proportionem respondere debet in quo profluuium conueniet cibis paratus ex pedibus uitulorum, carne testudinis, cochlearum, risum, alica & huiusmodi, & præsertim cum aqua chaalybeata uel rosarum stillatitia parata fuerint, uel etiam cum radice symphyti, cū coriandris cū modo dicto aceto præparata: Eadem & de potu ratio habenda erit, quod esse poterit uinum, sed austerum, quod si tale non fuerit, permisceri ei poterit succus granatorum uel ribes, uel aranciorum acerbiorum. Si deinde profluuium fiat à soluta unitate, atq; hoc fiat ab externis causis, ut à uulnere, contusione, fractura, casu ab alto & similibus, his omnibus medicus occurrere debet, tanquam chirurgus. At si causa solutæ unitatis interna fuerit, hæc si sanguis effluens extiterit, ut ob turgentiam flatuum uasa frangantur, illis erit occurrendum, quæ sanguinis ebullitionem tollere possunt, cuiusmodi est apertio uenæ cubiti statim facta, quæ pariter eo in loco facienda erit, ra-

Pil.

cura ex apertione uasorum ob nimiam plen.

missio sag.

cura ex raritate.

cibus.

potus

Cura ex soluta unitate.

Cura ob sag. feru.

Vene sec.

Y tione



## De Morbis Muliebribus

*Cura ob difficultate par.*

*Cura ob uasa exesa.*

*Materia auxilij refrigerantis.*

*Materia auxilij mundificantis.*

tione cuius illius impetus ad uias uteri reuellendo interceptatur . Deinde cum consolidantibus & agglutinantibus progrediendum erit, quorum materiae erunt illae eadem supra propositae, ex quibus uariae formae praesidiorum parari poterunt, pro loci fractura, quae si in internis locis fuerit, praebere poterimus decocta, infusiones, succos, pulueres, Electi & reliqua proposita . Si fractura externas potius partes ad uterum pertinentes occupauerit, ut ex difficultate partus contingere solet, satis erit illis uti quae extra applicantur, siue balnea fuerint, sessiones, fomenta, fustumigia, pessaria, clysteria, inunctiones, explastra, cerata & eius generis. Si tandem profluvium fiat per Diarresin, quae in uasorum exesione & ulceratione consistit, triplex curandi scopus oritur . Primus erit consolidandi ulceris, secundus impedimenta remouendi, quae cicatricem tollunt, tertius alterandi & roborandi membrum aciores humores generans: cuius auxilii materiae, illae omnes erunt, quae feruorem, caloremque moderari possunt, cuius modi sunt cichoracea omnia, siue decoctis eorum utamur, succis, conseruis, pulueribus & similibus . Praeter ista habemus forum caprinum chaly beatum & in maiori copia exhibitum & per plures dies . Et si diligentiores esse cupimus, capram nutrire poterimus cum appropriatis. In eundem usum conuenit etiam aqua B. uirginis: quae uero impedimenta tollunt, hoc est, saniem ulceris auferunt, cuius praesentia cicatrix induci non potest, erunt quaecunque; detergunt & mundificant: ideo cum decocto hordei, furfurum, decoctis uel in mulla, uel in sero caprino, poterimus ulcus mundificare, parando uel sessionem uel per clystere iniiciendo, deinde ad consolidantia deueniendum erit, quae licet plurima sint, & ex materiis exsiccantibus haecenus propositis, uariis formis confici possint, duo tamen adhuc peculiaria, & maxime efficacia in consolidando quocunque; ulcere propono, & praesertim cum



cum illa etiam longa experientia fuerint comprobata. Primum est oleum stillatitium paratum ex bolo Armeno coloris rubicundi. Alterum est oleum sulphureum, utrumque magnam habet vim exiccandi, putredinem omnem tollendi, ulcusque consolidandi. Quod munus citissime etiam absolunt, id tamen in illorum usu observandum erit, ut non sola & impermixta adhibeantur, sed cum aliqua aqua ulceri proportionata simul misceri debent, praesertim oleum de sulphure, quod est efficacissimum. Permisceri autem potest cum aqua stillatitia radicum symphyti, uel foliorum plantaginis, sanguinarie, rosarum, & similium, ut si oleo sulphureo uti uolemus in una libra dictarum aquarum satis erit, permiscere drag. ii. dicti olei, cuius usus & intus & extra haberi poterit. Intus quidem, si singulo mane duobus aut tribus vnc: predictae aquae usi fuerimus. Extra uero parari clyster poterit: ex eodem pessaria etiam confici poterunt, inunctiones & huiusmodi.

*Materia au-  
xiliij conso-  
lidantis.*

*Monitum.*

*De victus ratione.*  
**CAP. LVI.**

**V**ictus autem ratio non eadem ubique esse debet, sed pro causarum facientium profluvium diversitate mutanda erit. Vnde in profluvio facto à sanguinis copia, conveniet victus minuens, consequenter in parva copia sumptus, si ex laxatis uasorum oris, conveniet cibus exiccans & adstringens. Si fiat ex ulcere, utendum cibo refrigerante & consolidante, cuius materia erunt testudines, cochleae, pedes uitulorum, cancri, ouorum ablumina conquassata in aqua stillatitia portulacae uel polygoni, in qua pariter dissolvere poterimus amyllum, tragacanthum, mucilaginem citoneorum & similia. Alterari etiam pote-

*Victus in  
profluvio  
à copia sag.  
Victus in la-  
xatis oris  
uaso:  
Victus in  
ulce.*

Y 2 runt



## De Morbis Muliebribus

*Alterantis  
cibum.*

*Modus præ  
par.*

runt fercula cum radice Symphyti, alt heæ, plantaginis, cum uino granatorum & similibus, quæ eo magis huic scopo satisficient, si confecta fuerint ex oriza, amylo, riso, panis etiam in posca infusus conducit, & carnes potius alia quàm elixæ. Potus autem sit posca uel aqua chalybeata, uel etiam alterata cum oleo sulphuris, ut antea dictum fuit: interin à nimio & inordinato motu arcendus erit æger, ne humorum impetus magis augeatur, & reliqua pariter uictus ratio proportionem respondeat.

## De Stillicidio Mensium.

### CAP. LVII.

*Nomen.*

Tanta est affinitas inter immoderatum profluuium menstruorum & stillicidium eorundem, ut ambo eadem & communis essentia esse appareat, soiumq; distingui uidentur, secundum magis & minus. Ambo enim Symptomata sunt in exeunte mutato, in utrisq; idem est locus affectus quàmuis immoderatum profluuium potissimū fiat à materia fluente à toto. Stillicidium autem mag. à fluente abutero, effluens tamen materia est eadē imò ab eisdem causis prouenire etiam uidentur, ut propterea eadem etiam curandi ratio in ambobus habeatur: proinde breui oratione affectus iste absolui poterit. Ante omnia igitur supponendum est per stillicidium mensium nos intelligere illud profluuium, in quo menstruus sanguis per uterum egreditur, non tamen consuetis temporibus, aut debito modo, sed exitus continuus est, sensim tamen factus, ut partes pudendi tali sanguine assiduò madescant, cuius exeundi modus non est citra aliquam noxam, leuioremq; molestiam & dolorem, qui dolor ten-

suus



fiuus esse solet, & circa uteri uasa consistens, ac proinde à repletionē illorū uasorum dependet, consequenter à repletionē determinata, cuius symptomatis forma, cum eadem sit cum priori affectu, ideò statuendum erit Symptoma esse in exeunte mutato, sola differentia erit, quia in profluuiō immoderato menses fluunt absq; difficultate, in stillicidio autem cum aliqua molestia, materia etiam exiens eadem est in utroq; Symptomate, nempe sanguis menstruus, differentia est solum in modo exeundi, quia in profluuiō copiosius effluit, in stillicidio sensim & guttatim. Locus pariter affectus non est diuersus, sed est idem uterus, qui etiam primariò & secundariò læditur, & ratione totius uel partis: fit tandem stillicidium ab eisdem causis, nempe à facultate uteri expultrice labefacta uel impedita: labefactatur ab intemperie calidiori uel frigidiori, ratione cuius partes uteri ad expellendum ineptæ redduntur, duriores enim fiunt ob copiam sanguinis ibi cohibitam, & uasa tenduntur doloremq; tensionum patiuntur. Si facultas impedita fuerit impediri potest uitio uasorum uel materiæ. Si uasorum fit propter angustiam, quæ ab eisdem causis fieri potest, sicut de suppressione dictum fuit. Si impediatur uitio materiæ cum hæc sanguis sit, concurrere potest, ratione copię & qualitatis tum primæ tum secunde, ut si peccauerit in caliditate, tenuitate, acrimonia, uel in frigiditate, crassitie & uisciditate. Causæ autem generantes huiusmodi sanguinem, internæ & externæ esse possunt: & sunt illæ eadem, quæ in suppressione menstruum enumeratæ fuere, cuius Symptomatis etiam differentia ab eisdem fontibus oriuntur, sicuti et priores: quare his consultò prætermisiss, ad signa descendo, ad ea inquam quæ non solum stillicidiū in genere sed et singulas species patefaciant, species. Stillicidium itaq; adesse patiens ipsa significabit, distinguemus autē à profluuiō immoderato, tum ex minori copia fluentis

*Forma.*

*Locus aff.*

*Causa effectrices.*

*3. de Sympt. causis 2.*

*Differentia.*

*Signa.*

*Signa in genere.*

*Signa differentie forma.*



## De Morbis Muliebribus.

*Signa differ. materialiu.* fluentis materię, tum ex modo exeundi cum aliqua molestia & dolore. Locum uerò primariò affectum esse ipsū uterum, cognoscemus, recurrentes ad eadem signa superius proposita in sermone de suppressis menstruis, ut si fiat labefactata expultrice uteri, insuetam quandam durtiē habebit, quæ si non aderit, in æternos errores causa referri debet, ut si fiat à sanguine redundante, dolor tenuius urgeat, indiciaq; aderunt plenitudinem indicantia. si autem sanguis concurrat potius ratione qualitatis & primò quia sit calidior, tenuior & mordacior, dolor aderit acris potius quàm tenuius. si autem locum habuerit sanguis frigidior, crassior & uiscidior, ad illa signa adendum erit, quæ pituitolum sanguinem ostendunt.

## De Curatione.

### CAP. LVIII.

*Indic.* IN curando autem tali stillicidio ad tres illos scopos confugere debemus, curatorios inquam præseruatorios & uirtuales, ut curatorii capiantur à causa continente, quæ si fuerit sanguis copiosior, auxilium euacuans indicabit, si qualitate peccauerit, auxilium alterans in contrariū. Merito uteri si durior fuerit, auxilium emolliens & laxans à continentibus uerò, hoc est, à partibus intemperatis, auxilium præseruatorij roborandi significabitur: quemadmodum à uirtute, ratione totius uel partis, uirtuale auxilium indicabitur. Quibus scopis satisfacere etiam si difficile sit, non tamen impossibile, non dum enim profluuium integrum est, nec suppressio omninò facta: pro causarum tamen diuersitate, diuersa prognosticandi ratio oritur, sicut etiam dictum fuit in capite de suppressis menstruis. Quare ad materias medicas.



rias medicas descendens, si stillicidium fiat à sanguinis plenitudine, sanguis euacuandus erit modò per uenæ sectionem modò per cucurbitulas pro plenitudinis magnitudine, & uirium robore, ad quæ pariter respicimus cupientes cognoscere certam mensuram sanguinis euacuandi. Quare si uena secabitur, superior & ipsius cubiti dexteræ eligenda erit, cuius gratia, non solum plenitudo sanguinis minuetur, sed illius etiam impetus in uterum reuelletur: ideò sunt in errore illi practiçantes, qui in tali stillicidio à totius plenitudine dependente, neglecta sectione uenæ superioris, uenam inferiorem malleoli aperiant; respicientes ad plenitudinem partis determinatæ tantum, & negligentes plenitudinem totius, sine cuius remotione, non potest remoueri plenitudo partis, imò ex sectione uenæ inferioris tantum, nocemus potius quàm iuuamus, quia maiorem impetum sanguini redundanti, in toto præbemus, ut in eundem uterum copiosius fluat & consequenter obstructionem maiorem reddimus: quare duplici hac plenitudine existente totius & partis, illa priori loco tollenda est, ratione cuius altera consistit & fouetur, huiusmodi autem est totius plenitudo, qua priori loco sublata congruum postmodum erit ad plenitudinem determinatam respicere, secundo etiam uenam inferiorem. Idem statuendum erit etiam ubi sanguis non solum copia, sed feruore & calore peccauerit, consequenter in tenuitate & acrimonia, uel frigidior etiam extiterit, ac proinde crassior & uiscidior. Idem de cucurbitulis statuendum erit. Quo ad tempus etiam si quocunq; tempore, in quo adest præsentia sanguinis plenitudinem facientis in toto uel in parte, liceat per uenæ sectionem uel cucurbitulas sanguinem euacuare illud tamen in praxi obseruandum erit, ut eo potissimum tempore dictis materiis utamur, quo imminere solet consueta & naturalis purgatio, per duos uidelicet, tres uel quatuor dies ante

Sæg. misfio.

Quantitas.

Locus.

Ordo Seruā  
dus in sec.  
uenæ.

Cucurb.  
Tempus.

con



## De Morbis Muliebribus.

consuetam euacuationem. Accedunt quin etiam cucurbitulæ insensibiliter euacuantes, cuiusmodi sunt non scarificatæ, quibus ligaturæ & frictiones correspondent, in quorum omnium recta administratione ad eosdem scopos respiciendum erit, sicuti antea diximus. Idem etiam dicatur de Synapismis & similibus. De materia pariter pharmaceutica siue totum siue partes respiciat, non plura dicam cum de his pariter abundè actum sit in sermone de profluuiis menstruorum. Idem quin etiam de uictus ratione statuendum erit.

*Cucurb. non scarif.*

*Ligat.*

*Frict.*

*Synap.*

*Pharm.*

*Vic. ratio*

## De Muliebri profluuiio.

### CAP. LVIII.

*Nomen.*

*Differentia profluuij muli. ab alijs.*

**M**uliebri profluuium alterum est Symptomatum genus, quod mulieribus adueniens, in exeunte mutato consistit, & illud est, in quo per uterum assiduò uel per interualla materia effluit insueta, uiciosa, à sanguine menstruo substantia & qualitate diuersa, ratione cuius, tale genus fluxus distinguitur à profluuiio immoderato menstruorum, & stillicidio eorundem, in quibus exiens materia sanguinea est: in hoc uerò fluxu alterius est generis. Cæterum hæc materia, cum esse possit semen uel alius humor, si semen fuerit, fit ea species profluuij, quæ Gonorrhoea dicitur, si uerò alius humor diuersus, alia species profluuij nascetur, quæ à muliere affecta nomen desumens, muliebri profluuium dicitur, in quo exiens humor prauus & corruptus est, & diuersi coloris, ut modò albus sit, uiridis, citrinus, uel obscurior appareat: & præterea modò crassior, tenuior & aquosior uidetur: immo mordax ut plurimum esse solet, & quandoq; mordacitate carens, de quo genere profluuii institutum



tutum est hoc loco agere, pro cuius cognitione non satis est quid nominis ipsius habuisse, sed illius etiam essentia, species ac proprietates inuestigandæ sunt, ut ex hac integra cognitione, perfectior etiam curandi ratio habeatur. Quapropter cum Gal. de illius forma, materia & causis efficientibus agendum est. Quo igitur ad formam spectat, satis constat muliebri hoc profluutum non solum esse symptoma, sed quod in exeunte mutato consistit, in quo immoderatè exit quod intus citra alienam alterationem retineri deberet. Est quim etiam symptoma ipsius uteri, siue primò afficiatur, siue secundò, facultate labefacta uel impedita, in quo genere conuenit cum immoderato profluuio menstruorum, à quo tamen merito mobilis & fluentis materiæ distinguitur: nam in profluuio menstruorum, quod immoderate exit, sanguis est, in hoc autem fluxu muliebri est materia seiuncta à sanguine, & præsertim in profluuio muliebri exquisito ad differentiationem nothi, in quo sanguis cum alia materia exire potest quæ tamē copia illi dominabitur, hæc materia cum à sanguine distincta sit, uaporosa & humorosa esse solet, Hec tamen cum oculis conspiciatur & manibus pertractetur, non uapor sed uaporis potius minera erit, quæ cum alimentalis & excrementitia esse soleat, prioris generis non erit, quia hic fluxus longo tempore & per plures annos perdurare potest citra patientis interitum, quod minimè contingeret, si materia esset alimentalis, sed citius tabescendo periret. Accedit quòd fluxus materiæ alimentalis ardentes febres comitari consuevit, in quibus ob caloris uehementiam solida corporis liquecunt. at fluxus iste nec febres necessariò sequitur, nec patientem ad interitum perducit. Est ergò fluxus materiæ excrementitiæ, quæ cum utilis & inutilis esse possit, non erit utilis, quia esset materia seminalis quod ex eius materiæ immoderato fluxu,

3. de causis  
Sympt. de  
differ: symp.  
6. de loc. aff.  
de præcog.  
ad Postbu.  
5.

Locus affect.

Differ. à proflu. mest.

Profluum mulieb. 2.

Materia exiens. 2.

Materia exiens excre: est.

Ratio prima

Ratio 2.

Materia exiens est inutilis.

Z xu,



## De Morbis Muliebribus

*Materia exi-  
ens esse  
pōt ichor.  
& humo-  
rosa.*

*Materia exi-  
ens esse pōt  
simp. &  
mixta.*

*Profluuium  
mul. 2.*

*Materia exi-  
ens mul-  
tas cōplic.  
facere pōt.*

xu, corpus ad tabem pariter & mortem citò perducitur  
concludendum igitur, quòd effluens materia in muliebri  
profluuiò est humorosa & non uaporosa, excremen-  
titia, non alimentalis, inutilis, & non utilis, quæ  
adhuc duplex esse potest, Ichorosa uidelicet & humo-  
rosa uel mixta ex utriusq; , quarum quælibet præter natu-  
ram exeundo, muliebri hoc profluuium facere potest.  
Pro utriusq; autem materiæ diuersitate & mixtionis mo-  
do, multiplex etiam Symptoma hoc fieri potest: nam ma-  
teria exiens si simplex fuerit & humorosa, potest esse pi-  
tuitosa, biliosa & melancholica, quemadmodum si sero-  
sa extiterit, modò erit Ichor pituitæ, bilis, melancholiæ  
uel sanguinis, cuiuscunq; autem materiæ hoc profluuium  
fuerit, uel erit materiæ simplicis & impermixtæ, siue hæc  
fuerit humorosa tantum siue serosa. Et humorosa erit bi-  
lis, pituita uel Melancholia: de sanguine non loquor,  
quia huius fluxio facit profluuium menstruorum. Pariter  
si serosa fuerit dictorum humorum serum esse poterit:  
Quomocunq; autem tales materiæ impermixtæ fluxe-  
rint, facient profluuium muliebri exquisitum, si autem  
permixtæ exierint, orietur alterum genus profluuii nothi,  
siue hæc permixtio serositarum inter se extiterit, siue hu-  
morum tantum, siue serositatum & humorum simul,  
ex quarum materierum tam multiplici mixtione multæ  
etiam ac uariæ complicationes orientur, prout scilicet ex  
parte ichoris tantum exeuntis, misceri potest ichor pitui-  
tosus cum bilioso, uel melancholico uel sanguineo: uel  
biliosus cum melancholico & sanguineo: uel melanco-  
licus cum sanguineo, uel cum omnibus simul Idem dica-  
tur, quando fluit humor tantum uel humor, cum Ichore  
simul: quæ omnes propositæ complicationes, denomi-  
nationem semper accipiunt à materia prædominante:  
quæcunq; autem fuerit hæc materia, siue ichorosa siue  
humorosa, considerari adhuc potest, ratione quæ genita,  
& ra.



& ratione qua generanda, dum consideratur ubi genita est, cognoscere oportet, qua ratione concurrat ad hunc fluxum producendum. Concurrit autem penes ea, quæ illius essentiam consequuntur. Hæc autem sunt accidentia, quorum alia absolute illi insunt, alia respectuè quæ absolute ei insunt, illius essentiam consequuntur gratia materiæ, & est ipsa quantitas uel gratia formæ, & est qualitas. Si eidem respectuè inerint, tunc circa dictam materiam considerabimus locum, tempus, motum, actionem & passionem, ut in primis si materiam consideremus ut quanta, copiam & inopiam ipsius respiciamus, quæ ad profluvium faciendum concurrat potius ratione copiarum quàm inopiarum, & quod fuerit copiosior, eò magis immoderatum ac diuturnum profluvium faciet. Si eadem consideretur ratione qualitatis, ita concurret per manifestas uel occultas qualitates, ut si mulier lue gallica correpta fuerit, & profluvium patiat, tale profluvium dependet à materia occulta qualitate peccante. Si autem manifestis alterata fuerit, recedere poterit à naturali statu in primis & secundis qualitatibus. In primis, ut si calidior aut frigidior illa fuerit. In secundis uerò, ut si tenuior aquosior, crassior & terrestrior extiterit: unde si calida & tenuis fuerit profluvium erit à materia biliosa, si uiscida à materia pituitosa, si crassa à melancholica, si aquosior esse poterit quilibet Ichor: quamvis autem profluvium hoc fieri possit ex omnibus dictis materiis, facilius tamen fit ex Ichoribus quàm ex humoribus, & inter ichores facilius fit à calidis quàm à frigidis: unde Ichor bilis cum cæteris calidior & tenuior sit ad motum etiam & profluvium faciendum erit promptior. Eadem sit ratio de humoribus. Ceterum hæc materia, quæcunq; illa fuerint, cum profluvium facere nequeat absq; motu, ideo ratione huius, illam considerare possumus penes terminum à quo mouetur, penes uiam seu magnitudinem per quam mouetur,

*Materia cōsideratur ut genita & ut generanda. Accidentia materiam cōsequētia.*

*Materia ut quanta.*

*Materia ut qualis.*

*Materia ut mouetur.*

Z 2 pe-



## De Morbis Muliebribus

*Terminus  
à quo.*

*Terminus  
ad quem.*

*Improbatio  
quorundā.*

penes terminum ad quem illa mouetur, & tandem penes tempus quo illa mouetur. Si terminum à quo consideremus, esse potest corpus uniuersum uel determinata illius pars, siue Epar extiterit aut Vêtriculus uel alia pars, ubicunq; autem illa genita fuerit, generari potest, facultate labefactata & impedita. Si labefactata fuerit, causa generationis erit intemperies, quæ prout calidior aut frigidior fuerit, hanc etiam uel illam speciem materiæ generabit. unde ab intemperie calidiori & sicciori biliosa materia producet, tum ichorosa tum humorosa, à frigida & humida pituita, sicut à frigida & sicca Melancholia, quibus intemperiebus, si totum corpus præditum fuerit, profluuium fiet ratione totius, fluente scilicet tali materia in toto peccante ad uias uteri, Idem dicatur de parte. Ideò in curando profluuium, modò corpori uniuerso, modo parti determinatæ occurrendum erit. Si autem totius & partis facultas impedita potius sit fieri potest à causis internis & externis si ab internis concurrerit temperatura, ætas, habitus corporis, & similia. Vnde ratione ætatis iuuenilis generantur humores potius calidi & tenues quàm frigidi & crassi. contrarium fit in declinante ætate: si autem eadem facultas ab externis potius causis impedita fuerit, tales esse possunt necessariò & non necessariò occurrentes. Si necessariò occurrant, erunt sex res non naturales, quæ secundum omnes qualitates corpora alterare possunt. si necessariò non occurrant, medicamenta erunt, quæ pariter si calida aut frigida fuerint, corpus totum uel partem immutare poterunt, modò ad hanc modò ad illam qualitatem. Hæc rursus materia, siue in toto siue in parte generetur, consequenter à toto uel parte motus sui principium habeat, requirit etiam terminum ad quem illa mouetur, qui in muliebri profluuium alius non est quàm ipse uterus, qui imbecillior existens, dictam materiam suscipit, non tamen existit.



stimandum, utrum esse partem simpliciter imbecilem, quia tunc in qualibet muliere profluuium hoc esse deberet: non enim uterus est pars corporis à natura facta, ut totius uel partium superfluitates suscipiat, sed solum factus est, ut sit susceptivus menstrui sanguinis propter speciei propagationem. Dum autem cætera etiam excrementa recipit, præter naturam hoc illi contingit, consequenter ratione imbecillitatis illi aduenientis, siue nativa illa fuerit, hoc est, à semine & parentibus contracta siue ascititia, hoc est, post ortum acquisita, quod cum contingit, uteri fluxio statutis temporibus non fiet, sed præter consuetum naturæ tempus, sicut accidit in profluuiio hoc muliebri. Consistit autem hæc uteri imbecillitas, tum in aliis, tum etiam in nimia illius humiditate & laxitate, siue totum uteri corpus amplectatur, siue illius os tantum, & præsertim secundum uenarum orificia, & illas præcipuè per quas menstruus sanguis fluere consueuerat, quod cum euenit, sit illud profluuium in quo uterus primariò afficitur; quia deinde nullum mobile moueri potest à termino à quo ad terminum ad quem, sine medio, ideò necessarium est in hoc motu materiæ magnitudinem reperiri, super qua mobile moueatur. Hæc autem magnitudo non alia est quàm uenæ, modò totius corporis, ut si profluuium à toto fiat, modò partis determinatæ, ut in profluuiio quod fit à parte, hic deinde motus cum in instanti non fiat, sed successiuè, ideò tempus etiam requiritur, quod illius motus est mensura. Mensura autem & mensuratum cum coæquari debeant, ideò si motus & profluuium materiæ longius aut breuius fuerit, ita etiam tempus, quod illius est mensura illi proportionabitur, ut hinc oriatur profluuium modò longum modò breue, modò continuum, modò per interualla recurrens; tandem si materiam generandam consideremus, prout apta est facere & fouere profluuium, hæc genera-

*Uteri imbecillitas.*

*Via.*

*Tempus.*

*Materia generanda.*

## De Morbis Muliebribus.

*Definitio .*

bitur propter aliquam intemperiem totius uel partis, præsertim si à uictus ratione & aliis externis causis occasionem habuerit. Concludendum igitur est, quod profluuium muliebri uteri Symptoma est in exeunte mutato, prodiens à materia excrementitia tum humorosa tum Ichorosa copia & qualitate peccante, genita modò in toto modò in parte, & ad uterum propulsa.

## De Differentiis .

### CAP. LX.

*Differentia  
à forma.*

**Q**Uæ autem sint propositi Symptomatis differentia ab illius essentia, forma inquam, materia et causa effectrice colligi possunt. Merito formæ uere & legitimè species non oriuntur, sed illæ solùm quæ secū-

*Differentia  
à loco affe-  
cto .*

dum magis & minus distinguuntur, prout uidelicet muliebri hoc profluuium est functio imbecillis uel ablata retentricis, ac proinde fluxio est continua uel intermittens, copiosa & minus copiosa. Ex parte uerò loci affecti cum sit uterus ipse, dicimus tale profluuium fieri utero primario uel secundario affecto : & dum secundario afficitur, uel affici ratione totius uel partis determinatæ,

*Differentia  
à causa ef-  
fec.*

& ad partium rursus numerum, totidem species oriri. Postremò capiuntur differentiæ à causa effectrice, pro ut muliebri profluuium aliud sit à materia Ichorosa aliud, ab humorosa, & utrumq; adhuc triplicem con-

tinet speciem, prout Ichor, & humor triplex

esse potest : & rursus quicumq; ille fue-

rit, cum simplex esse possit & mix-

tus, nascetur etiam proflu-

uium exquisitum

& nothum.

De



Signa quædam distinguunt mulieb<sup>re</sup> hoc profluuium. Sab alio quocunq; quædam enumeratas species ab inuicem seiungunt. Distinguemus inprimis profluuium mulieb<sup>re</sup> à profluuiio mensium, per materiam quæ per uterum egreditur: nam in profluuiio mensium, egrediens materia sanguinea est: in profluuiio autem mulieb<sup>ri</sup> exquisito, alterius est generis. Dico exquisito ad differentiam nothi, in quo sanguis exire potest, nunquam tamen sincerus, ut in profluuiio mensium exquisito contingit, sed alteri materiæ semper permixtus erit. Distinguetur autem à profluuiio mensium notho, ex profluuiio sanguinis copia minori exeuntis: quoniam in mensium profluuiio semper sanguis dominatur alteri materiæ sibi permixtæ, contra in profluuiio mulieb<sup>ri</sup> contingit, in quo sanguis semper in minori copia exit, in maiori uerò copia alia materia: præterea distinguemus, quoniam in profluuiio mensium notho, exiens materia à prædominio sanguinea existens, grumescere potest. At in profluuiio mulieb<sup>ri</sup>, in quo minor est quantitas sanguinis, maior autem alterius humoris, fluida potius permanet: Generatim uerò cognoscemus genus hoc profluuii ex totius corporis de coloratione, præsertim si progressum fecerit, oculi etiam tumidi erunt, & quandoq; cum dolore, pedes quin etiam & ipsi intumescere uidebuntur, inappetentia oritur, & spirandi difficultas quandoq; accedit, insuetusq; animi mœror comitatur. Distinguemus deinde profluuium mulieb<sup>re</sup> à profluuiio solius uteri, sumptis signis à copia & motu exeuntis materiæ. Nam in profluuiio uteri exiens materia pauca est, cum solius uteri excrementum sit. Con

tra in

Signa in  
dup. diffe.  
Signa distin  
guentia à  
profl. mēs.  
Prima dif  
fer.

2. differ.

Signa profl.  
in genere.

Differentia à  
profl. solius  
uteri.



## De Morbis Muliebribus. 20

*Differentia à  
profl. ratio  
ne ulce.*

*Signa differ.  
formalium.  
Signa mate-  
rialium.*

*Signa mate-  
ria facen-  
tis proflu-  
uium.*

*Signa mate-  
ria alim.  
Signa mate-  
ria ex-  
crem.*

*Signa mate-  
ria ichoro-  
se.*

tra in muliebri profluuiio, materia copiosior effluit, cum potius aliundè quàm ex solo utero, ueniat, & propterea in hoc profluuiio licet per uterum materia exeat, ipse tamen secundariò potius afficitur, cuius contrarium contingit in profluuiio vteri. Seiungitur autem ab eo profluuiio, quod fit ratione ulceris, quia in hoc exiens materia saniosa & purulenta est, imò cum aliquo fœtore, exitq; cum dolore, nec possunt uiri congressum sustinere, & præsertim si ulcus in collo matricis fuerit: In fluxu autē muliebri excrementum erit citra saniem & dolorem, uiriq; congressum benè patientur, & in maiori copia materia effluet. Cognoscemus deinde differentias: & primò formales ex relatione patientis & ex nobis ipsis uidentibus. Cognoscemus autem materiales: & primò si uterus primariò afficiatur, quia signa aderunt intemperiei uteri humiditatis & laxitatis eiusdem, præcessere etiam causæ laxantes, & secundum totum & alias partes benè habebit. Vbi autem nullum ex propositis signis adfuerit, indicium erit, affectum locum alium esse ab ipso utero, qui si fuerit pars, & primò caput, obseruabimus consuetam eius euacuationem per nares & os suppressam esse. Si fuerit Epar, uentriculus & alia pars, ad signa illarum affectarum partium recurrendum erit: At illis benè habentibus in totum causa referenda erit, quod est cacochymum uidebitur. A qua autem materia hic fluxus pendeat, cognoscemus, quia si febrem ardentem subsequatur, indicium erit, fluxum istum esse potius colliquatium, cum ratione huius caloris febrilis, pinguior pars, deinde carnosum genus colliquetur, quod profluuium citò solet ob alimenti defectum corpus emaciare. Si autem materia excrementitia fuerit, proposita signa non aderunt. An uerò materia sit Ichorosa uel humorosa, distinguemus per tenuitatem & crassitiem eius ut tenuior & Ichorosa, instar aquæ effluat, crassior autem & humorosa instar mellis.



lis. Dum autem ichor exit, cum multiplex esse possit, singulos cognoscemus, respiciendo ad eorum colorem & modum exeundi, imò ad totius temperaturam, ætatem, corporis habitum & prægressam uictus rationem. Inprimis si fuerit ichor sanguinolentus uerget ad aliqualem rubedinem, si bilis ad citrinitatem, si melancholia ad æruginem, si pituita ad Albedinem. Penes modum exeundi si ichor fuerit melancholiæ fecalis, pituitæ dulcis aut sanguinis, citra dolorem & molestiam exhibit. Si autem ichor fuerit biliosus uel adustæ melancholiæ aut falsæ pituitæ, cum molestia effluet. Dictas autem species cognoscemus ex colorum diuersitate, quæ si impermixtæ singulæ fuerint, proprium etiam & determinatum colorem præ se ferent, Si autem permixti fuerint, ut dominantem colorem per sensum cognoscere non possimus, debemus linteolum mundum in tali humore madefacere, mox igne autem sole exicare, ita ex colore in linteolo derelicto humorem exeuntem & dominantem distinguemus. Eadem sit ratio, si exiens materia humor fuerit.

*Signa singulorum ichorum.*

*De Curatione.*  
*CAP. LXII.*

**S**Copi propositi in sermone de profluuio mensium, huic quoq; Symptomati, communes esse uidentur: nam si in hoc profluuio inprimis ad continentia respexerimus, cum uterus sit humidiori intemperie detentus, indicabit auxilium alterans in contrarium, si alterius causa uterus afficiatur, siue corpus uniuersum siue pars determinata fuerit, modò huic modò illi occurrendum erit. Quare si totum concurrat, ratione caloris colliquantis, ut in ardente febre contingit, auxilium indicabitur ua-

*Scopi curat.*

Aa lenter

## De Morbis Muliebribus

lenter ac citò refrigerans ac humectans. Si concurrat de terminata pars, quia illius facultas sit labefacta, cum ab intemperie labefactetur, quæcunq; illa fuerit, indicabit auxilium alterans in contrarium si eadem impedita potius fuerit, cum impediri possit à copia & qualitate materiæ. ex parte copię euacuans auxilium significabitur. Ex parte autem qualitatis manifestæ, siue prima siue secunda fuerit auxilium alterans in contrarium orietur, quemadmodum ratione occultæ Alexipharmacum requiratur. Eadem si consideretur ratione qua mouetur uel quiescit, si fluxa fuerit, auxilium indicabit euacuans deriuando, si in fluxu, reuellendo.

### De Pronostico.

#### CAP. LXIII.

**H**ic fluxus modo est curabilis modò non & qui curabilis est modò cum facilitate modò cum difficultate. Distinguemus autem discurrendo per propositas differentias & illarum causas, pro quarum diuersitate in numero magnitudine uehementia & materiæ essentia, diuersimodè prognosticandum erit. Vnde si fluxus alimentalis fuerit & colliquatiuus, si ardentem febrem sequatur, si cum uehementia fiat, ut medicamentis etiam non cedat, uiresq; imbecilliores assiduò reddat quid aliud prognosticandum erit, quàm eius uitam in magno discrimine positam esse. Si autem alterius materiæ excrementitiæ fuerit, etiamsi ratione huius, melius sperandum sit, non tamen symptoma erit contemnendum: quoniam ubi diu perdurauerit, consuevit miseris mulieres ad tabem primò, deniq; ad mortem perducere. Omitto alia multa incommoda, quæ inde sequi solent: quoniam steriles



riles euadunt cum ob superfluum vteri humiditatem euaculatum semen non detineant, secundum etiam corpus totum foedari solent, tumidae euadunt, pallent & moestae fiunt, lumborum grauitate & dolore detinentur, quod profluuium si fuerit materiae potius acris quam dulcis & benignae, qualis est biliola, atrabilis & salsa pituita, praeter id, quod cum dolore exhibet, imminet etiam, ne erodendo in partibus vteri vlcus oriatur. Quod deinde si diutius perdurauerit in malignum etiam & cancrum de genere solet. At si exiens materia pituita fuerit dulcis, exigua, per interualla potius exiens corraspondeatq; temperaturae, aetati, corporis habitui, praegressaq; uictus rationi, maiorem salutis spem polliceri poterit.

*De Materiis Auxiliorum.*

*C A P. LXIIII.*

**I**N curando proposito affecto si sanguinis plenitudo fuerit, & nihil prohibeat, sanguis erit mittendus. Ad est autem in eo potissimum profluuium, quod ab Ichore sanguineo fit, ad differentiam caeterarum materierum, quae a sanguinis natura longe distant, ratione quarum nulla habetur euacuandi sanguinis indicatio. Dum autem conuenit uenam aperire, ea eligenda erit, ratione cuius sanguis euacuetur, & ab utero simul reuellatur, huiusmodi erit uena cubiti. De quantitate autem, tempore & modo, nihil dico, cum eadem sint seruanda, quae antea dicta fuere, ob eandem rationem nec de cucurbitulis & aliis auxiliorum materiis ad hoc praesidii genus pertinentibus, agendum erit: quare ad pharmatiam descendendum.

*Sang. mis.*

*Libro ad  
Posthumum  
cap. 8.*

*Locus.*

*Quantitas.*

*Tempus.*

*Modus.*

*Cucurbitule*



## De Morbis Muliebribus

### De Pharmacia .

#### CAP. LXV.

**C**um pharmacia & totum respiciat & partem, utraq;  
in hoc Symptomate locum habet. Quare si corpus  
totum cacochymū fuerit, ratione huius præmittenda erit  
totius euacuatio & si opus fuerit materiam præparare,  
*Lenientia.* aliumq; lenire, præparantibus & lenientibus priori  
*Clyst.* loco utendū erit, ut pro lenitione interdū clysteriis uti cōue-  
*Vomitoria.* niat, quandoq; uomitoriis, nonnunquā ēt illis lenientibus,  
*Lenientia p* quæ per os exhibentur, ut si primæ istæ superfluitates  
*secessum* in uentriculo potissimum redundauerint, uomitoriis edu-  
*educ.* cendæ sint, si in infimis intestinis clysteriis, si ubiq;, me-  
*Præparātia.* dicamento per os administrato, omnes erunt per seces-  
sum euacuandæ, de quorum materiis cum copiotē actum  
antea fuerit, plura hic non proponam. Præparantia autē  
locum habebunt in eo muliebri profluio, quod fit à ma-  
*Purgantia .* teria humorosa & crassa, cuiusmodi est pituita aut Melan-  
cholia, de quibus pariter supra tractatum fuit, mox mate-  
ria erit purganda per secessum lotium uel sudorem, prout  
ut in hac uel illa parte fuerit, uel in hunc uel illum lo-  
cum raptum magis habuerit: id tamen aduertendum  
*Ordo .* quod ordinem dictorum uacuantium respicit, quod ubi  
in toto fuerit cacochymia, semper ab euacuantibus per  
secessum, incipiendum erit, mox ad Diuretica & diapho-  
*Lib: de præ* retica deueniendum. qua medendi ratione Gal. etiam  
*cog. ad Po* usus fuisse uidetur in Boeti uxore, cui post alui purgatio-  
*lib. c. 8.* nem factam, euacuantia per lotium adhibuit, deinde ea  
etiam, quæ per cutim materiam educere poterunt: qui-  
*Roborantia.* bus ita administratis illam etiam ab hoc symptomate li-  
berauit. Expurgato uniuerso corpore, roborantibus uten-  
dum erit, atq; istis uariis, pro loci affecti uarietate &  
causa-



causarum producentium hoc Symptoma, unde si causa huius fluxus uentriculus fuerit, ob eius facultatem labefactam ab intemperie frigida & humida, occurrendum erit cum calefacientibus & exiccantibus, intus & extra admotis, quibus Gal: etiam in vxore Boeti usus fuit, quæ ob copiam aquosi humoris, imum uentrem tumidum referebat, ut prægnans omnibus uideretur. copia enim huius humoris intus cohibita, & modica fluente, necessarium erat, uterum & uicinas partes in tumorem attolli. In quo casu nequaquam conuenit prius astringentibus uti, quia materia adhuc magis detineretur hydro-pemq; producere posset: sed præmissa diligenti purgatione totius, tumor ille discutiendus erit, cum calefacientibus & siccantibus: ideo iubebat marina arena corpus totum calcificari & siccari, frictiones etiam adhibebat, ut excrementa plurima ad cutim attracta resolveret, imò melle etiam cocto, corpus totum perfricabat. Vbi igitur radix huius mali fuerit frigidior uentriculi intemperies, cum calefacientibus, roborandus erit, in quem usum probatur ius galli præparati & alterati cum mentha, absinthio, nardo, nuce myristica & similibus Aromatis, Potus etiam aquarum thermarum conducet, & extra eorundem, stillicidium conueniet, & efficacius erit si cum uino paratum fuerit, in quo tamen prius infusa sint, mentha, betonica, absinthium rosæ & similia: uel eorum loco fieri poterit ex oleo de spica unguentareorum masticino, de mentha & similibus. Probantur etiam compositiones, quæ paratæ habentur ex aromatico rosato, diatrionpip: imò ex theriaca Mitridato & similibus. Omitto inunctiones, fomenta & alia, quæ ex propositis materiis parari pariter poterunt: A pari si in causa fuerit cerebrum, post totius purgationem caput quoq; per consueta loca expurgari debet, potissimum autem per nasalia, quib. de-  
nuando materia caput replens educitur. Materia autem  
huius

*Calefac: &  
siccantia.  
Frictiones*

*Materia au-  
xilij cale-  
facientis  
ius galli.  
Aqua  
therm.  
Stillicidiū*

*Cōfectiones.  
Iniunctio-  
nes.  
Cura nitio  
cærebri.  
Nasalia.*



## De Morbis Muliebribus. 25

huius euacuantis esse poterit succus betonica, maiorana, salvia, hyssopi, si tepidè ad intra nares attrahatur. Et si ualentioribus fuerit opus, infusione Agarici uti poterimus, Et si adhuc potentioribus uti expediet, elaterium

*Masticat.* lacte permixtum admouere poterimus. Omitto masticatoria tanquam suspecta, ne materia ad inferiora magis præcipitetur. Quo tempore insensibiliter etiam euacuantibus uti poterimus, quemadmodum si lotio paratur ex lixiuio alterato cum cinere, ex betonica, salvia, stoechade, cypresso & pineis eius: & si opus fuerit Agaricum etiam addere, efficaciorum lotionem reddemus. Ex quo stillicidium etiam super commissuram coronalem facere poterimus, prius tamen capillis abrasis, qui ad eam partem spectabunt, imò post lotionem eidem parti applicare poterimus, puluerem ex mirra mastiche, stoechade, cubebis, rosis an. partes æquales accipientes, & ut diu illi loco adhæreant, superponere poterimus ceratum sacrum. Qui plura cupit adeat tractatum de catharro. Si profluuium fiat Epatis uitio, labefactata illius facultate à frigidiori intemperie, ratione cuius frigidiore & pituitosi humores aggregentur, calefacientibus & roborantibus tale uiscus progrediendum erit, quorum materia esse poterunt trochisci de lacca, de Alanda ex Cyphoide, theriaca, mitridatum, tryphera magna & similia. A pari si idem Epas concurrat per calidiorem intemperiem acriores humores generando, illius feruor cum moderatè refrigerantibus contemperari poterit. Idè omnia cichoracea conducent, serum etiam caprinum, & præterea aqua etiam B. Virginis. Idem dicatur de his quæ extra admoueri possunt. Si deinde hoc profluuium fiat solius uteri uicio, illius facultate labefactata à frigida & humida intemperie, ratione cuius proprium alimentum exactè coquere, retinere & in propriam substantiam uertere nequeat, sed superflua quædam humiditas supersit, quæ uenarum ora laxans,



rans, sibi etiam aditum paret, ut per uterum sensim distillet, & stillando partes illas continuo madefaciat, tunc merito genitæ & hærentis superficiei uteri, euacuandum erit. Ex parte uero materiæ generandæ, robur utero addendum, calefaciendo & siccando Quare pro uteri mundificatione uti poterimus clystere facto ex decocto Betonice, mercurialis, matricariæ, arthemisiæ, bistortæ, spicæ nardi & similibus in multa decoctis uel aqua succharata. In eundem usum pessaria etiam parari poterunt ex bombyce in dicto decocto imbuta & contusa, & ad formam digiti redacta, mundificato utero, & ab omni sorde depurato, roborandus erit cum exiccantibus, quemadmodum si intus clystera ex eodem decocto parata iniiciantur: uel etiam ex eorundem succis, qui efficaciores erunt. Suffumigia etiam ex eisdem fieri poterunt, semper illa addendo, quæ Aromatica etiam sunt. In quem ipsum usum tales trochisci etiam parari poterunt, accipientes fol: Arthemisiæ, matricariæ, mirrhidis, pineorum cupressi macis, nucis moschata, styracis, rosarum rubearum, ligni aloes an. drag. i. quibus puluerisatis cum mucilagine tragacanthi q. s. permixtis, trochisci parabuntur: & proiectis super prunas accensas, suffumigium ipsi utero paratur. Omitto sessiones, quæ in eodem decocto parari poterunt, cui si uinum additum fuerit, adhuc efficacius & utilius euadet, præsertim si dulce fuerit. In cuius administratione communiter practicautes in errore esse uidentur, qui dum uino utuntur, uolunt in illo ebullitionem materierum fieri, cum ratione ebullitionis pars tota tenuior & spirituosâ uini in qua sola agendi omnis potestas residet, euanescat. Quod autem remanet, nullam uim retinere uideatur, hinc est, quod uinum post ebullitionem omnem odorem, saporem & fragrantiam amisit, & alienas qualitates recipit, ob quam eandem causam longè deterius illi agunt, qui lignum Guaiacum præparantes

*Clyster mundificans.*

*Pessaria.*

*Clyster robor.*

*Suffumigia.*

*Troc.*

*Sesiones.*

*Error practicum.*



## De Morbis Muliebribus.

*Inunctiones*

*10. de Sim-  
plic. mel.  
Materia au-  
xili ad-  
string.*

rantes uel fassam, in uino ebullitionem faciunt, dicentes, se uelle labefactatum uentriculum roborare, quo fine omninò frustrantur, quia per ebullitionem uinum amittit omnem roborandi facultatem, & accessendo eidem potius obesse quàm prodesse potest. Sed dum eo uti uolumus, consultius est, decoctionem in aqua prius facere, deinde post factam decoctionem, uinum addere in quo eadem materix fuerint prius macerate. Omitto etiam inunctiones, quæ parari poterunt ex oleo de spica, ex oleo de nucis myristica expresso, ex styrace & similibus, intus uerò præbere poterimus conseruam arthemisiæ, matricariæ, betonicæ, roris marini, diamuschi, Elect: de gemmis, Elect: Aromaticum Eryngium, & similia. Tandem ad astringentia deuenire poterimus. Inter cætera commendatur à Gal: coagulum leporis, aceto bibitum, in cuius defectu tantundem ualebit coagulum hoedi, ouis, uituli, cerui & similibus, Si ualentioribus opus fuerit, ad ea recurrendum, quæ in profluuiis menstruorum fuere proposita, quibus omnibus diligens uictus ratio perpetuò addenda erit.

## De Gonorrhoea. CAP. LXVI.

*6. de loc. aff.  
6.  
Nomen.*

**Q**Uod latini uocant profluuium seminis, græci Gonorrhoeam dicunt, & est ille affectus, in quo semen assiduò effluit, & præter uoluntatem, ac uoluptatem, quod symptoma, etiam si fœminis ac uiris commune sit, frequentius tamen in fœminis quàm in uiris fieri consuevit: & ratio ea esse potest, quia fœminæ semen quod habent, crudius est, aquosius, tenuius & fluidius, consequenter ad motum promptius. Dum autem uiris

accidit,



accidit, iunioribus & ueneri magis additis, cole tamen nō  
extenso magis aduenit, in quibus partes spermaticæ imbe-  
cilliores fieri solent, ut ex longa consuetudine, læsione il-  
lis superueniente, ad easdem etiam humores abundan-  
tius confluunt. Hoc itaq; loco de Gonorrhoea sermo  
est faciendus, ut scēminas potius, quā uiriles respicit, cuius  
forma generica à prioribus speciebus profluuii non  
distinguitur, cum symptoma pariter sit in exeunte muta-  
to, in quo immodicè exit quod retineri deberet. Distin-  
guitur tamen penes ipsum mobile, quod humor est ex-  
crementitius, sed pro speciei conseruatione utilis, cuius-  
modi est semen. Quare. Gonorrhoea erit effusio seminis,  
quæ materia licet puri & saniei, quæ ex utero exulcerato  
exire solet, sit ualdè similis, ab ea tamen colore odore, mix-  
tione, modo exeundi, & uiribus longè distabit: pus enim  
malum habet odorem, cum dolore exhibit, sanguini exiguo  
permixtum erit, quia ulcus uteri sequitur: semen autem  
colorem album & simplicem habebit, malo odore expers  
erit, & citra dolorem exhibit. Accedit, quòd immodera-  
tū fluxū seminis totius corporis tabes comitatur, qđ non  
fit cōtingit in fluxu alterius materiæ. Semen præterea dū  
effluit, potest uoluntariè & citra uoluntatem exire. Si uo-  
luntariè fluxerit, id fit ex præcedente coitu, & cum uolu-  
ptate, cuiusmodi non est in gonorrhoea, sed citra uolun-  
tatem & uoluptatem omninò fit, ut gonorrhoea non so-  
lum sit effusio seminis, uerum etiam inuoluntaria. Hæc  
rursus inuoluntaria seminis excretio si in uicis conside-  
tur, fieri potest cum tensione, & citra tensionem pudendi,  
quæ cum tensione fit, est genitalium partium ueluti con-  
uulsio quædam, in qua motu quodam uiolento & præ-  
ter naturam ad propria principia tegrediuntur, quæ con-  
uulsio non tantum in uasis seminalibus fieri potest, uerū  
etiam secundum corpus uniuersum, sicut in Epilepsia ma-

Bb gna

*De essentia*

*3. de sympt.*

*caus. c. 2.*

*Forma.*

*6. de loc. aff.*  
*cap. 6.*

*3. de symp.*  
*caus. 4.*

*2. de causis*  
*sympt. 6. de*  
*loc. aff. c. 5.*



## De Morbis Muliebribus

3. de symp. *caus. c. 2.* *14. de eusu part. c. 10.* *Locus affec.* *Modus gene rationis .* *Causa effic.* *Vasa 2. affi- ci .*

gna contingit, in qua corpus totum secundum nervos & musculos omnes conuellitur, ut muscoli etiam, qui sunt circa uasa spermatica, pariter conuellantur, cum seminis emissionem inuoluntaria. Imò ob hanc totius conuulsionem, non solum semen emittitur, sed quandoq; etiam lotium & cætera alui excrementa, quod minime contingit in gonorrhoea propriè dicta, de qua hic sermo habetur, in qua semen effluit citra totius conuulsionem. Cuius symptomatis locus affectus non pudenda sunt, sed uasa potius seminalia, in quibus sanguis benè elaboratur & spirituum copia refertus, recipitur, ut ab insita eorum ui ulterius excoctus, in seminis naturam degeneret, quod munus, cum in instanti fieri nequeat, sed in tempore, idè in illis tam diu detineri debet quo ad retentio coctioni coæquetur. Ut autem detineatur, à natura multis plexibus conformata fuere, qui tandem ad testes terminantur, quibus si laxitas præter naturam adueniat debilitata eorum retentrice, foras effluet Afficiuntur autem hæc uasa gonorrhoea detenta, morbo in mala cõpositione, & eo præsertim, qui in uis plus æquo dilatatis consistit, quæ dilatatio fit propter earum partium intemperiem humidiorē, & laxiorem, ratione cuius facultas retentrix susceptam materiam tam diu retinere nō potest, quo ad coctio absoluitur: Et expultrix pariter tam diu non quiescit, ut integrè coctioni satisfacere possit ceterum autem dicta uasa dupliciter affici possunt, primariò & secundariò. Primariò afficiuntur, quando reliquum corpus benè habet. Secundariò uerò dupliciter læduntur, gratia totius uel partis determinatæ. Gratia totius fit, quando facultas coctrix, quæ ubiq; celebratur, labefacta est ob aliquam intemperiem, & præsertim frigidiorem, ratione cuius nec integra coctio fit, ac proinde nec perfectæ nutritio, sed diminuta. Quod autem superest & partium substantiam acquirere non potuit, ad uasa



uasa seminalia protruditur, & ab illis foras effluit, quæ materia nec sanguis sincerus est, quia ex coctione rubicundum colorem amisit, nec exactum semen, quia ex di-  
minuto calore ultimam formam seminis non acquisiuit, sed maiori ex parte erit materia pituitosa, colore & consistencia similis ipsi semini. si autem causa partis determinata eadem uasa afficiantur, fieri potest ob cerebri læsionem & potissimum secundum illius uentriculos, ut in Epilepsia contingit. Cum igitur Gonorrhoea fiat ob dilatationem orificiorum uasorum seminalium, dilatari poterunt facultate labefactata uel impedita. Si labefactata fuerit, fit ob intemperiem, ut merito labefactatæ retentricis, concurrat humidior intemperies: merito autem labefactatæ expultricis concurrat calidior. Si autem impedita fuerit, impediri potest ratione totius & partis, ut à nimia copia grauante uel à uiciata qualitate irritante uasorum expultrix expellat dictam materiam, unde gonorrhoea ratione copiatæ facta, locum habebit in corporibus sanguineis, bonis & copiosis succis refertis, & in illis etiam, quæ præter consuetudinem uenerem amplius non exercent: quæ autem sit qualitatis potius ratione, esse potest qualitas manifesta & occulta. Manifesta erit, quæ calidior uel frigidior intemperiem sequitur, ratione caliditatis acrimoniam acquirit, quæ assidue uasorum expultricem stimulare potest. Idem ex Epatis calore & renum etiam, dicta materia illa qualitate affici poterit. Si autem frigidior sequatur, tunc fiet ex nimia tenuitate & fluxibilitate materiæ, quæ ad hanc fluxionem est ualde parata. Si deinde fiat ratione occultæ qualitatis, erit quemadmodum Gonorrhoea Gallica, quæ fit à materia uirulenta, afficiente eadem uasa spermatica, quæ prauam illam qualitatem contrahendo, quicquid in illis colligitur, ut semen euadat, in tetrum & foedum uirus conuertitur, cui noua accedens materia à priori coinquinatur.

Bb 2 tur

*Dilatationis uasorum causa.*

*Fac. labef.*

*Fac. impedita.*

*Copia*

*2. de sem. Qualitas manifesta.*

*Qualitas occulta.*



## De Morbis Muliebribus

*Causæ exter.* tur & nescio quid malignitatis ac putredinis concipit, ad quam acrimonia consequitur, cuius causa solet per transeundo, non solum dolorem sed excoriationem uis illis inferre. Omitto causas externas, tum necessario tum non necessario occurrentes, quæ omnes producendo, fouendo & augendo dictas intemperies concurrere possunt ad generationem dicti Symptomatis.

### De Differentiis CAP. LXVII.

*Differentia à forma* **A**B explicata essentia ad species eius enumerandas descendo, quæ à forma, loco affecto & efficientibus causis capiuntur. Vt ex parte formæ statuendum sit, quod gonorrhoea, ratione qua est fluxio seminis, uel est solius seminis impermixti effusio, uel permixti & alteri materiæ coniuncti. Hinc oritur Gonorrhoea exquisita, & & notha, & ex hac pro permixtæ materiæ multiplicitate, multæ differentiæ oriuntur. Ex parte uero loci affecti, cū sint uasa seminalia, dicimus gonorrhoeam fieri uasis seminalibus primario affectis, uel secundario: & si secundario, adhuc dupliciter prout uel corpus totum afficitur, uel pars determinata, & si pars determinata, esse potest Cerebrum, Epar, uentriculus, renes & huiusmodi: A causa pariter effedrice, tot nascentur differentiæ, quot sunt causæ enumeratæ, ita ut gonorrhoea alia sit quæ labefactata ualorum facultate oritur, alia in qua impeditur, & quæ sit ob labefactatam facultatem triplex erit, pro ut labefactari potest ab intemperie, calidiori frigidiori & humidiori, si ortum habeat ab eadem facultate sed impedita multiplex adhuc esse potest, pro multiplicitate impimenti, pro ut impedi potest à causis externis uel internis. Et si ab internis, alia sit, ratione copię materiæ grauantis, alia ratione malæ qualitatis, quæ potest esse manifesta



manifesta & occulta. Si manifesta, erit gonorrhoea facta ab acrimonia seminis, à calidiori intemperie producta, uel ab eiusdem tenuitate & aquositate, à frigidiori & humidiori intemperie causata. Si occulta, erit gonorrhoea gallica, quæ à uirulenta materia etiam fit.

De Signis. CAP. LXVIII.

Gonorrhœa simpliciter cognoscemus ex patientis relatione, nobisq; ipsis uidentibus, differentias uero, distinguemus ex multis signis, de quibus Gal: passim est loquitur, in primis si gonorrhœa sinceri seminis fuerit, diu illam sustineri non poterit, quin corpus uniuersum non contabescat, & tandem est moriatur. At si alteri materiae permixtum fuerit, cuiusmodi est pituitosa, quæ in tertia coctione in substantiam partium transmutari non potuerit, minorem noxam patientur, & praesertim si maior fuerit copia huius materiae, seminis aut minima: quamuis. n. isti est sensim emaciantur, diutius tamen superstitibus esse possunt, magis. n. debilitatur patiens ex gutta seminis sinceri effluentis, quam ex integra uincia alterius humoris: quæcunq; autem fuerit ista fluxio, cum semper fiat uasis seminalibus affectis, atq; his modò primò modò secundario, distinguemus, quia si cæteris partibus patiens bene habuerit, indicium erit, dista uasa primario affici. Si uero alterius ratione ledantur, cum lædi possint ratione totius & partis, cognoscemus recurrendo ad signa indicantia corporis totius læsionem ut ex febre contingit, uel partis determinatæ. Distinguemus tandem differentias ab effectrice causa, & primò si fiat ratione copiosae materiae, ex habitu corporis sanguineo, & plethorico, ex prægressa uictus ratione laudabiliu ciborum ex uitæ innocentia, & praesertim si ueneri assueti antea fuerit, quod semper si exquisitum & impermixtum fuerit, illius consistentia, color & proprius odor significabunt, modus est exeundi, quia ci

Signa in generi.

6. de loc. aff.

3. cap. 31.

6. de sanit.

tu.

Signa gen.

exquisita.

Signa gen.

noth.

Aristoteles

de gener.

animal.

Signa gen.

per essen-

tiam.

Signa gen.

per consen-

sum.

Signa ratio-

ne copia.

tra do.



## De Morbis Muliebribus. 20

*Signa uicia-  
te qualita-  
tis.*

*6. de loc. aff.  
cap. 4.*

tra dolorem effluet, & nisi fluxio ista in longius protrahatur fuerit citra detrimentum fieri poterit. At si à uiciata eius qualitate fiat, & primò ab occulta exiens materia citrini erit coloris, mali odoris, & uirulentis gallicis signa aderunt. Si autem oriatur à mala qualitate manifesta, cum esse possit acrior & aquosior, si fiat ratione acrimoniae conqueretur patiens de dolore quodam mordicante, cui addas temperaturam calidiorē, etatē iuuenilē, & prægressam uictus rationem calefacientem, uenerisq; abusum. Si potius fiat à materia aquosiori & tenuiori, substantia ipsius declarabit, quia fluidior erit instar aquæ mellis. Modus exeundi erit sine dolore, quibus accedit frigidior temperatura, & prægressa uictus ratio consimilis. Si deniq; fiat ob conuulsionem, fluxio erit cum tensione pudendi.

## De Indicationibus. CAP. LXIX.

*Indic. curat.*

*De Prognostico.*

**S**I gonorrhoea fit ob apertionem orificiorum uasorum seminalium, dilatatio ista erit adstringenda, roboranda & ad naturalem statum & constitutionem deducenda. Hunc scopum assequemur, remouendo causas talem dilatationem facientes. Quare si fiat ex nimia copia seminis, indicabitur auxilium minuens. Si ob uiciatam eiusdem qualitatem, hæc si occulta fuerit & Gallica, Alexipharmacum auxilium requireret. Si à manifesta qualitate, hæc si calida & aeris fuerit, indicabit auxilium contemperans. Si ab aquositate & nimia tenuitate, cum fiat à coactrice facultate labefactata, ob frigidiorē intemperiem, indicabitur auxilium calefaciens & roborans: quæcunque autem fuerit, non erit malum spernendum, cum progressu temporis ad tabem & mortem perducatur, quod modò citius, modò tardius efficit, pro differentiarum diuersitate. Vnde si gonorrhoea fuerit sinceri seminis, si progressum etiam fecerit, lethalis erit. Si alteri materis permisceatur.



misceatur, recensq; fuerit, minus periculosa erit. Si uasa  
feminaria primariò afficiantur, peior altera erit, in qua ea  
dem uasa secundariò læduntur, & inter has maiorem fa-  
luti spem ea pollicebitur, quæ fit per consensum partis,  
quàm totius, cæteris tamen sèper paribus. Si dñas a eâ ef-  
fectrice desumptas mutuò conferamus, salubrior illa erit,  
quæ fit à copioso semine, imò hæc temerè suppressenda  
non erit: quæ aut fit à uitiata qualitate, & primò uirulen-  
tà, erit oïum pessima, quia materia ista, non modò mani-  
festis, sed occultis èt qualitatibus peccat. Si aut fiat ob so-  
lam seminis caliditatem uel tenuitatem & aquositatē, non  
erit arduum alterare in contrarium. Illa aut erit curatu  
difficilior & mulieri molestior, quæ ab insigni calore &  
acrimonia producitur, quia ratione huius non solum do-  
lor infestat, sed periculum etiam iminet, ne uia per quas  
illa transit, excoriationem & ulcus patiantur.

*De Materijs Auxiliorum. c. LXX.*

**C**vm gonorrhœa sit tàm multiplex, non unica cu-  
randi ratio illi satisfaciet: in illa. n. gonorrhœa, quæ  
à copioso semine producitur, cū hæc non fiat sine copia  
sanguinis, ideò missio eius conueniet: locus tñ uarius  
erit, pro uaria illius subsistētia, ut si in toto corpore æquè  
& simpliciter peccauerit, cōis uena aperienda sit. Si autē  
totius plenitudo oriatur à plenitudine partis determina-  
tæ, ut ob suppressa menstrua inferior potius uena secan-  
da erit. Quantitas uerò, tps & modus ex alijs dictis pa-  
tent, & eadē de cucurbitulis ratio habenda erit. Quo ad  
materias pharmaceuticas, supposita imprimis totius eua-  
cuatione, de localibus cogitandū erit, quæ uaria sunt pro  
specierū Gonorrhœæ uarietate. Quare si ea occurrat, quæ  
à copioso semine fit, conuenient illa oïa quæ copiosi se-  
minis generationem prohibere possunt, quarum alia id  
manife-

*Sang. missio.  
Locus.*

*Quantitas  
Tempus  
Modus.  
De Pharma-  
cia.  
Localia:*



## De Morbis Muliebribus. 20

<p><i>Materia au</i> <i>xilij prohi</i> <i>bentis gen.</i> <i>semi.</i> <i>6. de tuēda.</i>  <i>5. de simpli-</i> <i>ci medi.</i></p>	<p>manifestis qualitatibus pstant, aliqua occultis. Et quæ manifestis agunt, quædam refrigerant, ut semen lactucæ, portulacæ, nymphææ, cannabis, papaueris albi, agni casti, radix halicacabi: his accedunt semen uiticis ac rutæ, quorū assiduū usum Gal. etiam cōmendauit: quædam agunt exiccando, ut Cyminum, Calamentum, mirrha euphorbium, ruta, quæ licet ealida sit, minuit tñ semen, tum exiccando tum coagulando: ideò ab Alexandro &amp; aliis ruta enumeratur inter eas materias, quæ occulta potius q̃ manifesta qualitate agit. Hæc aut &amp; similia uariis formis propinari pnt. Primò in austero uino infusa, in puluerem redacta, in pillulas, in trochiscos, electuarium &amp; similia: quem admodum si acceperimus, seminum rutæ, agni casti ana drag. ii. lactucæ, thuris, mirrhæ ana drag. i., puluerizentur oīa, &amp; cum melle despumato q. s. misceantur &amp; fiat electuarium, cuius Dosis singulo manè erit ad drac. mediā &amp; scrup. duos: quibus alterantibus frigidis &amp; humidis illa et gonorrhœa tolletur, quæ à seminis acrimonia fit, euacuant in primis genitā materiā, deinde calidiore partis uel totius intemperie moderantes cū aquis stillatitiis cicchoraceorum, cum sero caprino, cum aqua B. uirginis &amp; similib. iam dictis, &amp; ubi aderit et renum caliditas, rōne cuius, non solū materia acrior fiat, sed ad uasa copiosius attrahatur, poterimus regionē illā inungere cū ol. ros. mirthino, nenupharino, quibus si addiderimus rosarū rub. micthi, lapidis hæmatidis an. scrup. i. &amp; ceram q. s. lenimentū parabimus. In eundē usū conferent troch. de ros. de cāphora, qui parati habentur, si singulo mane scrup. i. exhibuerimus: parare et ex nobismet ipsis hunc in modū poterimus, accipientes sem: lactucæ, papau: albi, ros. rub. portulacæ, an. scrup. i. Cāphoræ gr. ii. quibus oībus puluerisatis, addimus mucilaginis sem. Citoniorū q. s. &amp; trochisci formantur pondere scrup. i. Si deinde gonorrhœa fiat ex seminis tenuitate &amp; aquositate, cū tale semen ab humidiore</p>
<p><i>Forma.</i></p>	
<p><i>Electua.</i></p>	
<p><i>Aqua.</i></p>	
<p><i>Lenim.</i></p>	
<p><i>Troc.</i></p>	
<p><i>Cura gen. ex</i> <i>tenui. semi.</i></p>	



midiori uasorū intēperie producat, rōne cuius retētrix proprio munere frustratur, cū calefacientibus & roborantibus occurrēdū erit, siue hoc contingat, quia uasa dicta primariō affecta sint, siue aliorū gratia: quare inter illa quæ intus exhiberi possunt, p̄stabit vti iure galli p̄parati cū mentha, absinthio, betonica, maci, coriandris p̄paratis, rosas siccis, piēis cupressi & similibus. In eundem usum cōueniet conserua de mentha, de Absinthio, de betonica, dianthos, quas si efficaciores reddere cupimus, permiscere poterimus, puluerē specierum diarrhodon, aromatici rosati, diatrion piperon, uel puluerem mastice, mirrhæ, aut pineorū cupressi, ita ut pro sīgula quāq; vncia dictarū conseruarū Drachma una dictorum puluerū & specierū permisceri possit; quo tēpore non erunt p̄ter mittenda, quæ extra admoventi solent, quemadmodū si lūbis & renū regioni applicemus Ol: Mastice, de mirra, & consimilia, quibus si addiderimus pul: mastice, uel pineorū cupressi, menthæ, rosarū, & cætera huiusmodi cū cera lenimentū cōponemus: ex eisdē parari poterunt lesiones, si in uino austero decoctio fiat, uel cū posca fomēta adhibeantur, probatur quin ēt fex vini nigri pectini & lūbis admota, cuius ēt puluis ad scrup. i. cū ouo recenti singulo mane exhibitus, huic malo succurrere solet: quæ aut requirat Gonorrhoea gallica, nō est ut hoc loco illa adducamus, q̄a esset agere de cura morbi gallici: his medicamētis correspondeat ēt victus ratio, ita ut in gonorrhoea ex copia seminis, conueniat victus minuens, qui ēt alterari cū illis poterit, q̄ semen minuere possunt, qualia sunt q̄ supra p̄posita fuere, victus flatulentus p̄termittendus erit, quia venerē excitare solet, cuiusmodi sunt cicera rubea, faba, nuclei pinci, eruca, & cætera huiusmodi. Dimittantur ēt Diuretica, vt semina Dauci, vrticæ & reliqua: sermones ēt & lectiones veneræ & spectacula similia p̄termittenda sunt, decubitus sit potius secundū latera, ne lumborū arteriæ incalescant. In gonorrhoea aut à materia calida & acris, cōueniet victus refrigerans & humectans, ut ptisana hordei, a, q̄ pro necessitate alterari ēt poterunt cū foliis lactu

*Ius galli.**Conserua.**Extra admo-  
uenda in un-  
ctio.**Lenim.**Sesiones:**Fomenta.**Puluis.**Victus ra-  
tio.*



## De Morbis Muliebribus

*Potus.* cæ, nymphaeæ, portulacæ & similibus; & si aliqua fuerit suspicio de ulceratione, parari eadē fercula poterūt cū pedibus vitulorū, cum capite castrati & similibus. Potus sit aqua frigida & chalybeata. Si deniq; gonorrhœa fiat à materia tenui & aquola, conueniet uictus moderatē calefaciens & magis excicans: ideo caro columborū erit utilis, & asini potius q̃ elixi parari poterunt, reliqua ēt oīa cibaria, si cū Aromatis alterentur, magis ēt conducent: hæc autem calida ut sint oportet, & leuiter astringentia, huiusmodi sunt macis, nux myristica, mentha, melissa, nuces cupressi & similia.

### De procidentia uteri. CAP. LXXI.

*Nomen.* Uteri procidentia illud est vitiū, rōne cuius uterus à naturali loco dimouetur, q̃cū intus esse deberet foras p̃minet, cuius forma est ut sit ex genere morbi in mala cōpositione, q̃ in situ consistit qm̃ à naturali sede a motus ē, uterus .n. dū à proprio & interno situ remouetur, secundū omnē loci differentia p̃uerti potest, sursū inq̃, deorsū & ad latera. Sursū quidē & ad latera rarō, deorsū uerō sæpius: ideo de hoc affectu in p̃sentia sermo habetur. De materia aut̃ seu loco affecto nihil aliud dicendū occurrit, nisi esse vterū ipsum, ad aliarū partū corporis differentia, qñ illis quoq; accidit à proprio loco dimoueri. Causæ aut̃ p̃ducētes hunc vteri prolapsū primo internæ capiuntur à facultate retentricæ vteri tūm labefactata tūm impedita. Si labefactata fuerit, sit ob intēperie frigidiorē & humidiorē: potissimū aut̃ ab humidiori, rōne cuius ligamenta vteri laxari usq; adeo possunt, ut uterus propria sede relictū foras p̃cidat: pro maiori aut̃ & minori relaxatione, magis ēt & minus facultas illa læditur, ut illius functio modō auferatur, modō minuatur. Aufertur in illa procidentia in qua uterus à suis apendicibus longissimē abest, ut in quibusdā ad dimidiū coxarū & ad genua usq; descendat: imminuitur verō, vbi à propria sede parum distauerit: hinc corū sententia reiicienda, qui putant, vterū in hoc affectū à propriis ligamentis

*Forma.*

*Locus.*

*Causæ.*

*3. artis medicæ.*

*Improbatio aliorum.*



gamentis oīnō exolutum esse: tunc. n. frustra esset curationē huius affectus aggredi, quia impossibile oīnō esset, soluta ligamenta denuō consolidare, & in pristinū locū vterū restituere Vbi verō ex ligamentorū relaxatione hoc contingit, etsi ardua & difficilis curatio sit, non tū desperata & impossibilis erit, frigidiorē. n. intemperie & humidiorē remouere cū calefacientibus & exiccantibus non est impossibile: Cæterū intēperies ista esse pōt cū materia & sine materia. Et si cū materia, modō corpulenta modō flatulenta. Si corpulenta, erit pituitosa & aquosa, copia & qualitibus peccans, consequenter frigidior & humidior, tenuis ē & lubrica consequenter fluxibilis, ut partes, quas contangit, molliores & laxiores reddat, p̄priumq; illarū robur auferat: quare occupans totam substantiā uteri, intus & extra & eiusdem ligamenta, mirum esse non debet, si omnibus laxioribus redditus, vterus suo ē pondere adiuuante deorsū feratur. Si materia flatulenta fuerit, eandē matricē ad inferiora propellere poterit, quæ materia, modō in dictis partibus primō generatur, modō aliundē transmittitur, atq; tunc à toto vel à parte. Si eadē facultas impedita fuerit, & primō ab internis causis fieri hoc potest ob frequentia partus, rōne cuius eadē vteri ligamenta, quæ in hac functione multū laborant, laxari pariter possunt, orta resolutione in mēbranis & musculis vterū sustinentibus. Ex hoc eodē partu si ante debitum tps fiat, possunt uincula ēt dirumpi, q̄ ex vehementi naturę conatu contingit, & tunc fœtus ante debitum tps descendit. Si autē ab externis causis idē vterus prolaboratur, erunt illæ oēs, rōne quarum vterus & vteri ligamenta oīa debilitari, laxati & dirumpi possunt, ut merito laxationis & imbecillitatis concurret uictus humidior, potus frigida, sessio super lapidem frigidum, natatio in frigida, otium uehementioraq; animi accidentia, ut aduentus inimici, insperata filij mors & similia, à quibus mulieres ualdē agitatae, lypothymiam syncopin totiusq; corporis exolutionem pati solent, ut mirum non sit si vterus ēt à propria sede dimoueatur. Causæ uerō dirumpentes plures & ipse sunt,

*Intemperies*

*2. sine materia & cum mā.*

*Materia 1.*

*Mā flatul.*

*Locus generationis materiae.*

*Causæ impedientis fac.*

*Causæ interne.*

*Causæ externe.*

*Causæ dirumpentes.*

Cc 2 inter



## De Morbis Muliebribus

*Epilogus loci  
cuius essen-  
tia.*

inter quas enumeratur inartificioſa extractio fœtus, uel uiolenta ſecundinæ ſeparatio, ut in Abortu contingit, eleuatio magni ponderis, clamores inſignes, nimia detentio ſpiritus & conatus, caſus ab alto & reliqua eius generis, quorum cauſa ſi ligamenta diſrumpantur & pelliculæ uterum continentes & ſuſtinentes uicinifq; partibus connectentes, neceſſariò inferius procidat. Erit igitur procidentia, uteri à propria ſede dimotio ad inferiora deſcendens, à labefactata retentricæ, ob intemperiem frigidam & humidam cum materia flatulenta & corpulenta, copia & qualitate prima & ſecunda peccante in utero genita, uel aliundè in ipſum tranſmiſſa à toto uel à parte, quæ uterum, ligamenta & pelliculas ſuſtinentes laxando & emolliendo, deorſum procidere facit, quod ipſum pariter contingere ſolet, eadem facultate impedita, ſiue ab internis ſiue externis cauſis impedita fuerit.

## De Differentiis. CAP. LXXII.

*Differentia  
formales.*

*Differentia  
māles.*

*Differentia  
effetrices.*

EX ſingulis partibus & cauſarum generibus continētibus eſſentiam propoſiti affectus, illius ē ſpecies colligi poſſunt: ex parte tñ formæ illa tantū oriuntur, quæ ſecundū magis & minus diſtinguuntur nam uteri procidentia, rōne qua eſt à ppria ſede dimotio, ad inferioraq; prolapſus, pro maiori & minori illius deſcenſu dīræ ē, eiufmodi naſcentur. Ex parte aut loci affecti dicimus uteri procidentiam fieri, uel primariò affecto utero uel ſecundariò: & ſi ſecundariò, ratio ne totius uel partis: poſtremò ex parte cauſarum efficiētū tot ſpēs oriri poterunt, quot fuere cauſæ enumeratæ.

## De Signis. Cap. LXXIII.

*Signa in ge-  
nere.*

Tunc affectum abſolutè & genericè acceptum cognoscemus ex relatione patientis, & ex nobis ipſis uidentibus



tibus: dum. n. uterus deorsum à propria sede dimouetur, est quid simile cucurbitæ, qui si ad gēua usq; peruenierit, magnum esse uteri prolapsū significabitur, secus uerò minorem. An uerò in utroq; prolapsu, uterus primariò uel secundariò afficiatur, distinguemus, quia si primariò fuerit affectus, aderunt signa secundum illas partes quibus uterus aligatur dorso, & aliis circumiacentibus membris, indicantia labefactatam earum facultatem, hoc est, frigidiorē & humidiorē intēperiem, & præterea in toto corpore & aliis partibus mulier benè habebit: Si autem contra euenerit, ut ratione totius potius uel alterius partis determinatæ mulier conqueratur, indicium erit uterum alterius causa esse affectum. Quocunq; autem modo affectus fuerit, cum ab externis & internis causis id fieri possit, distinguemus, quia si præcesserint externæ illæ causæ antea enumeratæ, oēs inquam, plures aut aliquæ, argumentum erit, hunc affectum occasionem habuisse ab externis causis, quarū si nulla præcesserit, statuendum erit, cās intus delitecere, quæ si cōsistant in facultate retentrice labefactata, ob frigidam & humidā intemperie, uterus citra oēm doloris sensum à proprio loco amotus erit. Signa q; talē intemperiem indicantia, aderunt, q̄ intēperies, si cum materia fuerit coniuncta, signa non deerunt significatia materiæ pituitosæ copiam. Si eadem facultas impedita potius fuerit præcessit frequentia partus, uel nimius in pariendo naturæ conatus, & tunc uterus non absq; dolore precipidet.

*Signa differ. formalium.*  
*Signa materialium.*

*Signa ab externis causis.*

*Signa causarum internarum.*

*Signa materialia.*

*Signa fac. impedita.*

*De Indicationibus. Cap. LXXIV.*

**C**um uteri procidentia morbus sit in situ, primò & an oīa in proprium locum reponēdus erit: quod aut hanc repositionem prohibere pōt, est intestinorū & uesicæ repletio, idēd alius imprimis lenienda clysteri & lotium pariter emittendū erit, mox in propriā sedem uterus intromittēdus erit, qui cum inter intestinum rectum & uesicā interiaceat, idēd nisi prius hæc uasa inaniantur à copia suarū superfluitatum

*Indic. Prohib.*



## De Morbis Muliebribus. 20

De Prognostico.

tatum in proprium locum repositio impeditur. Ceterum cum vterus procidat tum ratione intemperiei, tum solutæ unitatis, merito intemperiei cum frigida & humida sit, indicabit auxiliū calefaciens & siccans, cui si mē accesserit hæc si flatulenta fuerit, auxiliū discutiens significabit, si corpulenta extiterit cum & copia & qualitate peccare possit, idē meritō copiam indicabitur auxiliū euacuans, sicut ex parte crassitiei & lētoris, auxiliū attenuans & detergens. Si autē locū habuerit soluta unitas, indicabitur auxiliū uniens partes disruptas: & dū ab hac soluta unitate pducitur, affectus iste incurabilis euadit. Si autē ab intemperie potius prodierit, hæc si nuda fuerit, facilius curabitur, quā si cum materia coniuncta sit, quæ cum corpulenta & flatulenta esse possit, maiori difficultate tolletur corpulenta quā flatulenta, quæ rursus cum in utero & partibus illi annexis generari possit, uel alibi, difficilius curabitur: dū uterus primō afficitur, quā secundo, ceteris tñ semp paribus: & dum secundiō afficitur, maiori adhuc negotio malum tolletur, si fiat ratione totius quā partis. Tandē dum uterus procidit uel recēs uel antiquius erit affectus. Si recens facilius in proprium locum restitui poterit, quā si antiquus. In antiquo. n. iminet, ne locis pfrigeratis, conuulsio contingat, et psertim in initio, et prius quā loci quādam callositatem contraxerint, quo tpe nec dolor infestat: at si uterus intumuerit, difficilior cura succedet, quemadmodum si computruerit, impossibilis erit.

## De auxiliorum materijs. cap. LXXV.

Repositio uteri in propriū locū.  
Remotio impediētiū.

Repositio

Supposita totius corporis prouidentia, ad topica descendendum erit. Primum autē omnium, quod in hoc affectu faciendū occurrit, est uteri repositio in proprium locū, quæ operatio tunc melius et facilius fiet, si mulier supina figuretur, coxis lursum elatis, & utrisque disiunctis & disparatis, p hunc .n. situm, uterus facilius in proprium locum restituitur: ante omnia tñ, quæ talem operationem impedire possunt, remouenda



da erunt, ut si intestina & uesica propriis superfluitatibus re-  
ferta fuerint, erunt inanienda, & si uterus in tumorem subla-  
tus fuerit, oīs tumor erit auferendus, quibus peractis oblini-  
ri debet, deinde in propriū locū peruncta manu reponi, nec  
satis est uterū in propriā sedē collocasse, sed oportet ēt eundē  
in illa retinere, ne forās iterū excidat. Ideō ad id consequen-  
dū p̄stabit pilam aliquā formare, qua os uulvæ obturetur,  
ne forās iterū labatur. Parari aut poterit ex lana, polca uel ui-  
no austero, prius imbuta, deinde expressa: in quibus si astrin-  
gētia ēt calida macerata prius fuerint, ut matricaria, mētha,  
nucēs cupressi & similia, addendo sēper odorata & aromati-  
ca, adhuc efficaciora euadent, deinde fasciis ex arte pars illa  
deliganda erit, quibus peractis, & muliere reclinata cū situm  
seruare debet, ut non solū extensis cruribus decumbat, sed ea  
ē rōne, ut alterum crus incūbat reliquo, ad q̄ genus auxiliij  
spectabunt etiā Cucurbitulæ non scarificatæ, si umbilico &  
vtrilq; hypochondriis cū magna flāma fuerint applicitæ: hæ  
.n. sursum trahendo uim suspendendi uterū habebunt, & eun-  
dē in p̄prio domicilio retinendi. Ex parte uerō eorum loca  
liū quæ ad pharmaciā magis pertinent, illa occurrunt, quæ  
non solū extra admouentur, sed intus ēt capiuntur. Et hæc  
uim habere debent laxiores partes roborandi, frigidamq; &  
humidā intemperiem tollendi, qualia sunt, conserua ex matri-  
caria, artemisia, betonica, mentha, & aliis supra propositis;  
ex quibus multæ medicamentorum formæ parari possunt,  
decocta, succi, pulueres, Electuaria, rotulæ, trochisci & reliqua  
de quibus abundē dictum fuit in sermone de profluuiō mē-  
struorū, quibus oībus illa ēt correspondere debent quæ ex-  
tra applicantur, siue olea fuerint, lenimenta, emplastra, cera-  
ta, suffumigia, fomenta, sessiones & reliqua id generis, ut  
inunctio fieri debeat cum oleo masticino, de mētha, de len-  
tisco & similibus, quibus pecten inungi debet, & inter anū &  
os pudendi, quibus oleis si addamus puluerē masticis, mirhæ  
mirthi, menthæ absint nucū cupressi, rosarū rubearum, boli  
armeni, & cætera eiusmodi & cerā q. lenimenta parabimus,  
quemad-

*Retentio.*

*Pila*

*Deligatio*

*Decubitus*

*Cucurb.*

*De pharma-  
cia.*

*Conserua.*

*Formæ.*

*Inunctio.*

*Lenimētum:*



## De Morbis Muliebribus.

- quēadmodum ex matricaria, arthemisia, nucibus cupressi, ro-  
sis & mirtho in uino astringenti decoctis & optimē contu-  
sis & pistatis & cum farina lupinorū pmixtis cataplasma cō-  
ponamus; ex quibus materiis ceratum ē in eundē usum for-  
*Emplastrū.* mari poterit, accipiendo masticis, olibani, thuris, ana drac. s.  
*Ceratum.* styracis scrup. i. therebinthi unc. i. s. resinæ parum misce pro  
*Fomenta* cerato. Eadem loca foueri ē poterunt cum decocto supra  
proposito, in quo spongia imbuta & expressa, actu calida di-  
ctis locis sæpius admoueri debet. In eadem decoctiōe lesio-  
*Sesiones.* nes ē parari poterunt, suffumigia pariter non erunt omittenda, q̄  
*Suffumig.* duorum generum ut sint oportet, boni. s. & malis  
*2. sunt.* odoris, ut priora partibus supernis, naribus inquā admouē-  
*Suffumig.* tur: qm̄ rōne boni odoris matrix sursum trahitur: quæ aut  
*pro nari-* mali odoris fuerint, subiectis partibus & matrixi applicabū-  
*bus.* tur, quem odorem uterus quasi fugiens intus & sursum cō-  
*Suffumigiū* trahetur. Materiæ aut odorati suffumigii erunt gal. mosch.  
*pro utero.* styrax, lignum aloes, costus, cinamomum, muscus & similia:  
mali autē odoris parari poterunt ex castoreo, galbano, saga-  
peno, accenso sulphure, aliorum & cæparum cortice, quæ &  
similia trita & aceto inspersa sup ignitos carbonēs poni po-  
terunt; id tñ in praxi obseruādum, ut dum fiunt suffumigia,  
secundum infernas partes, ea ratione fiant, ut talis uapor ad  
*Monitum.* supernas non exhalet, idē optimē contegi debet, ut nulla  
fiat euaporatio, quia ex tali uapore uterus magis procide-  
ret, & præterea capitis grauitas induceretur.

F I N I S.

*Cum Licentia Superiorum.*





RERVM NOTABILIVM  
QVE IN HOC LIBRO  
CONTINETVR.

I N D E X.

**I**ntentio auctorsi in hoc opere. cap. 1. pag. 1.  
Quæ scribendi occasio fuerit, c. 1. p. 1.  
Quanta sit utilitas huius tractationis c. 1. p. 1.  
Quis ordo tractandorum futurus sit. c. 1. p. 1.  
Qui & quot sint uteri affectus cap. 2. p. 2.  
Vterum esse subiectum, cuicumq; generi morbi. c. 2. p. 2.  
Vterum esse subiectum cuicumq; generi sympt. c. 2. p. 2.  
De origine & necessitate morborum omnium uteri. c. 3. p. 3.  
Vteri essentia ex quibus & quot constet. c. 3. p. 3.  
Vteri affectus dup. sunt, communes & proprii. c. 3. p. 3.  
Formam substantialem ulli morbo subiectam esse, c. 3. p. 3.  
Vteri sympt. quæ & quot sint, c. 3. p. 3.  
De suppress. mestrurorum. cap. 4. p. 7.  
Quis ordo seruetur in singulis affectibus uteri tractandis. c. 4. p. 8.  
Quæ sit necessitas agendorum. c. 4. p. 8.  
De uoce suppress. mestr. cap. 5. p. 8.  
Nomina morborum & sympta quibus capiantur. c. 5. p. 8.  
De essentia suppress. Mestrurorum. cap. 6. p. 10.  
Quæ sit forma suppress. mestr. c. 6. p. 10.  
Sanguinē mestrui esse excrementū secundæ coctionis. cap. 7. p. 11.  
D



Sanguinem menstruum esse excrem. peccans quantitate.	c. 8. p. 12
Sanguinem menstruum esse excrem. peccans qualitatibus manifestis.	c. 8. p. 12
Sanguinem menstruum peccare qualitati occulta.	cap. 9. p. 12
Sanguinem menstruum esse excrementum inutile.	c. 9. p. 12
Sanguis menstruus an sit excrementum ueneficum.	c. 9. p. 13
Qui sanguis mest. praua & occultiori qualitate peccet.	cap. 11. p. 15
A sanguine mestruo fieri possunt morbi hæreditarii.	c. 11. p. 15
Quæ & qualis sit prauitas menstrui sang.	cap. 12. p. 16
Cur cohibita menstrua modo noceant, modo non	c. 12. p. 16
De sanguine mestr. in muliere pregnantæ & lactante.	C. 13. p. 17
Sanguinem menstruum triplici parte constare.	C. 13. p. 17
Modernorum opinio reiicitur de sanguine mestruo.	c. 14. p. 15
Cur sanguis mest. in scæminis tantum generatur.	c. 15. p. 20
Quo tempore incipiant menstrua fluere.	c. 16. p. 21
Quo tempore menstrua desinant fluere.	c. 17. p. 22
Quo temporis interuallo menstruæ purgationes reppetant.	c. 18. p. 22
Quot diebus menstrua purgatio perduret.	c. 19. p. 22
Quæ sit causa sterilitatis.	c. 19. p. 22
Quæ sit quantitas menstrui quod purgatur.	cap. 20. p. 23
Qui sit locus naturalis euacuandi sanguinis menstrui	cap. 21. p. 24
Sanguinem menstruum quandoque in prægnantibus etiam citra noxam fluere	c. 21. p. 24
Quæ & quot sint causæ externæ suppress. mest.	cap. 25. p. 28
De signis suppress. mest. in genere	cap. 26. p. 29
De signis differètiarum suppress.	cap. 27. p. 30
De signis causarum internarum & externarum suppress. mest.	c. 27. p. 31. 32. 33
De indicationibus in suppress. mest.	cap. 28. p. 34
In auxiliis inueniendis tria spectanda sunt.	c. 28. p. 34. 35. 36
De prognostico in suppress. mest.	cap. 29. p. 36
Quæ & quot in prognostico spectari debeant	c. 29. p. 36. 37
De materiis auxiliorum omnium in cura suppress.	cap. 30. p. 38
Materiæ omnes auxiliorum, ex triplici fonte capiuntur.	c. 30. p. 38
De materiis chirurgicis	cap. 31. p. 39
De indicantibus uenæ sec.	c. 31. p. 39



De indicantibus rectam administrationem	c. 31. p. 39. 40. 41. 42.
De cucurbitulis scarificatis	cap. 32. p. 42.
A quibus indicentur cucurb. scarific:	c. 32. p. 42.
A quibus indicetur recta illarum administratio,	c. 32. p. 42.
De cucurbitulis non scarificatis	cap. 33. 43.
De ligaturis.	cap. 34. p. 43.
A quibus indicetur ligaturæ, & recta earum administratio.	c. 34. p. 43.
De hirundinibus.	cap. 35. p. 44.
A quibus indicentur hirund. & recta illarum admini- nistratio.	c. 35. p. 44. 45.
De cauteriis.	cap. 36. p. 45.
Cauteria & recta eorum administratio à quibus indi- centur.	c. 36. p. 45. 46.
De pharmacia leniente.	cap. 37. p. 47. 48.
A quibus indicetur leniens medic:	c. 37. p. 47. 48.
A quo indicetur leniens per supernum os exhibendum.	c. 37. 47. 48.
A quo indicetur leniens per infernum os admini- strandum.	c. 37. p. 47. 48.
A quibus indicetur recta eius administratio.	c. 37. p. 47. 48.
Quæ & quot sint materie auxilij lenientis.	c. 37. p. 47. 48.
Circa dosim hyere diffic. tractatur & gal. loca con- ciliantur.	c. 37. p. 47. 48.
De preparantibus in suppress. mestr.	cap. 38. p. 50.
A quibus indicentur prepar.	c. 38. p. 50.
Quæ sint materie auxilij prepa.	c. 38. p. 50.
De euacuantibus.	cap. 39. p. 51. 52.
A quibus indicetur euacuans auxilium, & recta eius administratio.	c. 39. p. 51. 52.
De localibus remediis in suppress. mestr.	c. 40. p. 52.
A quibus hec remedia indicentur, & recta eorum administ.	c. 40. p. 52.
De præfocatione matricis.	cap. 41. p. 57.
Platonis & Arist. defensio.	c. 41. p. 58.
Præfocatio matricis, sub quocumq; generi scripto. locari pot.	c. 41. p. 58.
Præfocatio non est morbus.	c. 41. p. 59.
Præfocatio est sympt. commune utriq; sexui.	c. 41. p. 60.
De causis facientibus præfocationem.	cap. 42. p. 60. 61.
Causam immediatam præfoc. esse vaporem.	c. 42. p. 61.

Dd 3



Causam mediata[m] esse semen, & mestr.	c. 42. p. 61.
Semen & sanguinem mestruum, in præfoc. peccare in quanto & quali.	cap. 43. p. 61.
Semen & sanguinem mestrum peccare manifestis, & occultis qualitatibus.	c. 43. p. 62. 63. 64.
De speciebus præfocationis.	cap. 44. p. 65.
De signis imminentis præfoc.	cap. 45. p. 66.
De signis presentis præfoc.	c. 45. p. 66.
De signis præfoc. ex semine.	c. 45. p. 66.
De signis præfoc. ex mestruo.	c. 45. p. 66.
De signis distinguendis præfocationem ab Appophi.	
Epil. lethargo & syncopi.	c. 45. p. 67.
De signis distinguendis, mulierem præfocatam à mortua	c. 45. p. 67.
De cute præfocationis.	cap. 46. p. 68.
De indicationibus curatiuis præseruatiuis & uitabilib.	c. 46. p. 68.
De materiis auxiliiorum in præfoc.	cap. 47. p. 69.
An misio sang. conueniat, actu existente præfocatione.	c. 47. p. 69. 70.
De materiis pharmac. in præfoc.	cap. 48. p. 70.
An odorata conueniant in muliere præfocata.	c. 48. p. 71.
De profluuiio mensium	cap. 49. p. 72.
Quo differat profluuium mensium à ceteris profluuiis.	c. 49. p. 72.
Profluuium mensium duplex esse.	c. 49. p. 72. 73.
De causis efficientibus profluuium mentium.	cap. 50. p. 75.
Quæ sūt. causæ profluuii mensium interne proximæ & remotæ.	c. 50. p. 73.
Quæ sint cause profluuii externæ proximæ & remotæ.	c. 50. p. 74. 75.
De differentiis profluuii mensium.	cap. 51. p. 75.
Quæ sint differentiæ huius profluuii formales materiales & effec.	c. 51. p. 75.
De signis profluuii mensium.	cap. 52. p. 75.
Quomodo hoc profluuium distinguatur à profluuiio muliebri.	c. 52. p. 76.
Quomodo idem profluuium distinguatur à naturali.	c. 52. p. 76.
Quomodo distinguatur profluuium criticum à symptomatico.	c. 52. p. 76.
De signis causarum profluuii, formalium materialium & efficientium.	c. 52. p. 76. 77.
De indicationibus curatorii præseruatorii & uitabilib.	cap. 53. p. 78.
De prognostico in profluuiio mensium.	c. 53. p. 78.



- 107
- De materijs Auxiliorum in profluio mensium.** cap. 54. p. 79.
- Quid indicet vene sec. in profluio mens. c. 54. p. 79.
- Quæ indicet rectā eius administrationē in proc. flu. mēsi. 54. p. 79.
- Quæ indicet cucurbitulas scarificatas & nō scarifica. c. 54. p. 80.
- Quæ indicet rectam illarum administrationem. c. 54. p. 80.
- De ligaturis & recta earū administratione in profl. mēsi. c. 54. p. 81.
- De frictionibus & earum recta administratione. c. 54. p. 81.
- De materijs pharmaceticis in profluio mestr.** cap. 55. p. 82.
- Quæ lenientia præparantia & purg. conueniant in proflu. mestr. c. 55. p. 82.
- Materiæ auxilij adstringentis ex triplici rerum ordine capiuntur. c. 55. p. 83.
- Ratio curandi stillicidium mentium per anastomasm diapendesm & dieresim. c. 55. p. 84. 85. 86.
- Quæ & qualis uictus ratio conueniat in qualibet specie profluuii.** cap. 56. p. 86.
- De stillicidio mensium.** cap. 57. p. 86.
- Quæ sit forma huius sympt. quis locus affectus, & quæ sint causæ efficientes. c. 57. p. 87.
- Quæ & quot sint species eiusdem. c. 57. p. 87.
- Quibus signis cognoscatur & à ceteris fluxibus distin- guatur. c. 57. p. 87.
- De curatione stillicidij mensium.** cap. 58. p. 87.
- Quæ sint indicantia curatoria preseruatoria & vitalia. c. 58. p. 87.
- De pronostico in stillicidio mensium. c. 58. p. 87.
- De materijs medicis in curando stillicidium mensium. c. 58. p. 88.
- Quæ indicet auxilium uacuans sanguinem, auxilij ma- teriā, & rectā eius administrationē in stillicidio mēsi. c. 58. p. 88.
- De Muliebri profluio.** cap. 59. p. 88.
- Quo differat muliebri profluuium ab alijs. c. 59. p. 88.
- Materia exiens in muliebri profluio duplex est humoro- sa & ichorosa utraq; tamen in excrementitia.** cap. 59. p. 89.
- Materia faciens profluuium mulieb. multis rationibus concurrere potest.** c. 59. p. 90.
- Quæ & quot sint species profluuii mulieb.** cap. 60. p. 91.
- De signis profluuii muliebris tum in genere tum secun- dum illius species.** cap. 61. p. 92.



De cura profluuij muliebris.	cap.62.p.93.
De pronostico profluuij muliebris.	cap.63.p.93.
De auxiliorum materiis.	cap.64.p.94.
De materiis pharmaceticis.	cap.65.p.94.
Vinum ebullitum nullius esse effic.	cap.65.p.96.
De gonorrhoea.	cap.66.p.96.
Gonorrhea est vitium utriq; sexui commune.	cap.66.p.96.
Gonorrhea cur frequētius feminis q̃ uiris cōtingat.	c.66.p.96.97.
Quæ sit gonorrhææ essentia.	c.96.p.97.
Quæ sit forma gonorrhææ.	c.66.p.97.
Quis sit locus affectus in gonorrhæa.	c.66.p.97.
Quæ & quot sūt cause interne & externæ gonorrhææ.	c.66.p.97.98
De differentiis gonorrhææ.	cap.67.p.98.
Quæ & quot sint species gonorrhææ, formales materia- les & effic.	c.67.p.98.
De signis gonorrhææ.	cap.68.p.99.
Signa gonorrhææ, in genere.	c.68.p.99.
Signa gonorrhææ ex semine tantum.	c.68.p.99.
Signa gonorrhææ nothæ.	c.68.p.99.
Signa gonorrhææ ex uasis seminalibus primario & se- cundario affectis.	c.68.p.99.
Signa distinguētia causas effectrices gonorrhææ.	c.68.p.99.
De indicationibus.	cap.69.p.99.
De pronostico in gonorrhæa.	c.69.p.99.
De Auxiliorum materiis in gonorrhæa.	cap.69.p.100.
Quæ sint materiæ auxilij prohibentis generationem feminis .	c.69.p.100.
Varia formæ medicam. in gonorrhæa.	cap.69.p.100.
Quæ & qualis esse debeat uictus ratio in gonorrhæa.	c.69.p.101.
De vteri procidentia & illius essentia	cap.71.p.101.
Quæ & quot sint, species huius affectus.	c.71.p.102.
Quæ & quot sint eiusdem affectus signa,	c.73.p.102.
De indicationibus in procidentia uteri.	c.74.p.103.
Quale sit pronosticum in procidentia uteri.	c.14.p.103.
De auxiliorum materiis in procidentia uteri.	cap.75.p.104.



*Errata sic corrigito.*

*Substantia, legas substantia, cap. 2. pag. 2. fiat. lege fiat. cap. 3. p. i. distanerit, lege distauerit, cap. 3. p. 6. accedit etiam ratio & cet. uerba sunt duplicata pag. 13. habitus, l. halitus. p. 16. cohis. l. cōchis p. 21. oris. l. ora p. 27. prohibent lege per libeant p. 28. uestris lege uentris p. 30. rara faciei legas raras fac. endi. breuiori, adde tempore. p. 39. precipitatione, lege precipitatio p. 40. onc. 15. lege unc. 2. gladiori legas gladioli. p. 50. manerent legas numeret, p. 50. ascendendum legas ascendere p. 51. monetur. leges monemur. p. 51. ut lege uti. p. 51. atias lege alias. p. 53. autem. lege aut. p. 55. soptum lege septum. p. 57. semene. lege semen. p. 60. modo legas malo p. 61. cōstitutus lege constitutos. p. 61. euidentia. lege accidentia. p. 64. quasdam lege quasdam p. 64. aspectum lege aspectu. p. 66. natibus. lege naribus. p. 67. malipritatem lege malignitate. p. 69. proteritus lege perteritus. p. 71. exeant. lege exeat p. 73. impetum lege impetu. p. 78. ulcius lege ulcus. p. 78. est longinquus lege, & longinquus. p. 80. puteat. lege pateat, p. 50. communia lege communes. p. 82. parandam lege parandum p. 82. uiuo. lege uinum. p. 83. rarefactus lege rarefactas p. 85. forum lege serum. p. 85. emittendum lege pre-mittendum p. 103.*



*Patauii Apud Paulum Meietum 1585.*

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, arranged in several lines. The text is faint and difficult to decipher due to fading and the age of the manuscript.

1.6.491















005643988

h